


КОНСПЕКТ ФЛОРЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В конспект включены сведения о 2292 видах сосудистых растений, произрастающих на территории Чеченской республики. Латинские названия видов приведены в соответствие со сводкой С.К.Черепанова (1995), однако названия некоторых таксонов в ранге рода приводятся по А.И. Галушко (1978-1980).

По каждому виду даются следующие сведения: научное латинское и традиционное русское название; распространение на территории Чеченской республики; геоэлемент; флороценоэлемент; биоморфа; встречаемость, а также дополнительные сведения.

Распространение видов приводится согласно схеме флористических районов (карта-схема). Римскими цифрами указывается принадлежность к флористической провинции, в скобках указываются районы, в ряде случаев объединённые:



Карта-схема флористических районов Чеченской республики

I. Понтическая провинция

М – Моздокский район

II. Туранская провинция

КН – Кара-Ногайский район;

Кизл – Кизлярский район

ВП (КН+Кизл) – Восточно-Предкавказский (районы Восточного Предкавказья)

III. Кавказская провинция

ТС – Терско-Сунженский район;

ЧО – Чечено-Осетинский район;

СКТ (ТС+ЧО) – Средне-Кумско-Терский (районы Центрального Предкавказья)

Ч - Чеченский район;

ВС – Верхне-Сунженский район

Тер (Ч+ВС) – Терский (районы Большого Кавказа)

IV. Дагестанская провинция

БН – Брагуно-Новолакский район;

Геоэлемент указывается в скобках после районов распространения:

Плюрирег.	- Плюрирегиональный
Голаркт.	- Голарктический
Палеаркт.	- Палеарктический
Панбор.	- Панбореальный
Евро-Сиб.	- Евро-Сибирский
Евро-Кавк.	- Евро-Кавказский
Кавк.	- Кавказский
Эукавк.	- Эукавказский
Предкавк.	- Предкавказский
Эвксин.	- Эвксинский
Понт.-Южносиб.	- Понтическо-Южносибирский
Понтич.	- Понтический
Общедр.средиз.	- Общедревнесредиземноморский
Зап.др.средиз.	- Западнодревнесредиземноморский
Средиземн.	- Средиземноморский
Кр.-Новоросс.	- Крымско-Новороссийский
Вост.др.средиз.	- Восточнодревнесредиземноморский
Ирано-Туран.	- Ирано-Туранский
Армено-Иран.	- Армено-Иранский
Туранск.	- Туранский
Субсредиз*.	- Субсредиземноморский
Субкавк*.	- Субкавказский
Субпонт*.	- Субпонтический
Субтуран*.	- Субтуранский
Адвент.	- Адвентивный

Флороценоэлемент указывается после точки с запятой:

S(Silvaticus) - лесной

P(Pratensis) - луговой

Pa - равнинный

Pb - субальпийский

Pc - альпийский

ST(Stepposus) - степной

D(Desertus) - пустынный

Da - кальцепетрофильный

Db - псаммофильный

Dc - галофильный

Dd - аргиллофильный

Do - оксифильный

A(Aquaticus) - водный

Aa - гигрофильный

Ab - гидрофильный

Ac - гидатофильный

R(Ruderalis) - сорный

Ra - сегетальный

Rb - рудеральный

Биоморфа (по Раункиеру) указывается после флороценоэлемента в скобках:

Ph(Phanerophyton) - фанерофит

Phmg(Megaphanerophyton) - мегафанерофит

Phms(Mesophanerophyton) - мезофанерофит

Phm(Microphanerophyton) - микрофанерофит

Phn(Nanophanerophyton) - нанофанерофит

Ch(Chamaephyton) - хамефит

HK(Hemicryptophyton) - гемикриптофит

K(Cryptophyton) - криптофит

T(Therophyton) - терофит

Дополнительные сведения о жизненных формах указываются через двоеточие:

fl(fruticulus) - кустарничек

sf(suffrutex) - полукустарник

ll(liana lignosa) - одревесневающая лиана

lh(liana herbacea) - травянистая лиана

eph(ephemera) - эфемер

ephd(ephemeroid) - эфемероид

ep(epiphyton) - эпифит

par(parasitus) - паразит

hpar(hemiparasitus) - полупаразит

sap(saprophyton) - сапрофит

sv(sempervirens) - вечнозелёное растение

hv(hieme virens) - зимнезелёное растение

pb(planta biennis) - двулетнее растение

pi(planta insectivora) - насекомоядное растение

ps(planta succulenta) - суккулентное растение

Встречаемость приводится в квадратных скобках:

[Soc.] (Sociales) - доминирует

[Pl.] (Plerumque) - обычно

[Sp.] (Sparse) - рассеянно

[R.] (Raro) - редко

[Rs.] (Rarissimo) - очень редко

Дополнительные сведения о видах:

<Es> (Planta stenoendemica) - стеноэндемик

<Esub> (Planta subendemica) - субэндемик

<EsubE> (Planta subeuriendemica) - субэвриэндемик

<Rt> (Relictum tertiarium) - третичный реликт

<Rg> (Relictum glacialum) - гляциальный реликт

<Rx> (Relictum xerotermicum) - ксеротермический реликт

<Pt> (Planta toxica) - ядовитое растение

<Pm> (Planta medicinalis) - лекарственное растение

<Pp> (Planta pabularis) - кормовое растение

<Po> (Planta ornamentalis) - декоративное растение

<Pa> (Planta alimentaria) - пищевое растение

<Pmel> (Planta mellifera) - медоносное растение

* - одичавшее культурное растение

l.c. (locus classicus) - классическое место

★ - виды, занесённые в Красную книгу Российской Федерации (2008)

CONSPECTUS FLORAE

ОТДЕЛ LYCOPODIOPHYTA - ПЛАУНООБРАЗНЫЕ

Класс LYCOPODIOPSIDA - ПЛАУНОВИДНЫЕ

Сем. 1. HUPERZIACEAE Rothm. - БАРАНЦОВЫЕ

1. *Huperzia selago*(L.)Bernh.ex Schrank et C.Mart. (*H. petrovii Sipl.*) - Баранец обыкновенный = III(Тер): (Плюрирег.); S(Ch:sv); [Sp.] <Pm;Rt>

Сем. 2. LYCOPODIACEAE Beauv. ex Mirbel - ПЛАУНОВЫЕ

2. *Lycopodium annotinum* L. – Плаун годичный = III(Тер): (Голаркт.); S(Ch:sv); [Pl.] <Rt><Pm>

Класс ISOËTOPSIDA – ПОЛУШНИКОВИДНЫЕ

Сем. 3. SELAGINELLACEAE Willk. – ПЛАУНКОВЫЕ

3. *Selaginella helvetica*(L.)Spring - Плаунок швейцарский = III(Тер): (Палеаркт.); S(Ch:sv); [Sp.] <Rt>

ОТДЕЛ EQUISETOPHYTA – ХВОЩЕОБРАЗНЫЕ

Класс EQUISETOPSIDA – ХВОЩЕВИДНЫЕ

Сем. 4. EQUISETACEAE Rich.ex DC. – ХВОЩЁВЫЕ

4. *Equisetum telmateia* Ehrh. - Хвощ Тельматея = I(М); II(КН); III(Тер); IV(БН): (Субсредиз*.); S(К); [Pl.]
5. *E. arvense* L. - Х. полевой = III(Тер); IV(БН): (Голаркт.); Pa, Aa, Ra(К); [Pl.] <Pm>
6. *E. pratense* Ehrh. - Х. луговой = III(Тер): (Голаркт.); S, Aa(К); [R.]
7. *E. palustre* L. - Х. болотный = I(М): (Голаркт.); Aa(К); [Sp.]
8. *E. fluviatile* L. (*E. heleocharis Ehrh.*) - Х. топяной = III(ЧО - Нижн.Сунжа): (Голаркт.); Aa(К); [R.] <Rg>
9. *E. ramosissimum* Desf. - Х. ветвистый = II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Голаркт.); Pa, Aa(К); [Pl.]
10. *E. hyemale* L. - Х. зимующий = II(Кизл); III(Тер): (Палеаркт.); S, Aa(К:hv); [Sp.] <Rt>
11. *E. variegatum* Schleich. – Х. пёстрый = III(Тер); IV(БН): (Голаркт.); Pa, Aa(К); [Sp.]

ОТДЕЛ POLYPODIOPHYTA – ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ

Класс ORHIOGLOSSOPSIDA - УЖОВНИКОВИДНЫЕ

Сем. 5. ORHIOGLOSSACEAE(R.Br.)Agardh. – УЖОВНИКОВЫЕ

12. *OrhioGLOSSUM vulgatum* L. - Ужовник обыкновенный = III(М - леса по Тереку); IV(БН): (Евро-Кавк.); S(К); <Rg;Rt>
13. *Botrychium lunaria*(L.)Sw. - Гроздовник полулунный = III(Тер); IV(БН): (Плюрирег.); Pa, Pb(К); [R.] <Rt>

Класс POLYPODIOPSIDA - ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ

Сем. 6. WOODSIACEAE(Diels)Herter (*Aspidiaceae*) - ВУДСИЕВЫЕ

14. ★ *Woodsia fragilis*(Trev.)Moore (*Hymenocystis fragilis* (Trev.) A.Askerov) - Вудсия ломкая = III(Ч): (Кавк.); S, Da(НК); [Sp.]
15. *W. alpina*(Bolton)S.F.Gray – В. альпийская = III(Тер): (Голаркт.); Do(НК); [Sp.]
Сем. 7. ONOCLEACEAE Pichi Sermolli (*Aspidiaceae*) - ОНОКЛЕЕВЫЕ
16. *Matteuccia struthiopteris*(L.)Tod. - Страусник обыкновенный = III(Тер); IV(БН): (Голаркт.); S(НК); [Sp.]
Сем. 8. ATHYRIACEAE Alst. (*Aspidiaceae*) – КОЧЕДЫЖНИКОВЫЕ
17. *Athyrium filix-femina*(L.)Roth - Кочедыжник женский = III(Тер); IV(БН): (Плюрирег.); S(НК); [Sp.] <Pm>
18. *Cystopteris fragilis*(L.)Bernh.(*C. filix-fragilis* (L.)Borb.) - Пузырник ломкий = III(Тер); IV(БН): (Палеаркт.); S(НК); [Pl.]
19. *Rhizomatopteris sudetica*(A.Br. et Milde)A.Khokhr. (*Cystopteris sudetica* A.Br. et Milde) - Ризоматоптерис судетский = III(BC): (Европ.); S(НК); [R.]
20. *Gymnocarpium dryopteris*(L.)Newm. (*Dryopteris pumila* V.Krecz., *D. linneana* C.Chr.) - Гимнокарпиум кочедыжник = III(Тер): (Голаркт.); S(НК); [R.]
21. *G. robertianum*(Hoffm.)Newm. – Г. Роберта = III(BC): (Голаркт.); S(НК); [R.]
Сем. 9. DRYOPTERIDACEAE Ching (*Aspidiaceae*) – ЩИТОВНИКОВЫЕ
22. *Dryopteris filix-mas*(L.)Schott - Щитовник мужской = III(Тер); IV(БН): (Голаркт.); S(НК); [Pl.] <Pm;Po>
23. *D. caucasica*(A.Br.)Fraser-Jenkins et Corley - Щ. кавказский = III(Тер); IV(БН): (Кавк.); S(НК); [Sp.] <Po>
24. *D. carthusiana*(Vill.)H.P.Fusch (*D. lanceolatocristata* (Hoffm.)Alst., *D. spinulosa*(O.F.Muell.)O.Kuntze) - Щ. Карпузиуса = III(Тер): (Голаркт.); S(НК); [Sp.] <Pm>
25. *D. assimilis* S.Walker (*D. austriaca*(Jacq.)Woynar; *D. expansa* (C.Presl) Fraser-Jenkins et Jermy) - Щ. схожий = III(Тер): (Европ.); S(НК); [Sp.] <Pm>
26. *D. oreades* Fomin (*D. abbreviata* (DC.)Newman ex Manton) – Щ. высокогорный = III(Тер): (Эукавк.); S, Pb(НК); [Pl.]
27. *Polystichum lonchitis*(L.)Roth – Многорядник копьевидный = III(Тер): (Голаркт.); Pb(НК:hv); [R.]
28. *P. aculeatum*(L.)Roth (*P. lobatum*(Huds.)Bast.) – М. мелкошиповатый = III(Тер): (Субсредиз*.); S(НК:hv); [R.]
29. *P. braunii*(Spenn.)Fee - М. Брауна = III(Тер): (Панбор.); S(НК:hv); [Pl.] <Rt>
Сем. 10. THELYPTERIDACEAE Pichi Sermolli (*Aspidiaceae*) – ТЕЛИПТЕРИСОВЫЕ
30. *Thelypteris palustris* Schott (*Dryopteris thelypteris*(L.)A.Gray) - Телиптерис болотный = II(ВП); III(ЧО - Грозный): (Голаркт.); Ab(К); [R.]
31. *Phegopteris connectilis*(Michx.)Watt – Фегоптерис связывающий = III(Тер); IV(БН): (Голаркт.); S(К); [Sp.]
Сем. 11. ASPLENIACEAE Newm. – КОСТЕНЦОВЫЕ

32. *Asplenium ruta-muraria* L. - Костенец рута постенная = III(Тер); IV(БН): (Голаркт.); S, Da(НК: hv); [Pl.] <Rt>
33. *A. septentrionale*(L.) Hoffm. - К. северный = III(Тер); IV(БН): (Голаркт.); S, Da(НК: hv); [Pl.] <Rt>
34. *A. viride* Huds. - К. зелёный = III(Тер): (Голаркт.); Pb, Do(НК: hv); [Pl.] <Rt>
35. *A. trichomanes* L. - К. волосовидный = III(СКТ); IV(БН): (Плюрирег.); S, Da(НК: hv); [Pl.] <Rt; Pm>
36. *Ceterach officinarum* Willd. - Скребница аптечная = IV(БН): (Общедр. средиз.); Da(НК: hv); [R.] <Rt>
37. *Phyllitis scolopendrium*(L.) Newm. - Листовник многоножковый = III(Тер); IV(БН): (Евро-Кавк.); S(НК: hv); [Sp.] <Rt; Pm>
38. *Cryptogramma crispa* (L.) R.Br. ex Hook. - Криптограмма курчавая = III(ВС – Чанты-Аргун): (Голаркт.); S, Pb, Pc(НК); [Sp.]
Сем. 12. POLYPODIACEAE Bercht. et J. Presl. – МНОГОНОЖКОВЫЕ
39. *Polypodium vulgare* L. - М. обыкновенная = III(ЧО, Тер): (Плюрирег.); S(НК: hv); [Sp.] <Rt; Pm>

Класс MARSILEOPSIDA - МАРСИЛИЕВИДНЫЕ

Сем. 13. MARSILEACEAE Mirb. – МАРСИЛИЕВЫЕ

40. *Marsilea quadrifolia* L. - Марсилия четырёхлистная = I(М - Терек); II(Кизл): (Плюрирег.); Ab, Ac(К); [R.] <Po; Rg; Rt>

Класс SALVINIOPSIDA - САЛЬВИНИЕВИДНЫЕ

Сем. 14. SALVINIACEAE T. Lest. - САЛЬВИНИЕВЫЕ

41. *Salvinia natans*(L.) All. - Сальвиния плавающая = I(М – Терек); II(ВП); III(ЧО - низ. Сунжи): (Плюрирег.); Ac(T); [Sp.] <Rt; Po>

ОТДЕЛ PINOPHYTA – СОСНООБРАЗНЫЕ

Класс PINOPSIDA - СОСНОВИДНЫЕ

Сем. 15. TAXACEAE S.F. Gray – ТИСОВЫЕ

42. ★ *Taxus baccata* L. - Тис ягодный = III(Ч): (Евро-Кавк.); S(Phms: sv); [Rs.] <Rt; Rg; Pt>

Сем. 16. PINACEAE Lindl. – СОСНОВЫЕ

43. *Pinus sosnowskyi* Nakai (*P. hamata*(Stev.) Sosn.; *P. kochiana* Klotzsch) – Сосна Сосновского = III(Тер): (Кавк.); S(Phmg: sv); [Pl.] <Rt; Pm>

Сем. 17. CUPRESSACEAE Rich. ex Bartl. - КИПАРИСОВЫЕ

44. *Juniperus oblonga* Vieb. (*J. communis* L.) - Можжевельник продолговатый = II([ВП: Имханицкая, 1990]); III(СКТ, Тер); IV(БН): (Кавк.); Da, Db(Phn: sv); [Sp.] <Rt; Pa; Pm>
45. *J. hemisphaerica* J. et C. Presl (*J. depressa* Stev.) – М. полушаровидный = III(СКТ, Тер); IV(БН): (Зап. др. средиз.); Pb(Phms: sv); [Pl.] <Rt>
46. *J. sabina* L. - М. казацкий = III(Тер): (Понт.-Южносиб.); Da(Phn: sv); [R.] <Rt; Pt; Pm>

ОТДЕЛ EPHEDROPHYTA – ЭФЕДРООБРАЗНЫЕ

Класс EPHEDROPSIDA - ЭФЕДРОВИДНЫЕ

Сем. 18. EPHEDRACEAE Dumort. – ЭФЕДРОВЫЕ

47. *Ephedra distachia* L. - Эфедра двухколосная = I(M); II(ВП); III(ТС); IV(БН): (Понт.-Южносиб.); Da,Db(Ch:sv:fl); [Sp.] <Rt;Pm>
48. *E. procera* Fisch.et C.A.Meу. - Э. рослая = III(Тер): (Ирано-Туран.); Da(Ch:sv:fl); [Sp.] <Rt;Pm>

ОТДЕЛ MAGNOLIOPHYTA – МАГНОЛИЕОБРАЗНЫЕ

Класс LILIOPSIDA - ЛИЛИЕВИДНЫЕ (ОДНОДОЛЬНЫЕ)

Сем. 19. TYPHACEAE Juss. – РОГОЗОВЫЕ

49. *Typha latifolia* L. (*T. shuttleworthii* C.Koch et Sond.) - Рогоз широколистный = I(M); II(ВП); III(СКТ): (Голаркт.); Ab(K); [Pl.] <Po>
50. *T. laxmannii* Lerech. - Р. Лаксмана II(ВП): (Палеаркт.); Ab(K); [Sp.] <Po>
51. *T. angustifolia* L. - Р. узколистный = I(M); II(ВП); III(ЧО): (Плюрирег.); Ab(K); [Pl.] <Po>
52. *T. domingensis* Pers (*T. australis* Schum. et Thorn., *T. angustata* Bory et Chaub) - Р. южный = II(КН): (Общедр.средиз.); Ab(K); [R.]
53. *T. minima* Funck - Р. малый = II(Кизл); III(ЧО): (Общедр.средиз.); Ab(K); [R.]

Сем. 20. SPARGANIACEAE Rudolphi - ЕЖЕГОЛОВНИКОВЫЕ

54. *Sparganium erectum* L. (*S. polyedrum*(Achers. et Graebn.)Juz.; *S. ramosum* Huds.) - Е. прямой = II(ВП): (Палеаркт.); Ab(K); [Sp.]
55. *S. neglectum* Veeby - Е. незамеченный = II(ВП); III(ЧО): (Европ.); Ab(K); [Sp.]
56. *S. emersum* Rehm. (*S. simplex* Huds.) – Е. всплывающий = III(ВС): (Палеаркт.); Ab(K); [R.]

Сем. 21. POTAMOGETONACEAE Dumort. – РДЕСТОВЫЕ

57. *Groenlandia densa*(L.)Fourr. (*Potamogeton densus* L.) - Гренландия густая = III(ЧО): (Субсредиз*.); Ac(K); [R.]
58. *Potamogeton rectinatus* L. - Рдест гребенчатый = II(ВП): (Плюрирег.); Ac(K); [R.]
59. *P. filiformis* Pers. - Р. нитевидный = I(M); II(ВП): (Плюрирег.); Ac(K); [R.]
60. *P. berchtoldii* Fieb. - Р. Берхтольда = III(ЧО): (Плюрирег.); Ac(K); [Sp.]
61. *P. crispus* L. - Р. курчавый = II(ВП): (Плюрирег.); Ac(K); [Sp.]
62. *P. perfoliatus* L. - Р. стеблеобъемлющий = I(M); II(ВП): (Плюрирег.); Ac(K); [Sp.] <Pm>
63. *P. natans* L. - Р. плавающий = I(M); II(ВП): (Плюрирег.); Ac(K); [Sp.] <Pm>

Сем. 22. RUPPIACEAE Hutch. – РУППИЕВЫЕ

64. *Ruppia maritima* L. (*R. brachypus* J.Gay.) - Руппия приморская = II(Кизл): (Плюрирег.); Ac(K); [Sp.]

65. *R. spiralis* L. ex Dumort. (*R. cirrhosa* (Petanga) Grande) - Р. спиральная = IV(Касп): (Плюрирег.); Ас(К); [R.]
Сем. 23. ZANNICHELLIACEAE Dumort. – ЗАННИКЕЛИЕВЫЕ
66. *Zannichellia palustris* L. - Занникелия болотная = I(М); II(Кизл); III(ЧО); IV(БН): (Плюрирег.); Ас(К); [Sp.]
67. *Z. pedunculata* Reichenb. - З. стебельчатая = II(ВП): (Палеаркт.); Ас(К); [Sp.]
Сем. 24. NAJADACEAE Juss. – НАЯДОВЫЕ
68. *Najas marina* L. – Наяда морская = II(Кизл): (Голаркт.); Ас(Т); [Sp]
69. *Caulinia minor* (All.) Coss. et Germ. (*Najas minor* All.) - Каулиния малая = II(Кизл): (Плюрирег.); Ас(К); [R.]
Сем. 25. ALISMATACEAE Vent. – ЧАСТУХОВЫЕ
70. *Alisma plantago-aquatica* L. - Частуха подорожниковая = I(М); II(ВП); III(ЧО): (Палеаркт.); Аа(К); [Pl.] <Pm>
71. *A. lanceolatum* With. - Ч. ланцетная = II(Кизл): (Палеаркт.); Аа(К); [Pl.]
72. *A. gramineum* Lej. (*A. loeselii* Gorsky; *A. arcuatum* Michal.) - Ч. злаковая = I(М - Терек); II(Кизл): (Палеаркт.); Аа(К); [R.]
73. *Sagittaria sagittifolia* L. - Стрелолист стрелолистный = II(Кизл): (Палеаркт.); Аа, Ab, Ас(К); [R.]
Сем. 26. BUTOMACEAE Rich. – СУСАКОВЫЕ
74. *Butomus umbellatus* L. - Сусак зонтичный = I(М); II(ВП); III(Ч): (Палеаркт.); Ab(К); [R.] <Pm>
Сем. 27. HYDROCHARITACEAE Juss. – ВОДОКРАСОВЫЕ
75. *Hydrocharis morsus-ranae* L. - Водокрас лягушечий = II(ВП): (Палеаркт.); Ас(Т); [Sp.] <Pm>
Сем. 28. POACEAE Barnhart – МЯТЛИКОВЫЕ (ЗЛАКОВЫЕ)
76. *Imperata cylindrica* (L.) Raesch. - Императа цилиндрическая = I(М); II(ВП): (Общедр. средиз.); Db(НК); [Sp.] <Po>
77. *Erianthus ravennae* (L.) Beauv. - Эриантус Равенны = I(М); II(ВП): (Вост. др. средиз.); Аа(К); [R.]
78. *Botriochloa ischaemum* (L.) Keng (*Andropogon ischaemum* L.) - Бородач кровеостанавливающий = I(М); III(ЧО): (Общедр. средиз.); ST(НК); [Soc.] <Pp>
79. *Zea mays* L. – Кукуруза обыкновенная = I(М); II(ВП); III(СКТ, Тер); IV(БН): (Адвент. [Центр. Америка]); Ra, Rb(Т); [Pl.]
80. *Sorghum halepense* (L.) Pers. - Сорго гумай = I(М); II(Кизл); III(ЧО): (Общедр. средиз.); Rb(НК); [Pl.] <Pp>
81. *S. sudanense* (Piper) Stapf – С. суданское = I(М); II(ВП); III(СКТ, Тер); IV(БН): (Средиз.); Ra, Rb(Т); [Sp.]
82. *S. technicum* (Koern.) Batt. et Trab. – С. техническое = I(М); II(ВП); III(СКТ, Тер); IV(БН): (Средиз.); Ra, Rb(Т); [Sp.]
83. *S. saccharatum* (L.) Moench – С. сахарное = I(М); II(ВП); III(СКТ, Тер); IV(БН): (Адвент. [Юго-Вост. Азия]); Ra, Rb(Т); [Sp.]
84. *S. bicolor* (L.) Moench – С. двуцветное = Все районы: (Адвент. [Юго-Вост. Азия]); Ra, Rb(Т); [Sp.]

85. *S. cernuum* (Ard.)Host – С. поникающее = I(M); II(ВП); (Средиз.); Ra,Rb(T); [R.]
86. *Tragus racemosus*(L.)All. - Трагус кистевидный I(M); II(КН); III(ЧО): (Зап.др.средиз.); Db,Ra(T); [Pl.]
87. *Eriochloa succincta* (Trin.)Kunth – Шерстняк перехваченный = II(Кизл): (Туранск.); Rb(T); [R.]
88. *Digitaria ischaemum*(Schreb.)Muehl (*D. linearis*(L.)Crep.) – Р. кровеостанавливающая = II(ВП); III(ЧО): (Палеаркт.); Db,Rb(T); [Sp.]
89. *D. aegyptiaca*(Retz.)Willd. - Р. египетская = I(M); III(ЧО); IV(БН): (Субсредиз*.); Db,Rb(T); [Sp.]
90. *D. sanguinalis*(L.)Scor. - Р. кровавая = Все районы: (Плюрирег.); Ra,Rb(T); [Pl.]
91. *D. rectiniformis*(Henrard)Tzvel. - Р. гребенчатая = I(M); II(ВП): (Субсредиз*.); Db(T); [R.]
92. *D. caucasica* Henr. – Р. кавказская = I(M – Терек); III(СКТ): (Кавк.); Rb(T); [R.]
93. *Echinochloa crusgalli*(L.)Beauv. (*E. caudata* Roshev.) - Куриное просо обыкновенное = I(M); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Плюрирег.); Ra,Rb(T); [Pl.]
94. *E. oryzoides*(Ard.)Fritsch - К.п. рисовидное = II(Кизл): (Адвент.[Дальний Восток]); Ab,Ra(T); [R.]
95. *E. phyllopon*(Stapf)Kossenko (*E. oryzicola* (Vasing.)Vasing.) - К.п. волосистостлистное = II(Кизл): (Адвент.[Китай]); Ab,Ra(T); [R.]
96. *Panicum miliaceum* L. – П. посевное = Все районы: (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Sp.]
97. *Setaria verticillata*(L.)Beauv. (*S. pycnostoma* (Steud.)Hernard ex Nakai) - Щетинник мутовчатый = I(M); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.]
98. *S. italica* (L.)Beauv. (*S. germanica* (Mill.)Beauv.) – Щ. итальянский (Могар, Чумиза) = Все районы: (Адвент.[Юго-Вост.Азия]); Ra,Rb(T); [Sp.]
99. *S. pumila*(Poir.)Schult. (*S. glauca*(L.)Beauv.) - Щ. низкий = I(M); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Плюрирег.); Ra,Rb(T); [Pl.]
100. *S. viridis*(L.)Beauv. - Щ. зелёный = I(M); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Плюрирег.); Ra,Rb(T); [Pl.]
101. *Leersia oryzoides*(L.)Sw. - Леерсия рисовидная = III(ЧО): (Голаркт.); Ab(НК); [R.]
102. *Phalaroides arundinacea*(L.)Rauschert (*Digraphis arundinaceae*(L.)Trin.) - Двукосточник тростниковый = I(M); II(Кизл); III(ЧО): (Голаркт.); Aa(K); [R.]
103. *Anthoxanthum odoratum* L. (*A. alpinum* A. et D.Love) - Душистый колосок обыкновенный = III(Тер): (Евро-Сиб.); Pb(НК); [Sp.] <Pa>
104. *Stipa caucasica* Schmalh. - Ковыль кавказский = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Ирано-Туран.); Da(НК); [R.]
105. *S. lessingiana* Trin.et Rupr. - К. Лессинга = Все районы: (Субтуран*.); ST(НК); [Pl.]

106. *S. borystenica* Klok. ex Prokud. – К. днепровский = I(М); II(ВП): (Понтич.); ST(НК); [Sp.]
107. *S. tirsia* Stev. (*S. longifolia* Borb.; *S. stenophylla* (Lindem.) Trautv.) - К. пирамидальный = II(КН); III(ТС): (Субсредиз*.); ST(НК); [Sp.]
108. ★ *S. pennata* L. (*S. joannis* Celac.) - К. перистый = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Субтуран*.); ST,Db(НК); [Pl.] <Pm>
109. ★ *S. pulcherrima* C.Koch - К. красивейший = Все районы: (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.]
110. *S. daghestanica* Grossh. – К. дагестанский = IV(БН): (Эукавк.); ST(НК); [R.] <EsubE>
111. *S. capillata* L. – К. волосатик = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); ST(НК); [Sp.]
112. *S. sareptana* A.Beck. - К. сарептский = II(ВП): (Субтуран*.); ST,Db(НК); [R.]
113. *S. caspia* C.Koch - К. каспийский = II(ВП): (Туранск.); Db(НК); [Sp.]
114. *Achnatherum caragana* (Trin. et Rupr.) Nevski (*Stipa caragana* Trin., *Lasiagrostis caragana* (Trin.) Trin. et Rupr.) – Ч. карагана = IV(БН): (Туранск.); ST(НК); [Sp.]
115. *Piptatherum virescens* (Trin.) Boiss. (*Oryzopsis virescens* (Trin.) G.Beck) - Пиптатерум зеленоватый = I(М); II(КН); III(СКТ); IV(БН): (Вост.др.средиз.); S(НК); [Sp.]
116. *Milium effusum* L. - Бор развесистый = III(Тер): (Голаркт.); S(НК); [Sp.]
117. *M. vernale* Vieb. – Б. весенний = II(Кизл); III(ЧО); IV(БН): (Субсредиз*.); Pa(T); [Sp.]
118. *Crypsis aculeata* (L.) Ait. - Скрытница колючая = I(М); II(ВП); III(СКТ): (Зап.др.средиз.); Dd(T); [Sp.]
119. *C. schoenoides* (L.) Lam. (*Heleochloa schoenoides* (L.) Host. ex Roem.) – С. камышевидная = I(М); II(ВП); III(СКТ): (Зап.др.средиз.); Dc,Dd,Aa(T); [Sp.]
120. *C. alopecuroides* (Pill. et Mitt.) Schrad. (*H. alopecuroides* (Pill. et Mitt.) Host. ex Roem.) - С. лисохвостная = I(М); II(Кизл): (Зап.др.средиз.); Dc,Dd,Aa(T); [Sp.]
121. *Phleum pratense* L. - Тимофеевка луговая = III(СКТ,Тер): (Палеаркт.); Pa,Pb(НК); [Pl.]
122. *Ph. paniculatum* Huds. - Т. метельчатая = I(М); II(Кизл); III(СКТ); IV(БН): (Зап.др.средиз.); ST(T); [Sp.]
123. *Ph. phleoides* (L.) Karst. - Т. степная = Все районы: (Палеаркт.); ST(НК); [Pl.]
124. *Ph. montanum* C.Koch - Т. горная = III(Тер): (Кавк.); Pa(НК); [Sp.]
125. *Ph. nodosum* L. (*P. bertolonii* DC.) - Т. узловатая = II(Кизл); III(СКТ,Тер); IV(БН): (Палеаркт.); Pa,ST,Db(НК); [Sp.]
126. *Ph. alpinum* L. – Т. альпийская = III(Тер): (Голаркт.); Pb(НК); [Pl.]
127. *Alopecurus vaginatus* (Willd.) Pall. ex Kunth - Лисохвост влагищный = III(Тер): (Общедр.средиз.); Pb(НК); [Sp.]

128. *A. dasyanthus* Trautv. (*A. laguroides* Bal.) – Л. пушистоцветковый = III(Тер): (Кавк.); Do(НК); [Pl.]
129. *A. tifiensis*(Westb.)Grossh. – Л. тифлисский = III(BC): (Кавк.); Pb(НК); [Sp.]
130. *A. glacialis* C.Koch (*A. ponticus* C.Koch) - Л. ледниковый = III(Тер): (Кавк.); Pb(НК); [Pl.]
131. *A. myosuroides* Huds. – Л. мышехвостниковый = I(М); II(Кизл): (Зап.др.средиз.); Aa(T); [R.]
132. *A. aequalis* Sobol. - Л. равный = Все районы: (Палеаркт.); Aa(T); [Sp.]
133. *A. arundinaceus* Poir. (*A. ventricosus* Pers.) - Л. тростниковый = I(М); II(ВП); III(ЧО): (Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.]
134. *Polypogon monspeliensis*(L.)Desf. - Многобородник монспелиенский = I(М - Терек); II(КН - Киссык,Кизл); III(ЧО - Сунжа); IV(БН): (Общедр.средиз.); Aa(T); [R.]
135. *P. viridis*(Gouan)Breistr. (*P. semiverticillatus*(Forsk.)Hyl.) – М. зелёный = IV(БН): (Ирано-Туран.); Aa(НК); [R.]
136. *Agrostis planifolia* C.Koch - Полевица плосколистная = III(Тер): (Субкавказ*.); S,Pb(НК); [Sp.]
137. *A. vinealis* Schreb. (*A. tenuifolia* Bieb.; *A. marschalliana* Seredin) - П. виноградниковая = III(Тер): (Понтич.); Pb(НК); [Pl.]
138. *A. stolonifera* L. (*A. marcantha* Schischk.) - П. корневищная = Все районы: (Голаркт.); Aa(НК); [Sp.]
139. *A. tenuis* Sibth. (*A. capillaris* L.) - П. тонкая = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Евро-Сиб.); Pa(НК); [Pl.]
140. *A. gigantea* Roth (*A. alba* L.) - П. гигантская = Все районы: (Голаркт.); Aa(НК); [Sp.]
141. *Pentatherum ruprechtii*(Nevski)Nevski (*Calamagrostis olympicum* Boiss.) – П. Рупрехта = IV(БН): (Эукавказ.); Pс,Aa(НК); [R.]
142. *Calamagrostis epigeios*(L.)Roth - Вейник наземный = Все районы: (Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.]
143. *C. pseudophragmites*(Hall fil.)Koel. - В. ложнотростниковый = III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); Aa(НК); [Pl.]
144. *C. arundinacea*(L.)Roth – В. тростниковый = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Палеаркт.); Pb(НК); [Sp.]
145. *C. caucasica* Trin – В. кавказский = III(Тер): (Эукавказ.); Pс,Do(НК); [Pl.] <EsubE>
146. *Arera spica-venti*(L.)Beauv. - Метлица обыкновенная = II(ВП): (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [R.]
147. *A. interrupta*(L.)Beauv. - М. прерывистая = I(М); II(КН): (Общедр.средиз.); Ra(T); [R.]
148. *Holcus lanatus* L. - Бухарник шерстистый = III(Ч): (Европ.); Pa(НК); [Sp.]
149. *Avenella flexuosa* (L.)Drej. (*Deschampsia flexuosa*(L.)Nees) – Авенелла извилистая = III(Тер): (Голаркт.); Pb,Pс(НК); [Pl.]

150. *Deschampsia caespitosa*(L.)Beauv. = Луговик дернистый = III(Тер): (Голаркт.); Pb, Pc(НК); [Pl.]
151. *Trisetum flavescens*(L.)Beauv. (*T. pratense Pers.*) - Трищетинник желтоватый = III(СКТ, Тер); IV(БН): (Европ.); Pa(НК); [Sp.]
152. *T. turcium* Chrtek (*T. sibiricum auct.*) – Т. турецкий = III(Тер): (Субкавказ*.); Pb(НК); [Sp.]
153. *T. ovatipaniculatum*(Hult.)Galushko (*T. spicatum auct.*) – Т. яйцевиднометельчатый = III(Тер): (Евро-Кавк.); Pc(НК); [Sp.]
154. *T. rigidum*(Bieb.)Roem.et Schult. – Т. жёсткий = III(СКТ, Тер); IV(БН): (Армено-Иран.); Pa(НК); [Sp.]
155. *T. buschianum* Seredin – Т. Буша = III(Тер): (Эукавказ.); Pb, Pc, Do(НК); [Sp.]
156. *T. parvispiculatum*(Tzvel.)Probatova = Т. короткоколосковый = III(Ч); IV(БН): (Субтуран*); Pa(НК); [Sp.]
157. *Trisetaria cavanillesii*(Trin.)Maire (*Trisetum cavanillesii Trin.*) - Трисетария Каванилля = I(М - Терские пески); II(КН): (Общедр.средиз.); Db(Т); [Sp.]
158. *Ventenata dubia*(Leers)Coss. - Вентената сомнительная = I(М); III(ЧО): (Зап.др.средиз.); S(Т); [Sp.]
159. *Avena eriantha* Durieu (*A. pilosa*(Roem. et Schult.)Bieb.) – Овёс пушистоцветковый = I(М); II(КН[Цвелёв, 1976]); IV(БН): (Средиз.); Ra, Rb(Т); [Sp.]
160. *A. fatua* L. – О. пустой, Овсяг = I(М); II(Кизл); III(СКТ); IV(БН): (Голаркт.); Ra, Rb(Т); [Sp.]
161. *A. sativa* L. – О. посевной = Все районы: (Плюрирег.); Ra, Rb(Т); [Sp.]
162. *A. persica* Steud. (*A. ludoviciana Durieu*) - О. персидский = I(М); II(Кизл); III(ЧО): (Общедр.средиз.); Ra, Rb(Т); [Sp.]
163. *Helictotrichon armeniacum*(Schischk.)Grossh. (*H. pratense auct.*) – Овсец армянский = III(Тер); IV(БН): (Субкавказ*.); Pa(НК); [Sp.]
164. *H. adzharicum*(Albov)Grossh. (*H. asiaticum auct.*) – О. аджарский = III(Тер): (Субкавказ*.); Pb, Pc(НК); [Pl.]
165. *H. pubescens*(Huds.)Pilg. – О. опушённый = III(СКТ, Тер); IV(БН): (Евро-Сиб.); Pa(НК); [Pl.]
166. *Arrhenatherum elatius*(L.)J.et C.Presl - Французский райграсс высокий = III(СКТ, Тер); IV(БН): (Европ.); Pa(НК); [Sp.] <Pr>
167. *Cynodon dactylon*(L.)Pers. - Свиной пальчатый = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Общедр.средиз.); ST, Ra, Rb(НК); [Pl.] <Pr; Pm>
168. *Sesleria phleoides* Stev. ex Roem. et Schult. – С. тимофеевковидная = III(СКТ, Тер); IV(БН): (Субкавказ*.); Da(НК); [Sp.]
169. *Phragmites australis*(Cav.)Trin.ex Steud. (*Ph. communis Trin.*) - Тростник южный = Все районы: (Плюрирег.); Aa, Ab(К); [Pl.] <Pm>
170. *Ph. altissimus* (Benth.)Nabille – Т. высочайший = II(Кизл): (Палеаркт.); Aa, Ab(К); [Pl.]
171. *Cleistogenes serotina*(L.)Keng. (*D. serotina*(L.)Link) - З. поздняя = I(М): (Средиземн.); ST, Pa(НК); [R.]

172. *C. bulgarica*(Bornm.)Keng (*D. bulgarica*(Bornm.)Bornm., *Cleistogenes maotica* Klok.et Zoz) - 3. болгарская = I(М); II(КН); III(ТС); IV(БН): (Понт.-Южносиб.); ST,Db(НК); [Sp.]
173. *Molinia caerulea*(L.)Moench – Молиния голубая = III(Тер): (Палеаркт.); Pb(НК); [Sp.]
174. *M. litoralis* Host – М. прибрежная = III(Ч): (Европ.); Aa(НК); [R.]
175. *Boriskellera arundinacea* (L.)Terechov (*Eragrostis collina* Trin.; *E. arundinacea*(L.)Roshev.) – Борискеллера тростниковая = I(М); II(ВП); IV(БН): (Субтуран*.); ST,Dc(НК); [Sp.]
176. *Eragrostis minor* Host. - Полевичка малая = Все районы: (Голаркт.); ST,Ra(T); [Sp.]
177. *Koeleria caucasica*(Domin)V.Fedtsch. - Тонконог кавказский = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Вост.др.средиз.); Pb(НК); [Sp.]
178. *K. cristata*(L.)Pers. (*K. gracilis* Pers.) - Т. гребенчатый = Все районы: (Голаркт.); ST(НК); [Pl.] <Pp>
179. *Melica transsilvanica* Schur - Перловник трансильванский = I(М); II(ВП); III(СКТ,Тер); IV(БН): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.]
180. *M. taurica* C.Koch - П. крымский = I(М); II(СКТ); IV(БН): (Вост.др.средиз.); ST(НК); [Sp.]
181. *M. altissima* L. - П. высокий = I(М); III(ЧО): (Субтуран*.); Pa(НК); [Sp.]
182. *M. uniflora* Retz. - П. одноцветковый = III(Ч): (Европ.); S(НК); [Sp.]
183. *M. nutans* L. - П. поникающий = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Евро-Сиб.); S(НК); [Sp.]
184. *M. picta* C.Koch - П. пёстрый = I(М); III(ЧО); IV(БН): (Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]
185. *Briza media* L.– Т. средняя = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Европ.); Pa,Pb(НК); [Pl.]
186. *Aeluropus littoralis*(Gouan)Parl. - Прибрежница обыкновенная = II(ВП): (Общедр.средиз.); Dc(НК); [Sp.]
187. *Ae. pungens*(Bieb.)C.Koch - П. колючая = II(ВП): (Субтуран*.); Dc(НК); [R.]
188. *Dactylis glomerata* L. - Ежа сборная = I(М); II(ВП); III(СКТ,Тер); IV(БН): (Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pp>
189. *D. polygama* Horvat. - Е. многобрачная = III(СКТ,Тер): (Европ.); S(НК); [Pl.] <Pp>
190. *Sclerochloa dura*(L.)Beauv. - Жесткоколосница твёрдая = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Общедр.средиз.); Rb(T); [Pl.]
191. *Poa bulbosa* L. - Мятлик луковичный = I(М); II(ВП); III(СКТ,Тер): (Палеаркт.); ST,Rb(НК:eph); [Pl.]
192. *P. crispa* Thuill. - М. курчавый = Все районы: (Палеаркт.); ST,Rb(НК:eph); [Pl.]
193. *P. annua* L. - М. однолетний = I(М); II(ВП); III(СКТ,Тер): (Плюрирег.); Rb(T); [Pl.]
194. *P. iberica* Fisch. et C.A. Mey. – М. грузинский = III(Тер): (Кавк.); Pb(НК); [Pl.] <Pp>

195. *P. longifolia* Trin. – М. длиннолистный = III(Тер): (Эукавк.); Pb(НК); [Sp.]
196. *P. trivialis* L. - М. обыкновенный = Все районы: (Палеаркт.); Pa, Aa(НК); [Pl.]
197. *P. sylvicola* Guss. - М. лесной = II(Кизл); III(СКТ, Тер); IV(БН): (Зап.др.средиз.); S(НК); [Sp.]
198. *P. pratensis* L. - М. луговой = Все районы: (Голаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pp>
199. *P. angustifolia* L. - М. узколистный = Все районы: (Палеаркт.); Pa, ST(НК); [Sp.] <Pp>
200. *P. palustris* L. - М. болотный = II(Кизл); III(ЧО); IV(БН): (Голаркт.); Aa(НК); [Sp.]
201. *P. nemoralis* L. - М. боровой = III(СКТ, Тер): (Панбор.); S(НК); [Pl.]
202. *P. meyeri* Trin. ex Roshev. – М. Мейера = III(BC): (Кавк.); Pc, Aa(НК); [Sp.]
203. *P. primae* Tzvel. – М. Примы = III(BC): (Эукавк.); Do(НК); [R.] <Esub>
204. *P. glauca* Vahl. – М. сизый = III(BC): (Голаркт.); Pc(НК); [Sp.]
205. *P. compressa* L. – М. сплюснутый = III(ЧО): (Европ.); Pa(НК); [Sp.]
206. *P. alpina* L. – М. альпийский = III(СКТ, Тер): (Голаркт.); Pb, Pc(НК); [Pl.]
207. *P. badensis* Haenke (*P. alpina auct.*) - М. баденский = III(Тер): (Голаркт.); Pa(НК); [Pl.]
208. *Catabrosella variegata*(Boiss.)Tzvel. (*Colpodium variegatum*(Boiss.)Griseb.) – Катабросочка пёстрая = III(BC): (Субкавк*.); Pc(НК); [Sp.]
209. *C. humilis*(Bieb.)Tzvel. (*Colpodium humile*(Bieb.)Griseb.) – К. низкая = III(ТС): (Субтуран*.); Db(НК); [R.]
210. *Colpodium versicolor*(Stev.)Schmalh. – Кольподиум разноцветный = III(Тер): (Кавк.); Pb(НК); [Sp.]
211. *Catabrosa pseudoairoides* (Herrm.)Tzvel. – Поручейница ложноаировидная = II(Кизл): (Субкавк*.); Aa(НК); [R.]
212. *C. aquatica*(L.)Beauv. – П. водная = Все районы: (Голаркт.); Aa(НК); [Pl.]
213. *Glyceria fluitans*(L.)R.Br. - Манник наплывающий = III(СКТ); IV(БН): (Панбор.); Aa(НК); [Sp.]
214. *G. notata* Chevall. (*G. plicata*(Fries)Fries, *G. acutiuscula* H.Scholz) - М. складчатый = III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.]
215. *G. nemoralis*(Uechtr.)Uechtr.et Koern. - М. дубравный = III(Ч): (Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]
216. *G. arundinacea* Kunth - М. тростниковый = I(М): (Палеаркт.); Aa(НК); [R.]
217. *G. maxima*(С.Hartm.)Holub (*G. aquatica*(L.)Wachlenb.) - М. большой = I(М): (Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.]
218. *Ruccinellia choresmica* V. Krecz. (*Atropis choresmica* Krecz.) – Бескильница хорезмская = II(Кизл): (Туранск.); Db(НК); [R.]
219. *P. distans*(Jacq.)Parl. (*A. distans*(Jacq.)Griseb.) – Б. расставленная = I(М); II(ВП); IV(БН): (Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.]

220. *P. gigantea*(Grossh.)Grossh. (*A. gigantea* Grossh.) - Б. крупная = III(Ч); IV(БН): (Туранск.); Аа,Дс(НК); [R.]
221. *P. dolicholepis* V.Krecz. (*A. dolicholepis* V. Krecz., *A. convoluta* (Horntm.)Griseb.) - Б. длинночешуйчатая = II(ВП): (Субтуран*.); Аа,Дс(НК); [Sp.]
222. *P. poëcilantha*(С.Koch)Grossh. (*A. poëcilantha* (С.Koch)Grossh.) - Б. пестроцветковая = II(КН): (Туранск.); Аа,Дс(НК); [Sp.]
223. *Festuca ovina* L. - Овсяница овечья = Все районы: (Европ.); ST(НК); [Sp.] <Pp>
224. *F. ruprechtii*(Boiss.)V.Krecz. et Bobr. – О. Рупрехта = III(BC): (Евро-Кавк.); Pс(НК); [Sp.]
225. *F. primaе* E.Alexeev – О. Примы = III(BC): (Эукавк.); Pс(НК); [R.] <Esub>
226. *F. airoides* Lam. (*F. supina* Schur) – О. приземистая = III(BC): (Голаркт.); Pс(НК); [Sp.]
227. *F. buschiana*(St.-Yves)Tzvel. (*F. frigida*(Hack.)Grossh.) – О. Буша = III(BC): (Эукавк.); Pс,Do(НК); [Sp.]
228. *F. valesiaca* Gaudin (*F. sulcata* (Hack.)Nym.) - О. валезская = Все районы: (Палеаркт.); ST(НК); [Pl.] <Pp>
229. *F. musbelica* (Reverd.)Ikonn. – О. мусбельская = III(BC): (Субтуран.*); Pс(НК); [R.]
230. *F. brunnescens*(Tzvel.)Galushko – О. буроватая = III(Тер): (Эукавк.); ST(НК); [Pl.]
231. *F. saxatilis* Schur. (*F. laevis auct.*) – О. скальная = III(Тер): (Субсредиз*.); Do(НК); [Sp.]
232. *F. daghestanica* (Tzvel.)E.Alexeev – О. дагестанская = III(BC): (Эукавк.); Do(НК); [R.] <Esub>
233. *F. rubra* L. - О. красная = III(Тер): (Палеаркт.); Pб,Pс(НК); [Sp.]
234. *F. rupicola* Neuff. – О. наскальная = III(Тер): (Палеаркт.); Do(НК); [Sp.]
235. *F. woronowii* Hack. (*F. varia auct.*) – О. Воронова = III(BC): (Кавк.); Pб(НК); [Pl.]
236. *F. pratensis* Huds. - О. луговая = Все районы: (Палеаркт.); Pа,ST(НК); [Pl.] <Pp>
237. *F. regeliana* Pavl. (*F. orientalis*(Hack.)V.Krecz.et Bobr.; *F. arundinaceae* Schreb.) - О. Регеля = I(М); II(ВП); III(СКТ,Тер); IV(БН): (Палеаркт.); Pа(НК); [Sp.]
238. *F. drymeia* Mert.et Koch (*F. montana* Vieb.) - О. горная = III(СКТ,Тер): (Субкавк*.); S(НК); [Pl.]
239. *F. gigantea*(L.)Vill. – О. исполинская = III(СКТ,Тер): (Палеаркт.); S(НК); [Pl.]
240. *F. altissima* All. (*F. sylvatica*(Poll.)Holub) - О. высокая = III(Ч): (Палеаркт.); S(НК); [Sp.]
241. *Vulpia myuros*(L.)С.С.Gmel. – В. мышехвостниковая = III(ЧО): (Общедр.средиз.); ST(НК); [R.]

242. *Bromopsis benekenii*(Lange)Holub (*Zerna benekenii*(Lange)Lindm.) - Кострец Бенекена = III(Ч): (Палеаркт.); S(НК); [Sp.]
243. *B. inermis*(Leyss.)Holub (*Z. inermis*(Leyss.)Lindm.) – К. безостый = I(М); II(ВП); III(СКТ,Тер); IV(БН): (Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pp>
244. *B. biebersteinii*(Roem.et Schult)Holub (*Z. biebersteinii*(Roem. et Schult.)Holub) - К. Биберштейна = III(BC): (Кавк.); Da(НК); [Sp]
245. *B. variegata*(Bieb.)Holub (*Z. variegata*(Bieb.)Nevski) - К. пёстрый = III(Тер): (Ирано-Туран.); Pb,Рс(НК); [Sp.] <Pp>
246. *B. riparia*(Rehm.)Holub (*Z. riparia*(Rehm.)Nevski) - К. береговой = I(М); II(ВП); III(СКТ,Тер); IV(БН): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.] <Pp>
247. *Anisantha sterilis*(L.)Nevski (*Bromus sterilis* L., *Zerna sterilis*(L.)Panz.) - Анизанта стерильная = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Общедр.средиз.); ST,Rb(Т:eph); [Sp.]
248. *A. tectorum*(L.)Nevski (*B. tectorum* L., *Z. tectorum*(L.)Lindm.) - А. кровельная = Все районы: (Голаркт.); ST,Ra,Rb(Т:eph); [Sp.]
249. *Bromus arvensis* L. – К. полевой = III(ТС); IV(БН): (Европ.); Pa,ST(Т); [Sp.]
250. *B. racemosus* L. – К. кистистый = II(ВП): (Европ.); Db,Ra(Т); [R.]
251. *B. squarrosus* L. - К. растопыренный = Все районы: (Средиземн.); ST,Rb(Т); [Sp.]
252. *B. japonicus* Thunb. - К. японский = Все районы: (Палеаркт.); ST,Ra(Т); [Sp.]
253. *B. commutatus* Schrad. - К. переменчивый = Все районы: (Европ.); Pa(Т); [Sp.]
254. *B. mollis* L. - К. мягкий = Все районы: (Голаркт.); Pa,Ra(Т); [Sp.]
255. *B. scorarius* L. - К. метельчатый = III(ЧО): (Вост.др.средиз.); Aa,Rb(Т); [Pl.]
256. *Brachypodium sylvaticum*(Huds.)Beauv. - Коротконожка лесная = III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); S(НК); [Pl.]
257. *B. pubescens* (Peterm.)S.G.Mussajev – К. пушистая = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]
258. *B. pinnatum*(L.)Beauv. - К. перистая = III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); S(НК); [Sp.]
259. *B. rupestre*(Host.)Roem.et Schult - К. скальная = III(СКТ); IV(БН): (Евро-Кавк.); S(НК); [R.]
260. *Nardus stricta* L. (*N. glabriculmis Sacalo*) – Белоус торчащий = III(Тер): (Голаркт.); Рс(НК); [Pl.]
261. *Lolium temulentum* L. - Плевел опьяняющий = II(Кизл): (Палеаркт.); Ra(Т); [R.]
262. *L. persicum* Boiss.et Hohen. - П. персидский = III(ЧО): (Ирано-Туран.); Db,Rb(Т); [Sp.]
263. *L. rigidum* Gaudin - П. жёсткий = II(Кизл); III(СКТ): (Зап.др.средиз.); ST,Db(Т); [Sp.]
264. *L. perenne* L. (*L. marschallii* Stev.) - П. многолетний = Все районы: (Голаркт.); Pa,Rb(НК); [Sp.] <Pp>

265. *Pholiurus pannonicus*(Host)Trin. (*Lepturus pannonicus* (Host)Kunth.) - Чешуехвостник венгерский = II(КН): (Субтуран*.); Dc(T); [R.]
266. *Elymus caninus*(L.)L. (*Roegneria canina*(L.)Nevski; *Elytrigia canina*(L.)Drob.; *Agropyron caninum*(L.)Beauv.) - Пырейник собачий = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Палеаркт.); S(НК); [R.]
267. *E. prokudinii*(Seredin)Tzvel. (*R. prokudinii* Seredin) – П. Прокудина = III(Тер); IV(БН): (Эукавк.); S(НК); [R.] <EsubE>
268. *Elytrigia trichophora*(Link)Nevski (*Agropyron trichophorum*(Link)K.Richt.) - Пырей волосоносный = III(Ч); IV(БН): (Вост.др.средиз.); Pa,ST(НК); [Sp.] <Pp>
269. *E. intermedia*(Host)Nevski (*A. intermedium* (Host)Beauv.) - П. средний = Все районы: (Общедр.средиз.); ST(НК); [Sp.] <Pp>
270. *E. repens*(L.)Nevski (*A. repens*(L.)Beauv.) - П. ползучий = Все районы: (Палеаркт.); Pa,ST,Ra,Rb(НК); [Pl.] <Pm;Pp>
271. *E. elongata*(Host)Nevski (*E. obtusiflora* (DC.)Tzvel.; *A. elongatum* (Host)Beauv.) - П. удлинённый = I(М); II(ВП); III(ЧО); IV(БН): (Средиземн.); Dc(НК); [Sp.] <Pp>
272. *E. gracillima*(Nevski)Nevski (*A. gracillimum* Nevski) - П. стройный = III(ЧО); IV(БН): (Эукавк.); Da(НК); [R.]
273. ★*E. stipifolia*(Czern.ex Nevski)Nevski (*A. stipifolium* Czern. ex Nevski) - П. ковылелистный = III(BC): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [R.]
274. *E. pseudocesia*(Pacz.)Prokud. (*A. pseudocesium*(Pacz.)Zoz) - П. ложносивоватый = I(М): (Понт.-Южносиб.); Pa,Dc(НК); [Sp.] <Pp>
275. *E. elongatiformis* (Drob.)Nevski (*E. maeotica*(Prokud.)Prokud.; *A. maeoticum* Prokud.) - П. удлинённовидный = II(КН): (Туранск.); Rb(НК); [Sp.] <Pp>
276. *Agropyron sibiricum* (Willd.)Beauv. (*A. fragile*(Roth)P.Gandardy) - Житняк сибирский = I(М); II(ВП); III(ТС): (Понтич.); Db,Dd(НК); [Pl.] <Pp>
277. *A. tanaiticum* Nevski – Ж. донской = II(ВП): (Понтич.); Db(НК); [R.]
278. *A. desertorum*(Fisch.ex Link)Schult. - Ж. пустынный = II(Кизл); III(ТС): (Понтич.); Da,Dd(НК); [Sp.] <Pp>
279. *A. rectinatum*(Vieb.)Beauv. (*A. imbricatum* Roem.et Schult.) - Ж. гребневидный = Все районы: (Палеаркт.); ST(НК) [Pl.] <Pp>
280. *A. dagnae* Grossh. – Ж. Дагны = II(КН); III(СКТ): (Кавк.); ST(НК); [R.]
281. *Eremopyrum triticeum*(Gaertn.)Nevski - Мортук пшеничный = I(М); II(Кизл); IV(БН): (Субтуран*.); Dc(T); [Sp.]
282. *E. orientale*(L.)Jaub.et Spach - М. восточный = I(М); II(Кизл); III(ТС); IV(БН): (Общедр.средиз.); Db,Dc(T); [Sp.]
283. *Secale segetale* (Zhuk.)Roshev (*S. dighoricum* (Vav.)Roshev.) – Р. сорно-полевая = II(КН); III(BC); IV(БН): (Вост.др.средиз.); Rb(T); [R.]
284. *S. sylvestre* Host – Р. лесная = II(ВП): (Субтуран*.); Db(T); [Sp.] <Pp>
285. *S. cereale* L. - Р. посевная = II(ВП); III(СКТ); V(БН): (Туранск.); Ra,Rb(T); [Sp.] <Pp>

286. *Aegilops tauschii* Coss. (*Ae. squarrosa* L.) - Эгилопс Тауша = I(M); II(ВП): (Ирано-Туран.); ST,Rb(T); [Sp.]
287. *Ae. cylindrica* Host – Э. цилиндрический = I(M); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Субтуран*.); Pa,ST,Rb(T); [Pl.]
288. *Triticum durum* Desf. – П. твёрдая = Все районы: (Зап.др.средиз.); Ra,Rb(T); [Sp.]
289. *T. aestivum* L. – П. безостая = Все районы: (Зап.др.средиз.); Rb(T); [Sp.]
290. *Hordelymus europaeus*(L.)Harz - Горделимус европейский = III(ТС,Ч): (Европ.); S(НК); [R.]
291. *Hordeum violaceum* Boiss. et Huet – Я. фиолетовый = III(Тер): (Армено-Иран.); Pb(НК); [Pl.]
292. *H. leporinum* Link – Я. заячий = Все районы: (Вост.др.средиз.); Rb(T); [Pl.]
293. *H. geniculatum* All. (*H. hystrix* Roth) - Я. коленчатостебельный = II(ВП): (Субсредиз*.); Db,Dc,Dd(T); [Sp.]
294. *H. glaucum* Steud. - Я. сизый = II(ВП): (Вост.др.средиз.); Dc(T); [Sp.]
295. *H. distichon* L. – Я. двурядный = Все районы: (Плурирег.); Ra(T); [Sp.]
296. *H. vulgare* L. – Я. обыкновенный = Все районы: (Плурирег.); Ra(T); [Pl.]
297. *Psathyrostachys juncea*(Fisch.)Nevski (*Hordeum junceum* Fisch.) - Ломкоколосник ситниковый = II(КН - северная часть, Галушко, 1978): (Вост.др.средиз.); Dc(НК); [R.]
298. *Aneurolepidium ramosum*(Trin.)Nevski (*Leymus ramosus* (Trin.)Tzvel. *Elymus giganteus* Vahl.) – Вострец ветвистый = II(ВП): (Понтич.); Db(НК); [R.]
299. *Leymus racemosus*(Lam.)Tzvel. (*Elymus racemosus* Lam.) - Колосняк кистистый = II(КН): (Субтуран*.); Db(НК); [Pl.]
300. *L. sabulosus*(Bieb.)Tzvel. (*E. sabulosus* Bieb.) - К. шиловидный = II(КН): (Субтуран*.); Db(НК); [Pl.]
- Сем. 29. CYPERACEAE Juss. - СОКОЛОВЫЕ
301. *Cyperus flavescens*(L.)Beauv.ex Reichenb. – С. желтеющий = I(M); III(ЧО): (Голаркт.); Aa(T); [Sp.]
302. *Juncellus pannonicus*(Jacq.)Clarke (*Acorellus pannonicus*(Jacq.)Palla) - Ситничек венгерский = II(ВП): (Субтуран*.); Aa(T); [R.]
303. *J. serotinus*(Rottb.)Clarke (*Cyperus serotinus* Rottb.) – С. поздний = II(Кизл): (Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.]
304. *Cyperus longus* L. - С. длинная = II(КН - Киссык,Кизл): (Обшедр.средиз.); Aa(НК); [R.]
305. *C. glomeratus* L. - С. скупенная = I(M); II(ВП); III(ЧО): (Палеаркт.); Aa(T); [R.]
306. *C. glaber* L. – С. гладкая = II(Кизл); III(ЧО): (Вост.др.средиз.); Aa(T); [R.]
307. *C. fuscus* L. – С. чёрно-бурая = Все районы: (Палеаркт.); Aa(T); [Sp.]

308. *Scirpoides holoschoenus*(L.)Sojak (*Holoschoenus vulgaris* Link incl. *H. romanus*(L.)Fritsch) - Голосхенус обыкновенный = II(КН – Киссык, Кизл): (Общедр.средиз.); Аа(НК); [Sp.]
309. *Scirpus sylvaticus* L. – К. лесной = III(Тер): (Евро-Сиб.); S, Аа(НК); [Sp.]
310. *Isolepis setacea* (L.)R.Br. (*Schoenoplectus setaceus*(L.)Palla; (*Scyrpus setaceus* L.) - Шеноплектус щетинковидный = III(Ч): (Палеаркт.); Аа(Т); [Sp.]
311. *Schoenoplectus lacustris*(L.)Palla (*Scyrpus lacustris* L.) - Ш. озёрный = Все районы: (Панбор.); Ab(К); [Pl.]
312. *Sch. tabernemontanii*(C.C.Gmel.)Palla (*S. tabernemontanii* C.C.Gmel.) - Ш. Табернемонтана = Все районы: (Палеаркт.); Ab(К); [Sp.]
313. *Sch. triqueter*(L.)Palla (*S. triqueter* L.) - Ш. трёхгранный = II(ВП): (Голаркт.); Аа(НК); [Sp.]
314. *Sch. litoralis*(Schrad.)Palla (*S. litoralis* Schrad.) - Ш. приморский = II(ВП): (Туранск.); Аа(НК); [R.]
315. *Bolboschoenus glaucus* (Lam.)S.G.Sm. – Клубнекамыш сизый = I(М); II(ВП): (Палеаркт.); Аа(К); [Sp.]
316. *B. maritimus*(L.)Palla (*B. compactus*(Hoffm.)Drob.) – К. морской = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Голаркт.); Аа, Ab(К); [Pl.]
317. *Blymus compressus*(L.)Panz. ex Link – Блимус сжатый = III(Тер): (Палеаркт.); Pс, Аа(НК); [Pl.]
318. *Eleocharis quinqueflora*(F.X.Hartm.)O.Schwarz (*E. pauciflora*(Lightf.)Link) – Б олотница пятицветковая = III(Тер): (Голаркт.); Pс, Аа(НК); [R.]
319. *E. parvula*(Roem.et Schult.)Bluff, Nees et Schauer – Б. маленькая = II([Кизл:Егорова, 1991]): (Голаркт.); Аа(К); [R.]
320. *E. palustris*(L.)Roem.et Schult. (*E. eupalustris* Lindl. fil., *E. crassa* Fisch.et C.A.Mey. ex Zinserl.; *E. intersita* Zinserl.) - Б. болотная = Все районы: (Субтуран*.); Аа, Ab(К); [Sp.]
321. *E. uniglumis*(Link)Schult. (*E. multiseta* Zinserl.) - Б. одночешуйчатая = II(ВП): (Субтуран*.); Аа, Dс(НК); [R.]
322. *E. acicularis*(L.)Roem.et Schult. - Б. игольчатая = II(КН): (Голаркт.); Аа, Ab(К); [Sp.]
323. *Schoenus nigricans* L. - Схенус черноватый = II(Кизл): (Субсредиз*.); Аа(НК); [R.]
324. ★ *Cladium mariscus*(L.)Pohl - Меч-трава обыкновенная = II(Кизл): (Зап.др.средиз.); Ab(К); [Rs.]
325. *Kobresia schoenoides*(C.A.Mey.)Steud. – Кобрезия шенусовидная = III(BC): (Голаркт.); Pс(НК); [Pl.]
326. *K. macrolepis* Meinsh. (*K. capillifolia*(Decne)Clarke) – К. крупночешуйчатая = III(BC): (Кавк.); Pс(НК); [Pl.]
327. *K. persica* Kuk. et Bornm. (*K. humilis*(C.A.Mey. ex Trautv.)Serg.) – К. персидская = III(BC): (Субтуран*.); Pс(НК); [Sp.]
328. *Carex tristis* Vieb. (*C. meinshauseniana* V.Krecz.) – Осока печальная = III(BC): (Субкавк.*); Pb, Pс(НК); [Pl.]
329. *C. hirta* L. – О. волосистая = III(СКТ, Тер); IV(БН): (Европ.); Аа(К); [Sp.]

330. *C. rostrata* Stokes – О. носатая = III(BC): (Палеаркт.); Pb, Aa(НК); [Pl.]
331. *C. vesicaria* L. (*C. inflata* Huds.) - О. пузырьчатая = Все районы: (Палеаркт.); Ab(К); [Sp.]
332. *C. dichroa* Freyn (*C. pamirica* (O. Fedtsch.) O. et B. Fedtsch.) – О. двуцветная = III(BC): (Палеаркт.); Pс, Aa(НК); [R.]
333. *C. acutiformis* Ehrh. - О. островатая = I(М); II(ВП); III(СКТ): (Палеаркт.); Ab(К); [Pl.]
334. *C. riparia* Curt. - О. береговая = I(М); II(ВП); III(ЧО): (Палеаркт.); Ab(К); [Pl.]
335. *C. melanostachya* Bieb. ex Willd. - О. черноколосая = Все районы: (Палеаркт.); Aa(НК); [Pl.]
336. *C. songorica* Rfr. et Kir. – О. джунгарская = III(BC): (Ирано-Туран.); Pa, Aa(НК); [R.]
337. *C. pseudocyperus* L. - О. ложносыть = II(ВП): (Голаркт.); Ab(К); [R.]
338. *C. hordeistichos* Vill. - О. ячменорядная = [I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): Егорова, 1991]: (Субсредиз*.); Ab(К); [Sp.]
339. *C. michelii* Host. - О. Микели = Все районы: (Европ.); Pa(НК); [Pl.]
340. *C. transilvanica* Schur (*C. depressa* Link) - О. трансильванская = III(BC): (Субсредиз*.); S, Pa(НК); [R.]
341. *C. huetiana* Boiss. О. Юэта = III(BC): (Европ.); Pс(НК); [Pl.]
342. *C. caryophyllea* Latour. - О. гвоздичная = III(СКТ, Тер); IV(БН): (Палеаркт.); Pa, ST(НК); [Pl.]
343. *C. diluta* Bieb. - О. светлая = II(ВП); III(ЧО); IV(БН): (Туранск.); Ab(К); [Pl.]
344. *C. humilis* Leyss. (*C. buschiorum* V. Crecz.) - О. низкая = III(Ч): (Евро-Сиб.); Pa(НК); [Sp.] <Pp>
345. *C. digitata* L. - О. пальчатая = III(СКТ): (Европ.); S(НК); [Pl.]
346. *C. pallescens* L. - О. бледноватая = III(СКТ, Тер); IV(БНДар): (Голаркт.); Pa(НК); [Pl.]
347. *C. tomentosa* L. - О. шерстистая = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Евро-Сиб.); Pa, ST(НК); [Pl.]
348. *C. alba* Scop. – О. белая = IV(БН): (Палеаркт.); Da(НК); [Pl.]
349. *C. bordzilowskii* V. Krecz. (*C. schkuhrii* Willd.; *C. liparocarpos* Gaudin) - О. Бордзиловского = II(ВП); III(ЧО); IV(БН): (Кавк.); ST(НК); [Sp.]
350. *C. supina* Willd. ex Wahlenb. - О. приземистая = I(М); II(КН); III(СКТ); IV(БН): (Евро-Сиб.); ST(НК); [Sp.]
351. *C. capillaris* L. – О. волосистолистная = III(BC): (Голаркт.); Pb, Pс(НК); [Sp.]
352. *C. caucasica* Stev. – О. кавказская = III(BC): (Субкавказ*.); Pb(НК); [Pl.]
353. *C. oligantha* Steud. – О. немногочетковая = III(BC): (Кавк.); Pс(НК); [Pl.]
354. *C. transcaucasica* Egor. – О. закавказская = III(BC): (Кавк.); Pb(НК); [R.]
355. *C. omskiana* Meinsh. (*C. elata* All.) - О. омская = II(Кизл): (Палеаркт.); Aa(НК); [Pl.]
356. *C. cespitosa* L. – О. дернистая = III(BC): (Палеаркт.); Pс, Aa(НК); [Sh.]

357. *C. kotschiana* Boiss. et Hohen. (*C. orbicularis* Boiss. et Hohen.) – О. Кочи = III(BC): (Субкавказ*); Pс(НК); [R.]
358. *C. otrubae* Podp. – О. Отрубы = I(M); II(ВП); III(ЧО): (Субсредиз*.); Ab(K); [Pl.]
359. *C. divulsa* Stokes – О. прерванная = Все районы: (Голаркт.); S(НК); [Sp.]
360. *C. polyphylla* Kar.et Kir. – О. многолистная = Все районы: (Палеаркт.); S(НК); [Sp.]
361. *C. contigua* Hoppe – О. соседняя = III(Ч); IV(БН): (Палеаркт.); S,Pa(НК); [Sp.]
362. *C. colchica* J.Gay – О. колхидская = III(M); II(ВП): (Понт.-Южносиб.); Db(НК); [Sp.]
363. *C. praesox* Schreb. – О. ранняя = II(ВП): (Палеаркт.); ST,Db(НК); [Pl.]
364. *C. divisa* Huds. – О. раздельная = I(M); II(ВП); III(ЧО – Грозный): (Палеаркт.); Dс(НК); [Sp.]
365. *C. stenophylla* Wahlenb. (*C. uralensis* Clarke; *C. dimorphotheca* Stschegl.; *C. stenophylloides* (V.Crecz.) Egor.) – О. узколистная = I(M); II(ВП): (Субтуран*.); ST(НК); [R.]
366. *C. remota* L. – О. раздвинутая = III(BC): (Палеаркт.); S,Аа(НК); [Sp.]
367. *C. leporina* L. – О. заячья = III(BC): (Палеаркт.); S,Pa,Аа(НК); [Pl.]
368. *C. canescens* L. – О. сероватая = III(BC): (Палеаркт.); Pb,Pс,Аа(НК); [Pl.]
369. *C. brunnescens* (Pers.) Poir. – О. буроватая = III(BC): (Голаркт.); Pb,Pс(НК); [Pl.]
370. *C. heleonastes* Ehrh. – О. болотолюбивая = III(BC): (Голаркт.); Pс,Аа(НК); [R.]
- Сем. 30. ARACEAE Juss. - АРОИДНЫЕ
371. *Arum orientale* Vieb. (*A. maculatum* L.) – Аронник восточный = III(ЧО): (Субкавказ*.); S(K); [Sp.] <Pm>
- Сем. 31. LEMNACEAE S.F.Gray - РЯСКОВЫЕ
372. *Lemna minor* L. – Ряска маленькая = I(M); II(ВП); III(ЧО); IV(БН): (Голаркт.); Ac(T); [Pl.] <Pm>
373. *L. trisulca* L. – Р. тройчатая = II(Кизл): (Голаркт.); Ac(T); [R.]
374. *Telmatophace gibba* (L.) Schleid. (*Lemna gibba* L.) – Тельматофака горбатая = II(Кизл): (Голаркт.); Ac(T); [R.]
- Сем. 32. COMMELINACEAE R.Br. - КОММЕЛИНОВЫЕ
375. *Commelina communis* L. – Коммелина синеглазка = III(ЧО): (Адвент.[Дальний Восток]); Ra,Rb(T); [R.]
- Сем. 33. JUNCACEAE Juss. - СИТНИКОВЫЕ
376. *Luzula pilosa* (L.) Willd. – Ожика волосистая = III(Тер): (Панбор.); S(НК); [Pl.]
377. *L. spicata* (L.) DC. – О. колосистая = III(BC): (Голаркт.); Pс(НК); [Pl.]
378. *L. sudetica* (Willd.) Schult. – О. судетская = III(BC): (Голаркт.); Pс(НК); [Sp.]
379. *L. stenophylla* Steud. (*L. pseudosudetica* V.Crecz.) – О. узколистная = III(BC): (Голаркт.); Pс(НК); [Pl.]

380. *L. multiflora*(Ehrh.)Lej. - О. многоцветковая = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Евро-Сиб.); Pa(НК); [Sp.]
381. *Juncus bufonius* L. - С. лягушечий = Все районы: (Голаркт.); Aa(T); [Pl.]
382. *J. compressus* Jacq. - С. сплюснутый = I(M); II(ВП); III(ЧО); IV(БН): (Евро-Сиб.); Aa(НК); [Pl.]
383. *J. gerardii* Loisel. - С. Жерара = Все районы: (Палеаркт.); Aa(НК); [Pl.]
384. *J. tenuis* Willd. - С. тонкий = III(Ч): (Адвент.[Сев.Америка]); Rb(НК); [Sp.]
385. *J. inflexus* L. - С. отклоняющийся = Все районы: (Субкавказ*.); Aa(НК); [Pl.]
386. *J. effusus* L. - С. расходящийся = I(M); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Европ.); Aa(НК); [Pl.]
387. *J. alpinoarticulatus* Chaix (*J. alpinus* Vill.) - С. альпийский = III(BC): (Голаркт.); Pc,Aa(НК); [Pl.]
388. *J. articulatus* L. (*J. lamprocarpus* Ehrh. ex Hoffm.) - С. членистый = I(M); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); Aa(НК); [Pl.]
389. *J. acutus* L. - С. острый = II(Кизл): (Общедр.средиз.); Aa(НК); [R.]
390. *J. maritimus* Lam. - С. морской = II(Кизл): (Средиземн.); Db(НК); [Sp.]
391. *J. triglumis* L. (*J. schischkinii* Kryl. et Sumn.) - С. трёхчешуйный = III(BC): (Голаркт.); Pc,Aa(НК); [Pl.]
- Сем. 34. MELANTHIACEAE Batsch - МЕЛАНТИЕВЫЕ
392. *Veratrum lobelianum* Bernh. - Чемерица Лобеля = III(Тер): (Палеаркт.); Pb,Pc(K); [Pl.] <Pm>
- Сем. 35. COLCHICACEAE DC. - БЕЗВРЕМЕННИКОВЫЕ
393. *Merendera trigyna*(Stev.ex Adams)Stapf - Мерендера трёхстолбиковая = I(M); II(Кизл); III(ТС); IV(БН): (Ирано-Туран.); Pa,ST(K:ephd); [Sp.] <Po>
394. *M. eichleri*(Regel)Boiss. - М. Эйхлера = I(M); III(СКТ); IV(БН): (Эукавказ.); Pa,ST(K:ephd); [R.] <Po>
395. *M. ghalgana* Otsch. - М. ингушская = III(BC): (Эукавказ.); Pc(K:ephd); [Sp.] <EsubE>
396. ★*Colchicum speciosum* Stev. - Безвременник великолепный = III(BC): (Субкавказ*.); Pb(K:ephd); [Sp.] <Pm>
397. ★*C. laetum* Stev. - Б. яркий = I(M); II(ВП); III(ТС): (Предкавказ.); Pa,ST(K:ephd); [Sp.] <Pmel;Po>
- Сем. 36. ASPHODELACEAE Juss. - АСФОДЕЛОВЫЕ
398. ★*Eremurus spectabilis* Vieb. - Череш представительный = III(Ч): (Субкавказ*.); ST(НК); [R.]
- Сем. 37. LILIACEAE Juss. - ЛИЛЕЙНЫЕ
399. *Gagea bulbifera*(Pall.)Salisb. - Гусиный лук луковичный = I(M): (Вост.др.средиз.); ST,Dd(K:ephd); [Sp.]
400. *G. chlorantha*(Vieb.)Schult. et Schult. fil. - Г.л. зеленоватоцветковый = II(Кизл): (Кавк.); Pa(K:ephd); [R.]
401. *Gagea minima*(L.)Ker-Gawl. - Гусиный лук малый = III(ЧО): (Европ.); S(K:ephd); [R.]

402. *G. lutea*(L.)Ker.-Gawl. - Г.л. жёлтый = III(ТС,Ч): (Панбор.); S(К:ephd); [Sp.] <Pm>
403. *G. chanae* Grossh. - Г.л. Ханы = I(М); III(ТС): (Эукавк.); ST(К:ephd); [Sp.]
404. *G. helenae* Grossh. - Г.л. Елены = III(ТС): (Кавк.); S(К:ephd); [R.]
405. *G. cuneata* Levichev et Murtazaliev – Г.л. клиноватый = II(ВП): (Эукавк); Pa(К); [R.]
406. *G. daghestanica* Levichev et Murtazaliev - Г.л. дагестанский = IV(БН): (Эукавк.); Rb(К); [R.] <Esub>
407. *G. podolica* Schult. et Schult.fil. – Г.л. подольский = II(КН): (Европ.); ST(К); [R.]
408. *G. pusilla*(F.W.Schmidt)Schult. et Schult. fil. - Г.л. маленький = I(М); III(ТС); IV(БН): (Понт.-Южносиб.); ST(К:ephd); [Sp.]
409. *G. sarmentosa* C.Koch – Г.л. хвостовидный = I(М); II(ВП): (Субкавк.*); ST(К); [R.]
410. *G. taurica* Stev. - Г.л. крымский = IV(БН): (Субкавк*.); ST(К:ephd); [R.]
411. *G. reticulata*(Pall.)Schult.et Schult. fil. - Г.л. сетчатый = I(М); IV(БН): (Туранск.); Da,Db(К:ephd); [R.]
412. *G. quasitenuifolia* Levichev – Г.л. как-бы-тонколистный = II(Кизл): (Туранск.); ST(К); [R.]
413. *G. fibrosa* (Desf.)Schult. et Schult. fil.(*G. commutata* C. Koch) – Г.л. фиброзный = I(М); II(КН): (Субкавк.*); ST(К:ephd); [R.]
414. *G. glacialis* C. Koch – Г.л. ледниковый = III(BC): (Субкавк.*); Pc(К:ephd); [Sp.]
415. *G. villosa*(Bieb.)Duby (*G. arvensis* Dumort.) - Г.л. мохнатый = III(ТС): (Субпонт*.); ST(К:ephd); [R.]
416. *G. bohémica* (Zauschn.)Schult. et Schult. fil. – Г.л. богемский = II(Кизл): (Зап.др.средиз.); ST(К); [R.]
417. *Lilium monadelphum* Bieb. – Л. однобратственная = III(Тер): (Эукавк.); Pb(К); [Sp.]
418. *Fritillaria latifolia* Willd. – Рябчик широколистный = III(BC): (Кавк.); Pc(К:ephd): [Sp.]
419. *F. collina* Adams (*F. ophioglossifolia* Freyn et Sint.; *F. lutea* Bieb.) – Рябчик холмовой = III(BC): (Вост.др.средиз.); Pb,Pc(К:ephd); [Sp.]
420. ★*F. orientalis* Adams – Р. восточный = III(BC): (Европ.); S,Do(К:ephd); [Sp.]
421. ★*Tulipa gesneriana* L. (*Tulipa schrenkii* Regel) - Тюльпан Геснера = I(М); II(ВП); III(ТС); IV(БН): (Субтуран*.); ST(К:ephd); [Sp.] <Po>
422. *T. biebersteiniana* Schult.et Schult.fil - Т. Биберштейна = I(М); II(ВП); III(ТС); IV(БН): (Субтуран*.); ST(К:ephd); [Sp.] l.c. м-ду Моздоком и Кизляром <Po>
423. *Lloydia serotina*(L.)Reichenb. – Ллойдия поздняя = III(BC): (Палеаркт.); Pc(К:ephd); [Sp.]

424. *Scilla bifolia* L. (*S. nivalis* Boiss.) – Пролеска двулистная = III(ЧО): (Европ.); S(K:ephd); [R.]
425. *S. siberica* Haw. – П. сибирская = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Евро-Кавк.); S(K:ephd); [Pl.] <Po>
426. *Ornithogalum ponticum* Zahar. (*O. pyrenaicum* auct.) - Птицемлечник понтийский = II(Кизл); III(СКТ): (Субкавк*.); Pa(K:ephd); [Pl.]
427. ★*O. arcuatum* Stev. - П. дугообразный = III(ТС): (Эукавк.); S(K:ephd); [Sp.]
428. *O. woronowii* Krasch. - П. Воронова = III(ЧО): (Кавк.); Pa(K:ephd); [R.]
429. *O. navaschinii* Agarova (*O. kochii* Parl.; *O. gussonii* Ten.; *O. tenuifolium* auct.) - П. Навашина = I(M); II(КН); III(ТС): (Субпонт*.); ST(K:ephd); [Pl.]
430. *Muscari neglectum* Guss. (*M. muscarimi* Medik.; *M. racemosum*(L.)Mill.) – Мышиный гиацинт незамеченный = Все районы: (Субсредиз*.); Pa,ST(K:ephd); [Pl.] <Po>
431. *Muscari armeniacum* Leichtlin (*M. szovitsianum* Baker) – Мышиный гиацинт армянский = III(BC – а. Харачой): (Кавк.); Dd(K:ephd); [Rs.] <Rx>
432. *Pseudomuscari pallens*(Bieb.)Garbari (*Muscari pallens*(Bieb.)Fisch.) - Псевдомускари бледный = IV(БН): (Эукавк.); ST(K:ephd); [Sp.] <Po>
Сем. 39. ALLIACEAE J.Agardh - ЛУКОВЫЕ
433. *Allium victorialis* L. – Лук победный = III(BC): (Голаркт.); Pc(K); [Pl.] <Pm>
434. *A. albidum* Fisch.ex Vieb. - Л. беловатый = III(СКТ); IV(БН): (Евро-Кавк.); ST(K); [Pl.]
435. *A. schoenoprasum* L. – Л. скорода = III(BC): (Голаркт.); Pc(K); [Sp.]
436. ★*A. gunibicum* Miscz. ex Grossh. (*A. mirzoevii* Tscholokaschvili) – Л. гунибский = III(BC): (Эукавк.); Da(K); [Sp.] <Esub>
437. *A. pseudostrictum* Albov – Л. ложноторчащий = III(Тер): (Субкавк.*); Pb(K); [Sp.]
438. *A. rotundum* L. (*A. scorodoprasum* L.; *A. jajlae* Vved.; *A. waldsteinii* G.Don fil.) – Л. круглый = Все районы: (Субпонт*.); Pa(K); [Sp.]
439. *A. atrovioleaceum* Boiss. - Л. тёмнофиолетовый = Все районы: (Туранск.); Dd(K); [Sp.]
440. *A. fuscovioleaceum* Fomin - Л. тёмнофиолетовый = III(BC); IV(БН): (Ирано-Туран.); ST(K); [Sp.]
441. *A. sphaerogcephalon* L. - Л. шароголовый = II(Кизл); III(СКТ); IV(БН): (Европ.); ST(K); [Sp.]
442. *A. moschatum* L. – Л. мускатный = III(BC); IV(БН): (Средиземн.); Pa(K); [Sp.]
443. *A. inaequale* Janka - Л. неравный = II(ВП); III(ТС); IV(БН): (Субтуран*.); ST, Da(K); [Sp.]
444. *A. rubellum* Vieb. - Л. краснеющий = III(ТС); IV(БН): (Субкавк*.); ST(K); [R.]
445. *A. pazcoskianum* Tuzs. (*A. pulchellum* G.Don fil.) - Л. Пачоского = I(M); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Понтич.); ST(K); [Sp.]

446. *A. kunthianum* Vved. - Л. Кунта = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Кавк.); ST, Da(K); [Pl.]
447. *A. rupestre* Stev. - Л. скальный = III(ЧО); IV(БН): (Субкавказ*.); Pa(НК); [Sp.]
448. *A. paniculatum* L. - Л. метельчатый = Все районы: (Понт.-Южносиб.); ST(K); [Pl.]
449. ★ *A. paradoxum*(Bieb.)G.Don fil. - Л. странный = III(ТС – восточная часть); IV(БН): (Субкавказ*.); S(K); [R.]
450. *A. ursinum* L. - Л. медвежий (Черемша) = III(Ч): (Европ.); S(K); [Pl.] <Pa;Pm>
451. *A. oreophilum* C.A.Meу. - Л. горнолюбивый = III(BC): (Ирано-Туран.); Pc(K); [Sp.]
452. *A. caspium* (Pall.)Bieb. - Л. каспийский = II(Кизл): (Туранск.); Db(K); [Rs.]
- Сем. 40. ASPARAGACEAE Juss. - СПАРЖЕВЫЕ
453. *Asparagus verticillatus* L. - Спаржа мутовчатая = I(M); II(ВП); III(ТС); IV(БН): (Ирано-Туран.); S, Pa(НК); [Sp.]
454. *A. officinalis* L. (*A. polyphyllus* Stev.; *A. caspius* Schult.et Schult.fil.) - С. лекарственная = III(BC): (Евро-Сиб.); Pa(НК); [Pl.] <Pm;Po>
455. *A. persicus* Baker - С. персидская = II(ВП): (Туранск.); Pa(НК); [R.]
- Сем. 41. CONVALLARIACEAE Horan. - ЛАНДЫШЕВЫЕ
456. *Polygonatum multiflorum*(L.)All. - Купена многоцветковая = III(Ч): (Голаркт.); S(K); [Sp.]
457. *P. orientale* Desf. (*P. polyanthemum*(Bieb.)A.Dietr.) - К. восточная = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Субкавказ*.); S(K); [Sp.]
458. *P. glaberrimum* C.Koch (*P. ovatum* Misch. ex Knorr.; *P. odoratum* (Mill.) Druce; *P. officinale* All.) - К. гладкая = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Кавк.); S(K); [Pl.]
459. *P. verticillatum*(L.)All. - К. мутовчатая = III(BC): (Европ.); S(K); [Pl.]
460. *Convallaria transcaucasica* Utkin ex Grossh. (*C. majalis* L.) - Ландыш кавказский = I(M - Терек); IV(БН): (Кавк.); S(НК); [Pl.] <Pm;Po>
- Сем. 42. TRILLIACEAE Lindl. (LILIACEAE) - ТРИЛЛИЕВЫЕ
461. *Paris quadrifolia* L. - Вороний глаз четырёхлистный = III(BC): (Палеаркт.); S(K); [Pl.] <Pm;Pt>
462. *P. incompleta* Bieb. - В.г. неполный = III(BC): (Кавк.); S(K); [Sp.]
- Сем. 43. AMARYLLIDACEAE J.St.-Hil. - АМАРИЛЛИСОВЫЕ
463. ★ *Galanthus caucasicus*(Baker)Grossh. - Подснежник кавказский = III(BC): (Кавк.); S(K:ephd); [Sp.] <Pm;Po>
464. ★ *G. angustifolius* G.Koss. - П. узколистный = III(Ч); IV(БН): (Предкавказ.); S(K:ephd); [Rs.] <Pm>
465. ★ *G. platyphyllus* Traub et Moldenke (*G. latifolius* Rupr.) - П. широколистный = III(BC): (Эукавказ.); Pc(K:ephd); [Sp.]
466. ★ *G. lagodechianus* Kem.-Nath. (*G. cabardensis* G.Koss.) - П. лагодехский = III(СКТ); IV(БН): (Эукавказ.); S(K:ephd); [R.] <Po>

467. ★ *Sternbergia colchiciflora* Waldst. et Kit. - Штернбергия
безвременниковая = III(ТС): (Средиземн.); ST(К:ephd); [Rs.] <Rx>
Сем. 44. DIOSCOREACEAE R.Br. - ДИОСКОРЕЙНЫЕ
468. *Tamus communis* L. - Тамус обыкновенный (Адамов корень) = III(Тер):
(Средиземн.); S(К:lh); [Pl.] <Pm>
Сем. 45. IRIDACEAE Juss. - ИРИСОВЫЕ(КАСАТИКОВЫЕ)
469. *Crocus reticulatus* Stev. ex Adams (*C. variegatus* Hoppe et Hornsch.) -
Шафран сетчатый = I(М); III(ТС): (Понт.-Южносиб.); Pa, ST, S(К:ephd);
[Pl.] <Po>
470. *Iris sibirica* L. - Касатик (Ирис) сибирский = III(ЧО): (Евро-Сиб.);
Pa, Aa(НК); [Sp.] <Po>
471. *I. pseudacorus* L. - К.(И.) жёлтый = I(М); II(Кизл): (Палеаркт.); Ab(К);
[R.] <Po; Pm>
472. ★ *I. notha* Vieb. - К.(И.) ненастоящий = III(ТС): (Предкавк.); Pa(К); [R.]
<EsubE>
473. *I. halophila* Pall. - К.(И.) солелюбивый = III(СКТ): (Понт.-Южносиб.);
ST, Dc(К); [Sp.] <Po>
474. *I. cartaliniae* Fomin (*I. musulmanica* Fomin; *I. violacea* Klatt) - К.(И.)
карталинский = IV(БН): (Субкавк*.); Aa(К); [R.]
475. *I. pseudonotha* Galushko - К.(И.) ложноненастоящий = I(СКТ); II(ВП):
(Субтуран*.); ST, Aa(К); [Sp.]
476. ★ *I. scariosa* Willd. ex Link (*I. astrachanica* Rodionenko) - К.(И.)
кожистый = I(М); II(ВП): (Туранск.); ST, Db, Dd(К:ephd); [Sp.] <Po>
477. *I. furcata* Vieb. (*I. aphylla* L.) - К.(И.) вильчатый = III(СКТ); IV(БН):
(Евро-Кавк.); Pa(К:ephd); [Sp.] <Po>
478. *Gladiolus tenuis* Vieb. (*G. apterus* Klok.) - Шпажник тонкий =
III(СКТ, Тер); IV(БН): (Евро-Кавк.); Pa(К); [Sp.] <Po>
Сем. 46. ORCHIDACEAE Juss. - ЯТРЫШНИКОВЫЕ (ОРХИДНЫЕ)
479. ★ *Cypripedium calceolus* L. - Башмачок настоящий = III(Ч - Хоби-
Шауданские высоты): (Палеаркт.); S(НК); [Rs.] <Rg>
480. *Corallorhiza trifida* Chatel. - Ладьян трёхнадрезанный = III(ВС):
(Голаркт.); S(К:sap); [R.]
481. *Listera ovata* (L.) R.Br. - Тайник овальный = III(СКТ, Тер): (Евро-Сиб.);
S(НК); [Sp.]
482. *Neottia nidus-avis* (L.) Rich. - Гнездовка обыкновенная = III(СКТ, Тер);
IV(БН): (Панбор.); S(К:sap); [Sp.] <Pm>
483. *Epipactis helleborine* (L.) Crantz (*E. latifolia* (L.) All.) - Дремлик
морозниковый = III(Тер): (Палеаркт.); S(НК); [R.]
484. *E. palustris* (L.) Crantz - Д. болотный = II(КН); III(ТС): (Палеаркт.); S(К);
[R.]
485. ★ *Cephalanthera rubra* (L.) Rich. - Пыльцеголовник красный =
III(СКТ, Тер): (Панбор.); S(НК); [R.]
486. ★ *C. damasonium* (Mill.) Druce - П. дамасонский (крупноцветковый) =
III(СКТ, Тер): (Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]

487. ★*C. longifolia*(L.)Fritsch - П. длиннолистный = III(Тер): (Панбор.); S(НК); [R.]
488. *Goodyera repens* (L.) R.Br. – Гудайера ползучая = III(Тер): (Голаркт.); S(НК); [R.]
489. *Herminium monorchis*(L.)R.Br. - Бровник одноклубневой = III(Тер): (Палеаркт.); Pb(К); [R.]
490. *Coeloglossum viride*(L.)C.Hartm. - Пололепестник зелёный = III(СКТ,Тер): (Панбор.); Pa,Pb(К); [Sp.] <Pm>
491. *Platanthera bifolia*(L.)Rich. - Любка двулистная = III(Ч): (Палеаркт.); S(К); [R.] <Pm>
492. *P. chlorantha*(Cust.)Reichenb. - Л. зеленоцветная = III(СКТ,Тер): (Евро-Кавк.); S,Pa(К); [Pl.] <Pm>
493. *Gymnadenia conopsea*(L.)R.Br. - Кокушник комарниковый = III(СКТ,Тер): (Палеаркт.); Pb(К); [Sp.] <Pm>
494. *Dactylorhiza incarnata*(L.)Soo (*Orchis latifolia* L.) – Пальчатокоренник мясокрасный = II(КН); III(Ч): (Палеаркт.); Aa(К); [R.] <Pm>
495. *D. euxina*(Nevski)Czer.(*D. caucasica*(Klinge)Soo) - П. черноморский = III(Тер): (Кавк.); Pb(К); [R.] <Pm>
496. *D. salina*(Turcz.ex Lindl.)Soo (*D. sanasunitensis*(Fleischm.)Soo) - П. санасунитский = III(ЧО,Тер): (Субкавк*.); Pb(К); [Sp.] <Pm>
497. ★*D. urvilleana*(Steudel)Baumann et Kunkele (*D. triphylla* (C.Koch)Czer.) - П. трёхлистный = III(Тер): (Субкавк*.); Pb(К); [Sp.] <Pm>
498. ★*Orchis coriophora* L. - Ятрышник клопоносный = III(СКТ,Тер): (Средиземн.); Pb(К); [R.] <Pm>
499. ★*O. picta* Loisel. (*O. morio* L. *subsp. picta* (Loisel.)K.Richt.) - Я. разукрашенный = II(КН); III(СКТ);IV(БН): (Субсредиз*.); Pa(К); [Sp.] <Pm>
500. ★*O. mascula*(L.)L. - Я. мужской = III(СКТ,Тер): (Палеаркт.); Pa,Pb(К); [R.] <Pm>
501. ★*O. ustulata* L. – Я. обожжённый = III(ЧО,Тер): (Европ.); Pb(К); [R.] <Pm>
502. ★*O. tridentata* Scop. - Я. трёхзубчатый = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Субсредиз*.); Pa(К); [Pl.] <Pm>
503. ★*O. militaris* L. - Я. вооружённый = III(Тер): (Палеаркт.); S,Pa(К); [R.] <Pm>
504. ★*O. simia* Lam. - Я. обезьяний = III(Ч): (Субсредиз*.); Pb(К); [Rs.] <Pm>
505. ★*O. purpurea* Huds. - Я. пурпурный = III(Ч): (Европ.); S,Pa(К); [Rs.] <Pm>
506. ★*Anacamptis pyramidalis*(L.)Rich. - Анакамптис пирамидальный = III(СКТ,Тер): (Субсредиз*.); Pb(К); [R.] <Pm>
507. ★*Traunsteinera sphaerica*(Bieb.)Schlechter - Траунштейнера сферическая = III(Тер): (Кавк.); Pb(К); [R.] <Pm>

Класс MAGNOLIOPSIDA - МАГНОЛИЕВИДНЫЕ (ДВУДОЛЬНЫЕ)

Сем. 47. SALICACEAE Mirb. - ИВОВЫЕ

508. *Salix arbuscula* L. – Ива деревцевидная = [III(BC): Гроссгейм, 1945]: (Европ.); Pс(Phn); [Sp.]
509. *S. caprea* L. – И. козья = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Палеаркт.); S(Phm); [Pl.] <Pm;Pmel>
510. *S. kuznetzowii* Laksch. ex Goerz – И. Кузнецова = III(Тер): (Эукавк.); Pb(Phn); [Sp.]
511. *S. cinerea* L. - И. серая = II(КН); III(СКТ,Тер); IV(БН): (Палеаркт.); Aа,S(Phn); [Sp.] <Pmel>
512. *S. caucasica* Anderss. – И. кавказская = III(Тер): (Кавк.); Pb(Phn); [Pl.]
513. *S. purpurea* L. - И. пурпурная = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Палеаркт.); Aа(Phm); [Pl.] <Pmel>
514. *S. caspica* Pall. - И. каспийская = I(М); II(Кизл): (Субтуран*.); Aа(Phn); [Sp.] <Pmel>
515. *S. wilhelmsiana* Goerz – И. Вильгельмса = II(КН); IV(БН): (Ирано-Туран.); Aа(Phm); [R.]
516. *S. acutifolia* Willd. – И. туполистная = [I(М) – Гроссгейм, 1945]: (Европ.); Db(Phm); [R.]
517. *S. triandra* L. - И. трёхтычинковая = I(М); II(Кизл); III(ЧО): (Палеаркт.); Aа(Phn); [Sp.] Pmel
518. *S. alba* L. - И. белая = I(М); II(ВП); III(ЧО); IV(БН): (Палеаркт.); Aа(Phm); [Pl.] <Pm;Pmel>
519. *S. fragilis* L. - И. ломкая = II(Кизл); III(ЧО): (Палеаркт.); Aа(Phn); [Sp.] <Pmel>
520. *S. aegyptiaca* L.(*S. phlomoides* Vieb.) - И. египетская = III(Ч): (Субпонт*.); S(Phn); [R.] <Pmel>
521. *S. pentandroides* A. Skvorts. – И. пятитычинковидная = III(BC): (Эукавк.); Pb(Phm); [Sp.]
522. *S. kazbekensis* A. Skvorts. – И. казбекская = III(BC): (Эукавк.); Pс(Phn); [Pl.]
523. *Populus alba* L. - Тополь белый (Белолистка) = I(М); II(Кизл): (Палеаркт.); Aа(Phms); [Pl.]
524. *P. hybrida* Vieb. – Т. гибридный = I(М); II(ВП); III(ЧО): (Кавк.); Aа(Phmg); [Sp.]
525. *P. tremula* L. - Т. дрожащий (Осина) = III(Тер): (Палеаркт.); S(Phmg); [Pl.] <Pm>
526. *P. nigra* L. - Т. чёрный (Осокорь) = I(М - Терек); II(ВП): (Палеаркт.); Aа(Phms); [Sp.] <Pm>
527. *P. sosnovskyi* Grossh. – Т. Сосновского = II(КН): (Кавк.); S,Aа(Phmg); [R.]

Сем. 48. JUGLANDACEAE A.Rich. ex Kunth – ОРЕХОВЫЕ

528. **Juglans regia* L. – Орех грецкий = Все районы: (Вост.др.средиз); S(Phms); [Sp.] <Pa;Pm>

Сем. 49. CORYLACEAE Mirb.(BETULACEAE) - ЛЕЩИНОВЫЕ

529. ★ *Ostrya carpinifolia* Scop. – Хмелеграб обыкновенный = III(Ч):
(Вост.др.средиз.); S(Phmg); [R.] <Rt>
530. *Carpinus caucasica* Grossh. (*Carpinus betulus* L.) – Граб кавказский =
III(СКТ,Тер): (Кавк.); S(Phms); [Soc.]
531. *Corylus avellana* L. – Лещина обыкновенная = III(СКТ,Тер): (Палеаркт.);
S(Phn); [Pl.] <Pa;Pm>
- Сем. 50. BETULACEAE S.F.Gray - БЕРЁЗОВЫЕ
532. ★ *Betula raddeana* Trautv. – Берёза Радде = III(Тер): (Эукавк.); S(Phms);
[Sp.] <EsubE>
533. *B. pendula* Roth (*B. verrucosa* Ehrh.) – Б. плакучая = III(СКТ,Тер):
(Палеаркт.); S(Phms); [Sp.] <Pm>
534. *B. pubescens* Ehrh. - Б. пушистая = III(ЧО): (Евро-Сиб.); S(Phms); [Sp.]
<Pm>
535. *B. litwinowii* Doluch. – Б. Литвинова = III(Тер): (Субкавк*.); S(Phms);
[Pl.]
536. *Alnus glutinosa*(L.)Gaertn. – Ольха клейкая = III(Тер): (Палеаркт.);
S(Phms); [Pl.] <Pm>
537. *A. barbata* C.A.Mey. – О. бородастая = I(М – Терек); III(Ч): (Субкавк*.);
Aa(Phms); [R.]
538. *A. incana*(L.)Moench – О. серая = III(СКТ,Тер): (Панбор.); S(Phms); [Pl.]
<Pm;Pmel>
- Сем. 51. FAGACEAE Dumort. - БУКОВЫЕ
539. *Quercus robur* L. (*Q. pedunculata* Ehrh.) – Дуб черешчатый (сильный) =
III(СКТ,Тер); IV(БН): (Европ.); S(Phms); [Pl.] <Pm>
540. *Q. iberica* Stev. – Д. грузинский = III(ВС): (Кавк.); S(Phms); [Sp.]
541. *Q. petraea* L. ex Liebl. - Д. скальный = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Евро-
Кавк.); S(Phms); [Pl.] <Pm>
542. *Q. dalechampii* Ten. (*Q. calcarea* Troitz.) - Д. меловой = III(Ч):
(Субкавк*.); S(Phms); [Sp.]
543. *Fagus orientalis* Lipsky - Бук восточный = III(Тер): (Субкавк*.); S(Phmg);
[Sp.]
- Сем. 52. ULMACEAE Mirb. – ИЛЬМОВЫЕ
544. *Ulmus minor* Mill. (*U. carpinifolia* Rupr.ex Suckow, *U. foliacea* Gilib.) -
Ильм малый = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); S,Aa(Phm); [Sp.]
<Pm>
545. *U. suberosa* Moench – И. пробковый = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН):
(Зап.др.средиз): S(Phm); [Sp.]
546. *U. glabra* Huds. - И. шершавый = III(ЧО); IV(БН): (Субкавк*.); S(Phms);
[R.]
547. *U. sukaczovii* Andron. (*U. elliptica* C.Koch) – И. Сукачёва = III(СКТ,Тер):
(Кавк.); S(Phms); [Pl.]
548. *Celtis caucasica* Willd. – Каркас кавказский = III(Ч): (Ирано-Туран.);
Da(Phm); [R.]
549. *C. glabrata* Stev.ex Planch. – К. оголённый = III(ВС): (Субкавк*.);
Da(Phn); [R.]

Сем. 53. MORACEAE Link - ТУТОВЫЕ

550. **Morus alba* L. - Шелковица белая = Все районы: (Адвент.[Китай]); Da, Aa(Phms); [Sp.] <Pm; Pa; Pmel>
551. **M. nigra* L. – М. чёрная = Все районы: (Адвент.[Передняя Азия]; ST, S(Phms); [Sp.] <Pm; Pa, Pmel.>
552. **Maclura pomifera* (Rafin.) Schneid. (*M. aurantiaca* Nutt.) – Маклюра яблочная = I(M); II(ВП): (Адвент.[Сев. Америка]); ST(Phms); [R.] <Pm>

Сем. 54. CANNABACEAE Endl. - КОНОПЛЁВЫЕ

553. *Humulus lupulus* L. - Хмель обыкновенный = Все районы: (Голаркт.); S, Aa(НК:lh); [Pl.] <Pa; Pm>
554. *Cannabis ruderalis* Janisch. - Конопля сорная = I(M); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Понт.-Южносиб.); Rb(НК); [Sp.]

Сем. 55. URTICACEAE Juss. - КРАПИВНЫЕ

555. *Urtica urens* L. - Крапива жгучая = III(ЧО): (Палеаркт.); Rb(НК); [Sp.] <Pm>
556. *U. dioica* L. - К. двудомная Все районы: (Палеаркт.); Rb(НК); [Pl.] <Pm; Pa>
557. *Parietaria judaica* L. – Постенница иудейская = III(Тер): (Обшедр.средиз.); Da(НК); [Pl.]

558. *P. serbica* Panc. (*P. chersonensis* (Lang et Szov) Doerfl.) – П. сербская = III(Тер): (Вост.др.средиз.); S(T); [R.]
559. *P. micrantha* Ledeb. – П. мелкоцветковая = III(СКТ, Тер): (Палеаркт.); S(T); [Sp.]

Сем. 56. VISCACEAE Batsch (LORANTHACEAE) - ОМЁЛОВЫЕ

560. *Viscum album* L. - Омёла белая = III(СКТ): (Палеаркт.); S(Phn:hpar:sv); [Sp.] <Rt; Pm>

Сем. 57. SANTALACEAE R.Br. - САНТАЛОВЫЕ

561. *Thesium procumbens* C.A.Mey. - Ленец простёртый = III(BC); IV(БН): (Евро-Кавк.); Pa(НК:hpar); [Sp.]
562. *Th. arvense* Horvatovszky (*Th. ramosum* Hayne) - Л. полевой = Все районы: (Субтуран*.); Pa(НК:hpar); [Pl.]
563. *Th. alpinum* L. – Л. альпийский = III(BC): (Европ.); Pb, Pc(НК:hpar); [Sp.]

Сем. 58. ARISTOLOCHIACEAE Juss. - КИРКАЗОНОВЫЕ

564. *Asarum ibericum* Stev. ex Ledeb. (*Asarum intermedium* (C.A.Mey.) Grossh.) - Копытень грузинский = III(BC): (Эвксин.); S(НК); [R.] <EsubE> <Pt; Pm>
565. *Aristolochia clematitis* L. - Кирказон ломоносовидный = III(ЧО, Ч): (Евро-Кавк.); S(НК); [Pl.] <Pt; Pm>

Сем. 59. POLYGONACEAE Juss. - ГРЕЧИШНЫЕ

566. *Oxuria digyna* (L.) Hill (*O. elatior* R.Br. ex Meissn.) – Кисличник двухпестичный = III(BC): (Палеаркт.); Pb, Pc(НК); [Pl.]
567. *Rumex acetoselloides* Val. - Щавель кисловатый = III(BC): (Эвксин.); Pb(НК); [Pl.] <Pm>
568. *R. acetosa* L. - Щ. кислый = Все районы: (Голаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pa; Pm>

569. *R. thyrsiflorus* Fingerh. - Щ. пирамидальный = III(СКТ): (Палеаркт.); Pa(НК); [Sp.]
570. *R. euxinus* Klok. (*R. tuberosus* L.) - Щ. клубневой = III(Ч); IV(БН): (Общедр.средиз.); Pa(НК); [Pl.]
571. *R. arifolius* All. - Щ. аронниколистный = III(BC): (Средиземн.); Pb(НК); [Pl.]
572. *R. hastifolius* Bieb. (*R. scutatus* L.) - Щ. копьелистный = III(BC): (Общедр.средиз.); Da(НК); [Sp.]
573. *R. crispus* L. - Щ. курчавый = Все районы: (Голаркт.); Rb(НК); [Pl.] <Pm>
574. *R. hydrolarpathum* Huds. - Щ. водосавелевый = II(КН): (Европ.); Aa(НК); [R.]
575. *R. confertus* Willd. - Щ. конский = III(Ч): (Палеаркт.); Pa,Pb(НК); [R.] <Pm>
576. *R. patientia* L. - Щ. шпинатный = II(ВП); III(СКТ,Ч); IV(БН): (Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.]
577. *R. aquaticus* L. - Щ. водяной = II(КН): (Палеаркт.); Aa(НК); [R.] <Pm>
578. *R. alpinus* L. - Щ. альпийский = III(BC): (Европ.); Pb,Pc(НК); [Pl.] <Pm>
579. *R. sanguineus* L. - Щ. кровавой = III(Ч): (Палеаркт.); S,Aa(НК); [Sp.]
580. *R. stenophyllus* Ledeb. - Щ. узколистный = II(КН): (Субтуран*.); Aa(НК); [R.]
581. *R. reticulatus* Bess. - Щ. сетчатый = I(М); II(ВП): (Армено-Иран.); Aa(T); [R.]
582. *R. halaczii* Rech. - Щ. Галачи = II(ВП): (Ирано-Туран.); Aa(T); [R.]
583. *R. pulcher* L. - Щ. красивый = II(ВП): (Субсредиз*.); Aa(НК); [R.]
584. *R. obtusifolius* L. - Щ. туполистный = Все районы: (Палеаркт.); S,Pa(НК); [Sp.] <Pm>
585. *R. marschallianus* Reichenb. - Щ. Маршалла = II(КН - Камыш-Бурун,Кизл): (Субтуран*.); Dc(НК); [R.]
586. *R. maritimus* L. - Щ. морской = I(М); II(КН): (Палеаркт.); Aa(НК); [R.]
587. *Atraphaxis replicata* Lam. (*A. spinosa* L.) - Курчавка отогнутая = IV(БН): (Ирано-Туран.); Da(Phn); [R.]
588. *Calligonum aphyllum*(Pall.)Guerke - Джузгун безлистный = II(КН): (Туранск.); Db(Ch); [R.]
589. *Fallopia convolvulus*(L.)A.Love (*Polygonum convolvulus* L.; *Bilderdikia convolvulus*(L.)Dumort.) - Фаллопия вьюнковая = Все районы: (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Sp.] <Pm>
590. *F. dumetorum*(L.)Holub (*P. dumetorum* L.; *B. dumetorum*(L.) Dumort.) - Ф. кустарниковая = III(СКТ): (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Sp.]
591. *Polygonum aviculare* L. (*P. heterophyllum* Lindem.) - Гречишка птичья = Все районы: (Палеаркт.); Rb(T); [Pl.] <Pm>
592. *P. salsugineum* Bieb. - Г. солонцеватая = I(М); II(ВП): (Туранск.); Dc(T); [Sp.]
593. *P. patulum* Bieb. - Г. раскидистая = II(ВП); III(ЧО): (Палеаркт.); Aa,Rb(T); [Sp.]

594. *P. novoascanicum* Klok. - Г. новоасканийская = I(М); II(ВП): (Понтич.); Aa, Dc(T); [Sp.]
595. *P. argyrocoleon* Steud. ex G.Kunze - Г. серебристая = I(М); II(ВП): (Туранск.); Rb(T); [R.]
596. *P. pseudoarenarium* Klok. - Г. ложнопесчаная = II(ВП): (Туранск.); Db(T); [Pl.]
597. *Persicaria amphibia*(L.)S.F.Gray (*Polygonum amphybiium* L.) - Персикария (Гречишка) земноводная = II(ВП): (Голаркт.); Aa, Ab(K); [R.]
598. *P. maculata*(Rafin.)A.et D.Love (*Polygonum maculatum* Rafin.; *P. persicaria* L.) - П.(Г.) почечуйная = Все районы: (Палеаркт.); Aa, Ra, Rb(T); [Pl.] <Pm>
599. *P. hydropiper*(L.)Spach (*Polygonum hydropiper* L.) - П.(Г.) водяной перец = I(М); III(Ч, ЧО): (Голаркт.); Aa(T); [Sp.]
600. *P. lapathifolia*(L.)S.F.Gray (*Polygonum lapatifolium* L., *P. tomentosum Schrank*) - П.(Г.) щавелелистная = Все районы: (Палеаркт.); Aa(T); [Sp.]
601. *P. minor*(Huds.)Opiz (*Polygonum minus* Huds.) - П.(Г.) малая = III(ЧО): (Палеаркт.); Aa, Dc(T); [R.]
602. *Bistorta vivipara*(L.)S.F.Gray (*Polygonum viviparum* L.) – Бисторта (Гречишка) живородящая = III(BC): (Голаркт.); Pb, Pc(НК); [Pl.]
603. *B. carnea*(C.Koch)Kom. (*Polygonum carneum* C.Koch) - Б.(Г.) мясокрасная = III(BC): (Субкавказ*.); Pb(НК); [Pl.] <Pm>
604. *Aconogonon ranjutinii*(Charkev.)Sojak (*Polygonum ranjutinii* Charkev., *P. alpinum* All.) – Аконогонон Панютинина = III(BC): (Кавк.); Pb(НК); [Sp.]
- Сем. 60. CHENOPODIACEAE Vent. - МАРЕВЫЕ
605. *Polysnemum arvense* L. - Хрупливник полевой = I(М); II(ВП): (Палеаркт.); Db, Rb(T); [R.]
606. *P. majus* A.Br. - X. большой = III(ЧО); IV(БН): (Субсредиз*.); ST, Rb(T); [R.]
607. *Hablitzia tamnoides* Bieb. - Габлиция тамусовидная = III(Ч); IV(БН): (Субкавказ*.); Da(НК); [Sp.]
608. *Blitum virgatum* L. (*Chenopodium foliosum* Aschers.) – Блитум прутьевидный = III(BC): (Палеаркт.); Da, Rb(T); [Pl.] <Pa>
609. *Chenopodium botrys* L. - Марь душистая = III(ЧО); IV(БН): (Общедр.средиз.); Db(T); [Sp.] <Pm>
610. *Ch. chenopodioides*(L.)Aell. - М. толстолистная = II(ВП): (Голаркт.); Aa, Dc(T); [R.]
611. *Ch. glaucum* L. - М. сизая = Все районы: (Плюрирег.); ST, Rb(T); [Sp.]
612. *Ch. rubrum* L. - М. красная = II(ВП); III(СКТ): (Голаркт.); Rb(T); [Sp.]
613. *Ch. polysperum* L. - М. многосеменная = I(М); II(Кизл): (Евро-Сиб.); Dc(T); [R.]
614. *Ch. hybridum* L. - М. гибридная = III(СКТ): (Голаркт.); Ra, Rb(T); [Sp.]
615. *Ch. urbicum* L. - М. городская = III(ЧО): (Палеаркт.); Rb(T); [Sp.]
616. *Ch. album* L. - М. белая = Все районы: (Плюрирег.); Rb(T); [Pl.] <Pm>
617. *Ch. vulvaria* L. - М. вонючая = II(КН); III(ЧО): (Адвент.[Средиземноморье]); Rb(T); [Sp.] <Pm>

618. *Atriplex sagittata* Borkh. (*A. nitens Schkuhr*) - Лебеда блестящая = I(М); II(Кизл); III(ЧО): (Палеаркт.); Rb(T); [Sp.]
619. *A. aucheri* Moq. (*A. amblyostegia Turcz.*) - Л. Оше = II(ВП): (Ирано-Туран.); Dc(T); [R.]
620. *A. littoralis* L. - Л. прибрежная = I(М): (Палеаркт.); Dc(T); [R.]
621. *A. patula* L. - Л. раскидистая = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); ST, Da(T); [Pl.]
622. *A. oblongifolia* Waldst. et Kit. - Л. удлинённолистная I(М); II(ВП): (Палеаркт.); Rb(T); [R.]
623. *A. calotheca*(Rafin)Fries (*A. hastata* L.) - Л. копьевидная = I(М); II(ВП); III(СКТ): (Палеаркт.); ST, Dc(T); [Pl.]
624. *A. rosea* L. - Л. розовая = I(М); II(ВП): (Европ.); Rb(T); [R.] <Pm>
625. *A. sphaeromorpha* Iljin - Л. шаровидная = I(М): (Субпонт*.); Db(T); [R.]
626. *A. tatarica* L. - Л. татарская = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); ST, Da(T); [Pl.]
627. *Halimione verrucifera*(Bieb.)Aell. (*Atriplex verrucifera* Bieb.) - Галимионе бородавчатый = I(М); II(Кизл): (Вост.др.средиз.); Dc(Ch:sf); [Sp.]
628. *H. pedunculata*(L.)Aell. (*A. pedunculata* L.) - Г. черешчатый = I(М); II(ВП): (Палеаркт.); Dc(T); [R.]
629. *Ceratocarpus arenarius* L. - Рогоплодник песчаный = I(М); II(ВП); III(ТС); IV(БН): (Общедр.средиз.); ST(T); [Pl.]
630. *C. utriculosus* Bluk (*C. turkestanicus* Sav.-Rucz. ex Iljin) - Р. мешочковый II(КН): (Туранск.); ST(T); [R.]
631. *Camphorosma monspeliaca* L. - Камфоросма марсельская = I(М): (Общедр.средиз.); Dc(Ch:sf); [R.] <Pp>
632. *C. lessingii* Litv. - К. Лессинга = II(ВП); III(ТС): (Туранск.); ST(Ch:sf); [R.]
633. *Bassia hyssopifolia*(Pall.)O.Kuntze (*Echinopsilon hyssopifolium*(Pall.)Moq.) - Бассия иссополистная = I(М); II(ВП): (Общедр.средиз.); Dc(T); [R.]
634. *B. sedoides*(Pall.)Aschers. (*E. sedoides*(Pall.)Moq.) - Б. очитковая = I(М); II(ВП): (Вост.др.средиз.); Dc(T); [Sp.]
635. *Kochia prostrata*(L.)Schrud. - Прутяк простёртый = Все районы: (Общедр.средиз.); ST, Da(Ch:sf); [Pl.] <Pp>
636. *K. laniflora*(S.G.Gmel.)Vorb. - П. шерстистоцветковый = I(М); II(КН): (Палеаркт.); Db(T); [R.]
637. *K. scoraria*(L.)Schrud. - П. веничный = I(М): (Общедр.средиз.); Rb(T); [Sp.] <Pm>
638. *Corispermum caucasicum*(Iljin)Iljin (*C. aralo-caspicum* Iljin) - Верблюдка кавказская = I(М); II(ВП): (Туранск.); Db(T); [Sp.]
639. *C. orientale* Lam. - В. восточная = II(Кизл – южная часть): (Субпонт*.); Db(T); [R.]
640. *C. nitidum* Schult. - В. лоснящаяся = II(КН): (Понтич.); Db(T); [R.]
641. *Agriophyllum squarrosum*(L.)Moq. (*A. arenarium* Bieb. ex C.A.Mey.) - Кумарчик оттопыренный = I(М); II(ВП): (Субтуран*.); Db(T); [Sp.]

642. *Kalidium foliatum*(Pall.)Moq. - Поташник олиственный = II(ВП):
(Туранск.); Дс(НК); [R.]
643. *K. caspicum*(L.)Ung.-Sternb. - П. каспийский = II(ВП): (Ирано-Туран.);
Дс(Phn); [R.]
644. *Haloreplis rugmaea*(Pall.)Bunge ex Ung.-Sternb. - Соровник низкий =
II(ВП): (Туранск.); Дс(Т); [R.]
645. *Halostachis belangeriana*(Moq.)Botsch. (*Halostachys caspia* C.A.Mey.) -
Соляноколосник каспийский = II(ВП): (Ирано-Туран.); Дс(Ch); [R.]
646. *Halocnemum strobilaceum*(Pall.)Bieb. - Сарсазан шишковатый = I(М);
II(ВП): (Общедр.средиз.); Дс(Ch:fl); [Sp.]
647. *Salicornia europaea* L. (*S. herbaceae*(L.)L.) - Солерос европейский = I(М);
II(ВП); III(ТС): (Голаркт.); Дс(Т:ps); [Sp.]
648. *Suaeda microphylla* Pall. - Сведа мелколистная = I(М); II(ВП): (Ирано-
Туран.); Дс(Ch:fl); [Sp.]
649. *S. altissima*(L.)Pall. - С. высокая = I(М); II(ВП): (Ирано-Туран.); Дс(Т);
[Sp.]
650. *S. confusa* Iljin - С. запутанная = I(М); II(ВП): (Субтуран*.); Дс(Т); [Pl.]
651. *S. salsa*(L.)Pall. - С. солончаковая = I(М); III(ТС); IV(БН): (Туранск.);
Дс(Т); [R.]
652. *S. prostrata* Pall. - С. простёртая = I(М); II(ВП): (Палеаркт.); Дс(Т); [Sp.]
<Pm>
653. *Salsola australis* R.Br. (*S. iberica*(Sennen et Pau)Botsch.; *S. pestifer* Nels.) -
Солянка южная = I(М); II(ВП); III(СКТ): (Общедр.средиз.); ST,Rb(Т); [Pl.]
654. *S. paulsenii* Litv. – С. Паульсена = IV(БН): (Туранск.); Дс(Т); [R.]
655. *S. soda* L. – С. содоносная = II(Кизл): (Общедр.средиз.); Дс(Т); [Sp.]
656. *S. laricina* Pall. - С. лиственничная = I(М); II(ВП); IV(БН): (Субпонт*.);
Дс(Ch:fl); [Sp.]
657. *S. dendroides* Pall. - С. древовидная = I(М); II(ВП); IV(БН): (Ирано-
Туран.); Дс(Ch); [Sp.] <Pp>
658. *S. ericoides* Bieb. - С. вересковидная = II(ВП); IV(БН): (Субкавказ*.);
Дс(Phn); [R.] <Pp>
659. *S. orientalis*(S.G.Gmel.)Tzvel. - С. восточная = II(ВП): (Туранск.); Дс(Т);
[R.]
660. *Caspia foliosa*(L.)Galushko (*Salsola foliosa*(L.)Schrad.) - Каспия
олиственная = II(ВП): (Субтуран*.); Дс(Т); [R.]
661. *Halothamnus glaucus*(Bieb.)Botsch. (*Salsola glauca* Bieb.) - Галотамнус
сизый = II(Кизл): (Ирано-Туран.); Дс(Phn); [R.]
662. *Climacoptera crassa*(Bieb.)Botsch. (*Salsola crassa* Bieb.) - Климакоптера
мясистая = I(М); II(ВП): (Туранск.); Дс(Т); [Sp.]
663. *C. brachiata*(Pall.)Botsch. (*S. brachiata* Pall.) - К. супротиволистная =
II(ВП): (Вост.др.средиз.); Дс(Т); [Sp.]
664. *Anabasis aphylla* L. - Анабазис безлистный = II(ВП): (Ирано-Туран.);
ST(Ch:sf); [Sp.] <Pt;Pm>
665. *Petrosimonia triandra*(Pall.)Simonk. - Петросимония трёхтычинковая =
I(М); II(КН): (Субтуран*.); Дс(Т); [Sp.] <Pp>

666. *P. oppositifolia*(Pall.)Litv. (*P. crassifolia*(Pall.)Bunge) - П.
супротиволистная = I(М); II(ВП): (Субтуран*.); Dc(T); [Sp.]
667. *P. brachiata*(Pall.)Bunge – П. раскидистая = II(ВП): (Ирано-Туран.);
Dc(T); [Rs.] <Pp>
- Сем. 61. AMARANTHACEAE Juss. - ЩИРИЦИЕВЫЕ
668. *Amaranthus retroflexus* L. - Щирица запрокинутая = I(М); II(ВП);
III(СКТ): (Плюрирег.); Rb(T); [Pl.]
669. *A. albus* L. - Щ. белая = I(М); II(ВП); III(ТС); IV(БН):
(Адвент.[Сев.Америка]); Rb(T); [R.]
670. *A. graecizans* L. - Щ. маскированная = I(М); II(КН); III(ЧО): (Адвент.);
Rb(T); [R.]
671. *A. cruentus* L. (*A. paniculatus* L.) – Щ. кровавая = I(М); II(ВП):
(Плюрирег.); Rb(T); [Pl.]
672. *A. blitoides* S.Wats. - Щ. жминдовидная = I(М); II(ВП); III(СКТ):
(Адвент.[Сев.Америка]); Rb(T); [Sp.]
- Сем. 62. PORTULACACEAE Juss. - ПОРТУЛАКОВЫЕ
673. *Portulaca oleracea* L. - Портулак огородный = I(М); II(ВП); III(СКТ):
(Общедр.средиз.); Ra,Rb(T); [Pl.] <Pa;Pm>
- Сем. 63. CARYOPHYLLACEAE Juss. - ГВОЗДИЧНЫЕ
674. *Herniaria caucasica* Rupr. – Грыжник кавказский = III(BC): (Субкавказ*.);
Do(Ch); [Sp.]
675. *H. besseri* Fisch.ex Hornem (*H. incana* Lam.) – Г. Бессера = I(М); II(ВП);
III(СКТ); IV(БН): (Общедр.средиз.); ST,Db(Ch:sf); [Pl.]
676. *H. hirsuta* L. (*H. cinerea* DC.) - Г. волосистый = III(Ч): (Общедр.средиз.);
Db,Dd(T); [R.] <Pm>
677. *Scleranthus annuus* L. - Дивала однолетняя = Все районы: (Палеаркт.);
ST,Rb(T); [Pl.]
678. *S. uncinatus* Schur - Д. крючковатая = III(СКТ,Тер): (Общедр.средиз.);
Da,Rb(T); [Pl.]
679. *S. polycarpus* L. - Д. многоплодная = III(СКТ): (Субсредиз*.); Pa(T);
[Sp.]
680. *Stellaria media*(L.)Vill. - Звёздчатка средняя = Все районы: (Голаркт.);
Rb(T); [Pl.] <Pa;Pm>
681. *S. neglecta* Weihe - З. незамеченная = Все районы: (Палеаркт.); Rb(T);
[Sp.]
682. *S. holostea* L. - З. ланцетовидная = I(М); III(ЧО,Ч); IV(БН): (Палеаркт.);
S(НК); [Sp.] <Pm>
683. *S. graminea* L. - З. злачная = III(СКТ): (Палеаркт.); S,Pa(НК); [Pl.] <Pm>
684. *S. persica* Boiss. – З. персидская = III(BC): (Кавк.); Pc(НК); [Sp.]
685. *S. anagalloides* C.A.Meу. ex Rupr. - З. курослепная = III(BC): (Эукавк.);
Pb,Pc(НК); [Sp.]
686. *Myosoton aquaticum*(L.)Moench (*Malachium aquaticum* Fries) -
Мягковолосник водный = I(М); II(ВП); III(СКТ,Тер): (Палеаркт.); Aa(НК);
[Sp.]

687. *Cerastium cerastoides*(L.)Britt. – Ясколка обыкновенная = III(BC): (Голаркт.); Pс(НК); [Pl.]
688. *C. kasbek* Parrot – Я. казбекская = III(BC): (Эукавк.); Pс,Do(НК); [Pl.] <EsubE>
689. *C. multiflorum* C.A.Mey. – Я. многоцветковая = III(BC): (Эукавк.); Pс,Do(НК); [R.] <EsubE>
690. *C. holosteam* Fisch.ex Hornem. - Я. костенцовая = III(Тер): (Эукавк.); S(НК); [Pl.]
691. *C. nemorale* Vieb. - Ясколка лесная = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Субкавк*.); S(T); [Pl.]
692. *C. davuricum* Fisch.ex Spreng. - Я. даурская = III(BC): (Субтуран*.); S,Pa(НК); [Sp.]
693. *C. hemischinicum* Schischk. – Я. хемшинская = III(BC - Армхи): (Кавк.); Pb(НК); [Sp.]
694. *C. perfoliatum* L. - Я. пронзённолистная = II(Кизл): (Зап.др.средиз); Pa(T); [R.]
695. *C. ruderale* Vieb. - Я. сорная = I(M); II(ВП); III(ТС): (Эукавк.); Pa(T); [Sp.]
696. *C. brachypetalum* Desp.ex Pers. (*C. tauricum* Spreng.) - Я. крымская = IV(БН): (Евро-Кавк.); Rb(T); [Sp.]
697. *C. glomeratum* Thuill. - Я. скупенноцветковая = III(Тер): (Плюрирег.); Db(T); [Sp.]
698. *C. balericum* F.Herm. (*C. dentatum* Moschl.) - Я. зубчатая = I(M); III(СКТ): (Субтуран*.); ST(T); [Sp.]
699. *C. glutinosum* Fries - Я. липкая = IV(БН): (Евро-Кавк.); Db,Dc(T); [R.]
700. *C. purpurascens* Adams - Я. пурпурная = III(Тер): (Кавк.); Pb(НК); [Pl.] <Pp>
701. *C. holosteoides* Fries (*C. caespitosum* Gilib) - Я. дернистая = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Плюрирег.); Pa,Aa(НК); [Pl.]
702. *C. polymorphum* Rupr. – Я. полиморфная = III(BC): (Эукавк.); Pс,Do(НК); [Pl.]
703. *C. arvense* L. - Я. полевая = Все районы: (Голаркт.); Pa(НК); [Pl.]
704. *Dichodon viscidum*(Vieb.)Holub (*Cerastium dubium*(Bast.)Guerin; *C. anomalum* Waldst.et Kit.) - Я. уклоняющаяся = I(M - Терек); II(ВП); III(ЧО): (Субсредиз*.); Aa(T); [R.]
705. *Holosteam umbellatum* L. - Костенец зонтичный = Все районы: (Палеаркт.); ST(T:eph); [Pl.]
706. *H. glutinosum*(Vieb.)Fisch.et C.A.Mey. - К. липкий = I(M); IV(БН): (Ирано-Туран.); ST(T:eph); [R.]
707. *Sagina saginoides*(L.)Karst. – Мшанка обыкновенная = III(BC): (Палеаркт.); Pс(НК); [Pl.]
708. *S. procumbens* L. – М. лежачая = III(BC): (Палеаркт.); Pb,Pс,Do(НК); [Sp.]
709. *Queria hispanica* L. - Кверия испанская = III(Ч,ТС); IV(БН): (Зап.др.средиз); ST(T:eph); [R.]

710. *Minuartia hybrida*(Vill.)Schischk. – Минуарция гибридная = IV(БН): (Субсредиз*.); ST(T); [R.]
711. *M. oreina*(Mattf.)Schischk. – М. горная = III(BC): (Субкавказ*.); Pb, Pc, Do(НК); [Pl.]
712. *M. biebersteinii*(Rupr.)Schischk. – М. Биберштейна = III(BC): (Эукавказ.); Da(НК); [Pl.]
713. *M. verna*(L.)Hiern – М. весенняя = III(BC): (Голаркт.); Pb, Pc(НК); [Pl.]
714. *M. aizoides*(Boiss.)Bornm. – М. айзовидная = III(BC): (Субкавказ*.); Pc, Do(НК); [Sp.]
715. *M. circassica*(Albov)Woronow (*M. caucasica*(Adams ex Rupr.)Mattf.) - М. черкесская = III(BC): (Кавк.); Da(НК); [Pl.]
716. *M. imbricata*(Bieb.)Woronow – М. черепитчатая = III(BC): (Кавк.); Pb, Pc, Do(НК); [Pl.]
717. *M. inamoena*(C.A.Mey.)Woronow – М. неприятная = III(BC): (Эукавказ.); Pc, Do(НК); [Pl.]
718. *Arenaria serpyllifolia* L. - Песчанка чебрецелистная = Все районы: (Голаркт.); Db, Rb(T); [Pl.]
719. *A. rotundifolia* Bieb. – П. круглолистная = III(BC): (Субкавказ*.); Pb(НК); [R.]
720. *A. lychnidea* Bieb. – П. горичветная = III(Тер): (Кавк.); Pc, Do(НК); [Pl.]
721. *Moehringia trinervia*(L.)Clairv. - Мерингия трёхжилковая = III(СКТ, Тер): (Палеаркт.); S(T); [Sp.]
722. *Spergularia maritima*(All.)Chiov. (*S. media*(L.)C.Presl., *S. marginata*(DC) Kitr.) - Торичник средний = I(M); II(ВП); IV(БН): (Субтуран*.); Dc, Aa(T); [Pl.]
723. *S. rubra*(L.)J.et C.Presl (*S. campestris*(L.)Aschers.) - Т. красный = II(ВП); IV(БН): (Евро-Сиб.); Dc(T); [R.]
724. *S. salina* J.et C.Presl (*S. marina*(L.)Griseb.) - Т. морской = I(M); II(ВП); IV(БН): (Плюрирег.); Dc(T); [Sp.]
725. *Agrostemma githago* L. - Куколь обыкновенный = I(M); II(ВП); III(СКТ): (Палеаркт.); Ra(T); [Sp.] <Pt; Pm>
726. *Pleconax conica*(L.)Sourkova (*P. subconica*(Friv.)Sourkova, *Silene subconica* Friv., *S. conica* L.) – Плеконакс конический = II(ВП): (Общедр.средиз.); ST, Rb(T); [Sp.]
727. *Oberna wallichiana* Klotzsch – Оберна Уоллича = III(BC): (Субкавказ*.); Pb(НК); [Pl.]
728. *O. multifida*(Adams)Ikonn. (*S. multifida*(Adams)Rohrh.) - О. многоорасечённая = III(СКТ, Тер): (Кавк.); S(НК); [Pl.] <Rt>
729. *O. lacera*(Stev.)Ikonn. (*S. lacera*(Stev.)Sims.) – О. разрезная = III(BC): (Кавк.); Pc, Do(НК); [Sp.]
730. *Silene gallica* L. (*S. anglica* L.) – Смолёвка французская = III(ЧО): (Средиземн.); Rb(НК:pb); [R.]
731. *S. compacta* Fisch.ex Hornem. - С. скученноцветковая = III(BC): (Субкавказ*.); ST(НК); [Sp.]

732. *S. ruprechtii* Schischk. (*S. saxatilis* Bieb.) - С. Рупрехта = II(BC): (Субкавказ*.); Pb, Pc(НК); [Pl.]
733. *S. spergulifolia* (Desf.) Bieb. - С. торичниколистная = III(BC): (Ирано-Туран.); Da(НК); [Sp.]
734. *S. chlorifolia* Smith - С. зеленолистная = III(BC - Итум-Кале): (Ирано-Туран.); Da(НК); [Sp.] <Rx>
735. *S. rugmaea* Adams - С. карликовая = III(BC): (Эукавказ.); Pb, Pc, Do(НК); [Pl.]
736. *S. humilis* C.A. Mey. - С. низкая = III(BC): (Эукавказ.); Pc, Do(НК); [Sp.]
737. *S. linearifolia* Otth - С. линейнолистная = III(BC): (Эукавказ.); Da(НК); [Sp.]
738. *S. italica* (L.) Pers. - С. итальянская = III(СКТ, Тер); IV(БН): (Средиземн.); S, Pa(НК); [Sp.]
739. *Otites cyri* (Schischk.) Grossh. (*Silene cyri* Schischk.) - Отитес куринский = I(М); II(ВП); III(BC): (Туранск.); ST(T); [Sp.]
740. *O. parviflora* (Ehrh.) Grossh. (*S. borystenica* (Grun.) Walters, *S. parviflora* (Ehrh.) Pers.) - О. мелкоцветковый = II(ВП): (Евро-Сиб.); Db(T); [R.]
741. *O. wolgensis* (Hornem.) Grossh. (*S. wolgensis* (Hornem.) Bess. ex Spreng.) - О. волжский = I(М); II(ВП); III(СКТ): (Палеаркт.); ST, Da(T); [Pl.]
742. ★ *Petrocoma hoefftiana* (Fisch.) Rupr. - Петрокома Гёффта = III(Ч): (Эукавказ.); Da(НК); [Sp.] <EsubE>
743. *Elisanthe viscosa* (L.) Rupr. (*Silene viscosa* (L.) Pers.) - Элизанта клейкая = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); ST(НК); [Pl.]
744. *E. noctiflora* (L.) Rupr. (*S. noctiflora* L.) - Э. ночецветная = III(СКТ, Тер): (Евро-Сиб.); Rb(НК); [Sp.]
745. *Melandrium album* (Mill.) Garcke - Д. белая = Все районы: (Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm>
746. *Cucubalus baccifer* L. - Волдырник ягодный = I(М); III(ЧО): (Палеаркт.); Aa(НК); [R.]
747. *Gypsophila paniculata* L. - Гипсолюбка метельчатая = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Субтуран*.); ST(НК); [Sp.] <Pm; Pmel; Po>
748. *G. altissima* L. - Г. высокая = II(ВП); IV(БН): (Евро-Сиб.); Db(НК); [Sp.]
749. *G. acutifolia* Fisch. ex Spreng. - Г. остролистная = III(BC): (Эукавказ.); Da(НК); [Sp.]
750. *G. trichotoma* Wend. - Г. триждывилочатая = II(ВП): (Понт.-Южносиб.); Dc(НК); [Sp.]
751. *G. scorzonifolia* Ser. - Г. козелецелистная = I(М); II(ВП); III(ТС); IV(БН): (Предкавказ.); Db(НК); [R.]
752. *G. tenuifolia* Bieb. - Г. узколистная = III(BC): (Кавк.); Pb, Pc, Do(НК); [Pl.]
753. *G. elegans* Bieb. - Г. изящная = III(BC): (Субкавказ*.); Rb(T); [Pl.]
754. *Psammophiliella muralis* (L.) Ikonn. (*Gypsophila muralis* L.) - Г. настенная = I(М); II(ВП); III(СКТ): (Евро-Сиб.); Rb(T); [R.]

755. *Petrorhagia saxifraga*(L.)Link (*Kohlrauschia saxifraga*(L.)Dandy; *Tunica saxifraga*(L.)Scop.) - Петрорагия камнеломка = III(ЧО): (Армено-Иран.); Db(T); [R.]
756. *Kohlrauschia prolifera*(L.)Kunth - Кольраушия побегоносная = I(M); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Понтич.); ST,Rb(T); [Sp.] <Pm>
757. *Vaccaria hispanica*(Mill.)Rauschert (*V. segetalis* Garcke) - Тысячеголов = испанский = I(M); II(ВП); III(СКТ): (Плюрирег.); Ra(T); [Sp.]
758. *Dianthus armeria* L. - Гвоздика армериевидная = I(M); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Евро-Кавк.); Pa(НК:pb); [Sp.] <Pm>
759. *D. pseudoarmeria* Bieb. - Г. ложноармериевидная = III(ТС): (Понтич.); ST,Da(НК:pb); [Sp.] <Po>
760. *D. capitatus* Balb.ex DC. - Г. головчатая = I(M); III(СКТ,Тер): (Понтич.); Pa(НК); [Sp.] <Po>
761. *D. ruprechtii* Schischk. - Г. Рупрехта = III(Тер): (Эукавк.); Pa(НК); [Pl.] <Po>
762. *D. caucaseus* Smith. (*D. discolor* Smith) – Г. кавказская = III(Тер): (Кавк.); Pb(НК); [Pl.]
763. *D. imereticus*(Rupr.)Schischk. - Г. имеретинская = III(BC): (Эвксин.); Da(НК); [Sp.] <Rx> <Po>
764. *D. bicolor* Adams - Г. двуцветная = III(ЧО): (Эукавк.); Pa,ST(НК); [R.]
765. *D. pallidiflorus* Ser. - Г. бледноцветковая = I(M); II(ВП); III(ТС); IV(БН): (Понтич.); ST(НК); [R.]
766. *D. pallens* Smith (*D. lanceolatus* Stev.ex Reichenb.) - Г. ланцентая = I(M); II(ВП); III(СКТ): (Понтич.); ST,Db(НК); [Pl.]
767. *D. cretaceus* Adams – Г. меловая = III(BC): (Кавк.); Pb,Pc,Do(НК); [R.]
768. *D. fragrans* Adams - Г. душистая = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Эукавк.); Pa,Db(НК); [Sp.]
769. *D. daghestanicus* Charadze – Г. дагестанская = III(Ч): (Эукавк.); ST(НК); [Sp.] <Esub>
770. *D. arenarius* L. - Г. песчаная = I(M - Терек): (Понтич.); Db(НК); [Rs.] <Rx>
771. *Saponaria officinalis* L. – М. лекарственная = III(СКТ): (Европ.); Aa,Rb(НК); [Sp.] <Po;Pm>
- Сем. 64. NYMPHAEACEAE Salisb. - НИМФЕЙНЫЕ
772. *Nymphaea alba* L. - Кувшинка белая = II(Кизл – Чубутлы): (Европ.); Ac(K); [Rs.] <Pm;Po><Rg>
- Сем. 65. CERATOPHYLLACEAE S.F.Gray - РОГОЛИСТНИКОВЫЕ
773. *Ceratophyllum demersum* L. - Роголистник погружённый = I(M); II(Кизл): (Палеаркт.); Ac(K); [R.]
774. *C. submersum* L. - Р. полупогружённый = I(M): (Палеаркт.); Ac(K); [R.]
- Сем. 66. PAEONIACEAE Rudolphi – (ОВЫЕ)
775. ★ *Paeonia tenuifolia* L. - Пион узколистный = III(СКТ); IV(БН): (Понтич.); Pa,ST(НК); [Pl.] <Pm;Po>
776. *P. biebersteiniana* Rupr. - П. Биберштейна = III(ЧО): (Предкавк.); Pa,ST(НК); [Sp.] <EsubE>

Сем. 67. RANUNCULACEAE Juss. - ЛЮТИКОВЫЕ

777. *Caltha polypetala* Hochst. – Калужница многолепестная = III(Тер): (Субкавказ*.); Pb, Pc, Aa(НК); [Sp.]
778. *Trollius ranunculinus*(Smith)Stearn (*T. patulus* Salisb.) - Купальница лютиковая = III(Тер): (Субкавказ*.); Pb, Pc(НК); [Sp.] <Pt>
779. *Helleborus caucasicus* A.Br. - Морозник кавказский = III(Ч): (Эвксин.); S(НК:hv); [Rs.] <Rt;Rg;Pm;Po>
780. *Nigella arvensis* L. - Чернушка полевая = III(ЧО); IV(БН): (Субсредиз*.); Rb(T); [Sp.] <Po>
781. *Actaea spicata* L. - Воронец колосовидный = III(Тер): (Евро-Сиб.); S(НК); [Sp.] <Rt>
782. *Aquilegia caucasica* Bieb. (*A. olympica* Boiss.) – Водосбор кавказский = III(Тер): (Субкавказ*.); S, Pb(НК); [Sp.]
783. *Consolida paniculata*(Host)Schur (*Delphinium paniculatum* Host) - Живокость метельчатая = I(М); II(ВП): (Субпонт*.); ST(T); [Pl.] <Pm>
784. *C. divaricata*(Ledeb.)Schroding. (*D. divaricatum* Ledeb.) - Ж. растопыренная = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Субпонт*.); Ra, Rb(T); [Pl.]
785. *C. regalis* S.F.Gray (*Delphinium consolida* L.) - Ж. великолепная = I(М); III(СКТ); IV(БН): (Европ.); Ra, Rb(T); [Sp.]
786. *C. orientalis*(J.Gay)Schroding. - Ж. восточная = I(М); II(Кизл); III(ЧО, BC): (Субсредиз*.); ST, Rb(T); [Sp.]
787. *Delphinium caucasicum* C.A.Meу. – Дельфиниум кавказский = III(Тер): (Эукавказ.); Pc, Do(НК); [Pl.]
788. *D. flexuosum* Bieb. - Д. извилистый = III(Тер): (Кавк.); Pb(НК); [Sp.] <Pt>
789. ★*Diedropetala punicea*(Pall.)Galushko (*Delphinium puniceum* Pall.) - Диэдропеталля пунцовая = II(ВП); III(ТС); IV(БН): (Туранск.); ST(НК); [Rs.] <Pt>
790. *D. schmalhauseni*(Albov)Galushko (*D. schmalhauseni* Albov) - Д. Шмальгаузена = III(СКТ, Ч): (Эвксин.); Pa(НК); [Pl.] <Pt>
791. *D. freynii*(Cornath)Galushko (*D. freynii* Cornath) – Д. Фрейна = IV(БН): (Субкавказ*.); Pa(НК); [R.]
792. *Aconitum confertiflorum*(DC.)Worosch. – Борец скученноцветковый = III(Тер): (Палеаркт.); Pb, Pc(НК); [Pl.]
793. *A. orientale* Mill. - Борец восточный = III(Тер): (Субкавказ*.); Pb(НК); [Pl.]
794. *A. pubiceps*(Rupr.)Trautv. – Б. опушенный = III(Тер): (Эукавказ.); Pb(НК); [Sp.]
795. *A. nasutum* Fisch.ex Reichenb. - Б. носатый = III(Тер): (Кавк.); Pb(НК); [Sp.]
796. *Anemonastrum fasciculatum*(L.)Holub (*Anemone fasciculata* L.) - Анемонаструм пучковатый = III(Тер): (Кавк.); Pb, Pc(НК); [Sp.]
797. *A. speciosum*(Adams ex G.Pritz.)Galushko (*A. speciosa* Adams ex G.Pritz.) – А. видный = III(Тер): (Эукавказ.); Pc(НК); [Pl.]

798. *Anemonoides ranunculoides*(L.)Holub (*Anemone ranunculoides* L.) –
Анемоноидес лютичный = III(СКТ,Тер): (Евро-Кавк.); S(К:eph); [Pl.]
799. ★ *A. blanda*(Schott et Kotschy)Holub (*A. blanda* Schott et Kotschy) - А.
приятный = III(Ч): (Эвксин.); S(К:eph); [R.] <Rg>
800. *Anemone sylvestris* L. - Ветреница лесная = III(СКТ,Тер): (Евро-Сиб.);
Pa,ST(НК); [Sp.] <Po>
801. *Pulsatilla albana*(Stev.)Bercht.et J.Presl – Сон албанский = III(Тер):
(Кавк.); Pb(НК:eph); [Pl.] <Po>
802. *P. andina*(Rupr.)Woronow – С. андийский = III(Ч): (Эукавк.); Pb,Рс(НК);
[R.] <Esub>
803. *P. violacea* Rupr. – С. фиолетовый = III(BC): (Субкавк*.); Рс(НК); [Sp.]
804. *Clematis integrifolia* L. - Ломонос цельнолистный = III(Тер): (Понт.-
Южносиб.); Pa,Pb(Ch:sf); [Sp.] <Po;Pmel>
805. *C. pseudoflammula* Schmalh. ex Lipsky (*C. lathyrifolia* Bess. ex Reichenb.)
- Л. ложножгучий = II(Кизл); III(Тер); IV(БН): (Понтич.); Pa,ST(Ch:sf);
[Sp.]
806. *C. orientalis* L. - Л. восточный = I(М); II(ВП): (Общедр.средиз.);
Pa(Ch:ll); [R.] <Pmel>
807. *Myosurus minimus* L. - Мышехвостник маленький = III(ЧО):
(Плюрирег.); Aa(T); [R.]
808. *Ceratcephala testiculata*(Crantz)Bess. - Рогоглавник яйцевидный = I(М);
II(ВП); III(СКТ): (Палеаркт.); Dd(T:eph); [Pl.]
809. *C. falcata*(L.)Pers. – Р. серповидный = I(М): (Общедр.средиз.);
ST(T:eph); [R.] <Pm>
810. *Ficaria calthifolia* Reichenb. - Чистяк калужницелистный = III(СКТ,Тер);
IV(БН): (Зап.др.средиз.); S,Pa(НК:eph); [Pl.] <Pm>
811. *Batrachium aquatile*(L.)Dumort (*B. triphyllum*(Wallr.) Dumort.;
Ranunculus aquatilis L.) – Водяной лютик обыкновенный = III(Тер):
(Европ.); Ac(K); [R.]
812. *B. trichophyllum*(Chaix)Bosch (*B. divaricatum*(Schränk)Wimm.;
Ranunculus trichophyllum Chaix) - В.л. волосистолистный = III(Тер):
(Панбор.); Ac(K); [R.]
813. *B. rionii*(Lagger)Nym. (*Ranunculus rionii* Lagger) - В.л. Риона = II(ВП);
III(Тер): (Палеаркт.); Ac(K); [Sp.]
814. *Ranunculus auricomus* L. - Лютик золотистый = III(BC): (Европ.);
Aa(НК); [Rs.] <Rg>
815. *R. sceleratus* L. - Л. ядовитый = I(М); II(ВП); III(СКТ): (Голаркт.); Aa(T);
[Pl.] <Pt>
816. *R. raddeanus* Regel – Л. Радде = III(Тер): (Эукавк.); Pb,Рс(НК); [Sp.]
817. *R. repens* L. - Л. ползучий = III(СКТ,Тер): (Голаркт.); Aa,Ab(K); [Pl.]
<Pt;Pm>
818. *R. tebulosica* Prima – Л. тебулосский = III(BC - истоки Аргуна):
(Эукавк.); Рс,Do(НК); [R.] <Es>
819. *R. caucasicus* Vieb. - Л. кавказский = III(Тер): (Кавк.); Pa,Aa(НК); [Sp.]
<Pt>

820. *R. trisectilis* Ovcz. – Л. трёхрассечённый = III(Тер): (Кавк.); Pb, Pc, Do(НК); [Sp.]
821. *R. acutilobus* Ledeb. – Л. остролопастный = III(Тер): (Кавк.); Pb, Pc(НК); [Pl.]
822. *R. baidarae* Rupr. - Л. Байдары = III(Тер): (Кавк.); Pb, Pc(НК); [Rs.] <Pt>
823. *R. brachylobus* Boiss. et Hohen. – Л. коротколопастный = III(BC): (Армено-Иран.); Pc, Do(НК); [Sp.]
824. *R. arachnoideus* С.А.Мей. – Л. паутинистый = III(BC): (Эукавк.); Pc, Do(НК); [Pl.]
825. *R. oreophilus* Bieb. - Л. горный = III(СКТ, Тер): (Евро-Кавк.); Pb, Pc(НК); [Sp.] <Pt>
826. *R. meyerianus* Rupr. (*R. polyanthemos* L.) - Л. Мейера = II(Кизл); III(СКТ, Тер); IV(БН): (Евро-Кавк.); Pa(НК); [Pl.] <Pt>
827. *R. elegans* С. Koch – Л. изящный = III(Тер): (Кавк.); Pc(НК); [Sp.]
828. *R. oxyspermus* Willd. - Л. остроплодный = I(М); II(ВП); III(ТС, Ч); IV(БН): (Ирано-Туран.); ST(НК); [Pl.] <Pt>
829. *R. illiricus* L. (*R. meridionalis* Grossh.) - Л. иллирийский = III(ТС); IV(БН): (Зап.др.средиз.); Pa, ST(НК); [Sp.]
830. *Thalictrum triternatum* Rupr. – Василистник триждытройчатый = III(Тер): (Эукавк.); Pb, Pc(НК); [R.]
831. *Th. foetidum* L. - Василистник вонючий = III(Тер): (Палеаркт.); Db(НК); [Sp.] <Pt; Pm>
832. *Th. minus* L - В. малый = II(ВП); III(СКТ, Тер); IV(БН): (Голаркт.); Pa, ST(НК); [Pl.] <Pt; Pm>
833. *Th. simplex* L. - В. простой = III(Тер); IV(БН): (Палеаркт.); Pb(НК); [R.]
834. *Th. flavum* L. - В. жёлтый = I(М); II(КН); III(СКТ): (Евро-Сиб.); Pa(НК); [R.] <Pm>
835. *Adonis vernalis* L. - Горичвет весенний = III(СКТ): (Евро-Сиб.); Pa, ST(НК:ephd); [Sp.] <Pm; Po>
836. *A. aestivalis* L. - Г. летний = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Общедр.средиз.); Ra, Rb(T); [Sp.] <Pm>
837. *A. parviflora* Fisch. ex DC. – Г. немногочетковый = III(ТС): (Туранск.); ST(T); [R.]
- Сем. 68. BERBERIDACEAE Juss. - БАРБАРИСОВЫЕ
838. *Berberis vulgaris* L. - Барбарис обыкновенный = III(СКТ, Тер); IV(БН): (Европ.); ST, Pb(Phn); [Pl.] <Pm; Pmel; Pa>
- Сем. 69. PAPAVERACEAE Juss. - МАКОВЫЕ
839. *Chelidonium majus* L. - Чистотел большой = I(М); III(СКТ, Тер); IV(БН): (Палеаркт.); S, Rb(НК); [Pl.] <Pm>
840. *Glaucium corniculatum*(L.) Rudolph - Мачок рогатый = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Общедр.средиз.); Ra, Rb(T); [Sp.]
841. ★ *Papaver bracteatum* Lindl. - Мак прицветниковый = III(ТС); IV(БН): (Предкавк.); Pa(НК); [Rs.] <Po> <EsubE>
842. *P. caucasicum* Bieb. (*P. fugax* Poir.) – М. кавказский = III(BC): (Кавк.); Pc, Do(НК); [Pl.]

843. *P. ocellatum* Woronow - М. глазчатый = IV(БН): (Туранск.);
Da,Dd,Rb(T:eph); [R.] <Rx>
844. *P. hybridum* L. - М. гибридный = I(М); II(ВП); III(ЧО):
(Общедр.средиз.); Ra,Rb(T:eph); [Sp.]
845. *P. macrostomum* Boiss.et Huet - М. крупнокоробочковый = II(Кизл):
(Армено-Иран.); ST,Ra,Rb(T:eph); [R.]
846. *P. rhoeas* L. - М. самосейка = I(М); III(ЧО): (Общедр.средиз.);
Ra,Rb(T:eph); [R.] <Pm>
847. *P. commutatum* Fisch.et C.A.Mey. - М. спутанный = III(ТС); IV(БН):
(Субкавказ*.); Ra,Rb(T:eph); [Sp.]
848. *P. dubium* L. - М. сомнительный = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН):
(Субсредиз*.); Ra,Rb(T:eph); [Sp.]
849. *P. laevigatum* Vieb. (*P. maeoticum* Klok.) - М. голый = I(М): (Понтич.);
Ra,Rb(T:eph); [R.]
850. *P. arenarium* Vieb. - М. песчаный = I(М); III(ВП); III(ТС); IV(БН):
(Туранск.); Ra,Rb(T:eph); [Sp.]
- Сем. 70. FUMARIACEAE DC. - ДЫМЯНКОВЫЕ
851. *Corydalis marschalliana*(Pall. ex Willd.)Pers - Хохлатка Маршалла = I(М);
III(СКТ,Ч): (Субпонт*.); S(K:eph); [Pl.]
852. *C. roseo-purpurea*(Rupr.)Galushko - Х. розово-пурпуровая = I(М);
III(ЧО): (Предкавказ.); S(K:eph); [Sp.] <Es>
853. *C. caucasica* DC. - Х. кавказская = III(СКТ,Тер): (Эвксин.); S(K:eph);
[Sp.]
854. *C. conorrhiza* Ledeb. - Х. коническикорневая = III(Тер): (Кавк.);
Pc,Do(K:eph); [Sp.]
855. *C. alpestris* C.A.Mey. - Х. альпийская = III(Тер): (Кавк.); Pc(K:eph);
[Sp.]
856. *C. bayerniana* Rupr. - Х. Байерна = III(ВС): (Эукавказ.); Pc(K:tph); [Sp.]
<Esub>
857. *Fumaria schleicheri* Soy.-Willem. - Дымянка Шлейхера = Все районы:
(Евро-Сиб.); Ra,Rb(T:eph); [Pl.]
858. *F. vaillantii* Loisel - Д. Вайланта = Все районы: (Общедр.средиз.);
Ra,Rb(T:eph); [Sp.] <Pm>
- Сем. 71. BRASSICACEAE Burnett - КАПУСТНЫЕ (Крестоцветные)
859. *Cardaria draba*(L.)Desv. (*Lepidium draba* L.) - Кардария крупка = I(М);
II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); Rb(НК); [Pl.] <Pm;Pp>
860. *C. propingua*(Fisch.et C.A.Mey.)N.Busch (*L. propinquum* Fisch.et
C.A.Mey.) - К. близкая = III(ЧО): (Кавк.); Rb(НК); [R.]
861. *Lepidium campestre*(L.)R.Br. - Кресс полевой = I(М); II(ВП); III(СКТ);
IV(БН): (Европ.); Ra,Rb(НК:pb); [Sp.]
862. **L. sativum* L. - К. посевной = I(М); II(Кизл); III(Тер): (Адвент.[родина
неизвестна]); Rb(T); [R.]
863. *L. ruderale* L. - К. сорный = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.);
Rb(T); [Pl.] <Pm>

864. *L. pinnatifidum* Ledeb. - К. перисторассечённый = II(Кизл): (Туранск.); Dc(T); [R.] <Rx>
865. *L. perfoliatum* L. - К. пронзённый = I(M); II(ВП); III(ТС): (Палеаркт.); Rb(T); [Sp.]
866. *L. crassifolium* Waldst.et Kit. - К. толстолистный = II(Кизл); IV(БН): (Субтуран*.); Dc(НК); [Sp.]
867. *L. latifolium* L. - К. широколистный = I(M); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); Dc(НК); [Pl.] <Pm>
868. *Isatis caucasica*(Rupr.)N.Busch – Вайда кавказская = III(Ч): (Эукавк.); Pb, Pc(НК); [Sp.]
869. *I. pseudoararatica* Galushko nomen nudum – В. ложноараратская = III(Ч – Скалистый хр., г. Хахалги): (Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Es>
870. *I. sabulosa* Stev.ex Ledeb. – В. песчаная = I(M); II(ВП): (Предкавк.); Db(НК:pb); [Sp.] <Esub>
871. *Sameraria cardiocarpa* Trautv. – Самерария сердцеплодная = IV(БН): (Эукавк.); ST(T); [R.] <Esub>
872. *Apterigia pumila*(Stev.)Galushko (*Thlaspi pumilum*(Stev.)Ledeb.) – Аптеригия маленькая = III(Ч): (Эукавк.); Pc, Do(НК); [Pl.]
873. *Thlaspi arvense* L. - Ярутка полевая = Все районы: (Палеаркт.); Ra, Rb(T); [Pl.]
874. *Microthlaspi perfoliatum*(L.)F.K.Mey. (*Thlaspi perfoliatum* L.) - Ярутка пронзённолистная = Все районы: (Палеаркт.); Ra, Rb(T); [Pl.]
875. *Eunomia rotundifolia* C.A.Mey. – Эвномия круглолистная = III(Тер): (Кавк.); Pc, Do(НК); [Sp.]
876. *Capsella bursa-pastoris*(L.)Medik. - Пастушья сумка обыкновенная = Все районы: (Плюрирег.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm>
877. *Hymenolobus procumbens*(L.)Fourr. - Многосемянник простёртый = II(Кизл): (Палеаркт.); Db(T); [R.]
878. *Alliaria petiolata*(Bieb.)Cavara et Grande (*A. officinalis* Andrz. ex Bieb.) - Чесночница черешковая = Все районы: (Палеаркт.); S(НК); [Pl.] <Pm>
879. *A. brachycarpa* Bieb. – Ч. короткоплодная = III(BC): (Эукавк.); Pb, Do(НК); [Sp.]
880. *Sobolewsia caucasica*(Rupr.)N.Busch – Соболевская кавказская = III(BC): (Эукавк.); Pb, Do(НК:pb); [Sp.]
881. *Sisymbrium officinale*(L.)Scop. - Гулявник лекарственный = III(СКТ): (Плюрирег.); Ra, Rb(T); [Sp.] <Pm>
882. *S. loeselii* L. - Г. Лёзелиев = Все районы: (Палеаркт.); Ra, Rb(T); [Pl.]
883. *S. erucastriifolium*(Rupr.)Trautv. – Г. эруколистный = III(BC): (Эукавк.); ST, Rb(НК:pb); [Sp.]
884. *S. polymorhum*(Murr.)Roth - Г. полиморфный = I(M); III(ТС): (Палеаркт.); ST(НК); [R.]
885. *S. daghestanicum* Vass. – Г. дагестанский = IV(БН): (Эукавк.); Rb(T); [Sp.]
886. *S. altissimum* L. - Г. высокий = I(M); II(ВП): (Голаркт.); Ra, Rb(T); [Sp.]

887. *Murbeckiella huetii*(Boiss.)Rothm. (*Phryne huetii*(Boiss.)O.E.Schultz) – Мурбекиелла Юта = III(Тер): (Кавк.); Pc,Do(НК); [Pl.]
888. *Neotorularia contortuplicata*(Steph.)Hedge et J.Leonard (*Torularia contortuplicata*(Steph.)O.E.Schulz) - Чёточник скученный = II(ВП): (Туранск.); Rb(T); [R.]
889. *Arabidopsis pumila*(Steph.)N.Busch - Резушка низкая = I(М); II(ВП); IV(БН): (Ирано-Туран.); Rb(T); [R.]
890. *A. thaliana*(L.)Heynh. - Р. Таля = II(Кизл); III(ЧО): (Палеаркт.); Rb(T); [Sp.]
891. *Camelina microsarpa* Andrz. - Рыжик мелкоплодный = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.]
892. *C. sativa*(L.)Crantz (*C. glabrata*(DC.)Fritsch) - Р. голый = II(ВП): (Панбор.); Ra,Rb(T); [R.]
893. *Descurainia sophia*(L.)Webb ex Prantl - Дескурайния Софии = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.] <Pa;Pm>
894. *Brassica campestris* L. – Капуста полевая = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.]
895. *B. juncea*(L.)Czern. - К. сарептская = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.] <Pm>
896. *Erucastrum armoracioides*(Czern.ex Turcz.)Cruent (*Brassica armoracioides* Czern. ex Turcz.; *B. elongata* Ehrh.) - К. удлинённая = I(М); II(ВП); III(СКТ): (Палеаркт.); ST(T); [Pl.]
897. *Sinapis arvensis* L. - Горчица полевая = Все районы: (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.] <Pmel>
898. *Raphanus raphanistrum* L. - Редька обыкновенная = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Адвент.[Зап.Европа]); Ra,Rb(T); [Pl.]
899. *Calerina irregularis*(Asso)Thell. - Калепина неравномерная = IV(БН): (Субсредиз*.); Rb(T); [R.]
900. *Crambe pinnatifida* R.Br. - Катран перистый = III(ТС): (Понтич.); ST(НК); [R.] <Pa>
901. *C. gibberosa* Rupr. - К. бугорчатый = I(М); II(Кизл); III(ТС): (Кавк.); ST(НК); [R.] <Pa>
902. *C. tatarica* Sebeok - К. татарский = II(ВП); III(ТС): (Понтич.); ST(НК); [R.] <Pa>
903. *C. grandiflora* DC. - К. крупноцветковый = III(ТС); IV(БН): (Предкавк.); ST(НК); [Rs.]
904. *Rapistrum rugosum*(L.)All. - Репник морщинистый = II(Кизл); III(СКТ); IV(БН): (Субсредиз*.); Pa,ST(T); [Sp.]
905. *Conringia orientalis*(L.)Dumort. - Конрингия восточная = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Общедр.средиз.); Pa(T); [Pl.]
906. *Cardamine rectinata* Pall. ex DC. – Сердечник гребенчатый = III(Ч): (Кавк.); S(T); [Sp.]
907. *C. impatiens* L. – С. недотрога = III(Тер): (Палеаркт.); S(T); [Sp.]
908. *C. hirsuta* L. - С. жестковолосистый = III(Тер): (Плюрирег.); S(T); [R.]
909. *C. uliginosa* Vieb. – С. болотный = III(Тер): (Субкавк*.); Aa(НК); [Pl.]

910. *Dentaria bulbifera* L. - Зубьянка луковиценосная = III(Тер): (Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]
911. *D. quinquefolia* Bieb. - З. пятилистная = III(СКТ): (Евро-Кавк.); S(К:ephd); [Pl.]
912. *D. bipinnata* С.А.Меу. – З. дваждыперистая = III(Тер): (Эукавк.); Pc,Do(НК); [Sp.]
913. *Barbarea arcuata*(Opiz.exJ.et C.Presl.)Reichenb. - Сурепка дуговидная = III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); Pa,Rb(НК:pb); [Pl.]
914. *Arabis sagittata*(Bertol.)DC. (*A. hirsuta auct.*) - Резуха стреловидная = III(СКТ,Тер): (Панбор.); S(T); [Sp.]
915. *A. recta* Vill. (*A. auriculata* Lam.) - Р. ушастая = I(M); III(СКТ): (Обшедр.средиз.); Pa(T); [Sp.]
916. *A. caucasica* Schlecht. – Р. кавказская = III(BC): (Субкавк*.); Pb,Pc,Do(НК); [Sp.]
917. *A. flaviflora* Bunge – Р. желтоцветковая = III(BC): (Кавк.); Pb,Do(НК);
918. *Turritis glabra* L. - Вяжечка голая = III(СКТ): (Палеаркт.); Pa,Ra,Rb(T); [Pl.] <Pm>
919. *Rorippa sylvestris*(L.)Bess. - Жерушник лесной = III(Ч): (Европ.); Ab(К); [R.]
920. *R. barbareaifolia*(DC.)Kitag. (*R. islandica*(Oed.)Schinz et Thell; *R. palustris*(Leyss.)Bess.) - Ж. исландский = I(M); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Голаркт.); Aa(НК); [Pl.]
921. *R. austriaca*(Crantz)Bess. - Ж. австрийский = I(M); III(ЧО): (Европ.); Aa,Ab(К); [Sp.]
922. ★*Pseudovesicaria digitata*(С.А.Меу.)Rupr. – Лжепузырник пальчатый – III(BC): (Эукавк.); Pc,Do(НК:pb); [Sp.]
923. *Draba scabra* С.А.Меу. – Крупка шероховатая = III(Тер): (Эукавк.); Pb,Pc,Do(НК); [Pl.]
924. *D. bryoides* DC. – К. моховидная = III(Тер): (Кавк.); Pb,Pc,Do(НК); [Pl.]
925. *D. bruniiifolia* Stev. – К. бруниелистная = III(BC): (Субкавк*.); Pc,Do(НК); [R.]
926. *D. siliquosa* Bieb. – К. стручковая = III(Тер): (Субкавк*.); Pb,Pc,Do(НК); [Pl.]
927. *D. supranivalis* Rupr. – К. предснежная = III(BC): (Эукавк.); Pc,Do(НК); [Sp.]
928. *D. mollissima* Stev. – К. мягчайшая = III(Тер): (Эукавк.); Pb,Do(НК); [Pl.]
929. *D. ossetica*(Rupr.)Somm. et Levier – К. осетинская = III(BC): (Эукавк.); Do(НК); [Sp.] <EsubE>
930. *D. stylalis* J.Gay ex Koch – К. столбиковая = III(BC): (Европ.); ST(НК); [Sp.]
931. *D. hispida* Willd. – К. щетинистоволосистая = III(BC): (Субкавк*.); Pb,Pc,Do(НК); [Sp.]
932. *D. sibirica*(Pall.)Thell. - К. сибирская = III(Тер): (Евро-Сиб.); Pb(НК); [Sp.]

933. *D. nemorosa* L. - К. перелесковая = Все районы: (Панбор.); Pa(T); [Pl.] <Pm>
934. *Erophila verna*(L.)Bess. - В. обыкновенная = Все районы: (Палеаркт.); ST(T:eph); [Pl.]
935. *Alyssum tortuosum* Waldst.et Kit. - Бурачок извилистый = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Вост.др.средиз.); ST(НК); [Pl.]
936. *A. murale* Waldst.et Kit. - Б. стеной = III(Тер): (Зап.др.средиз.); ST(НК); [Pl.]
937. *A. andinum* Rupr. – Б. андийский = III(Ч): (Эукавк.); Pb,Pc(НК); [Pl.] <Esub>
938. *A. desertorum* Stapf - Б. пустынный = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); ST(T); [Pl.]
939. *A. hirsutum* Vieb. - Б. шершавый = III(Тер): (Субпонт*.); ST(T); [Sp.]
940. *A. parviflorum* Fisch.ex Vieb. (*A. rothmaleri* Galushko.; *A. campestre auct.*) - Б. мелкоцветковый = III(ТС); IV(БН): (Армено-Иран.); ST(T); [Sp.] <Rx>
941. *A. calycinum* L. (*A. alyssoides*(L.)L.) - Б. чашечковый = Все районы: (Евро-Кавк.); ST(T); [Pl.]
942. *Meniocus linifolius*(Steph.)DC. - Плоскоплодник линейнолистный = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); ST(T); [Pl.]
943. *Berteroa incana*(L.)DC. - Икотник серый = Все районы: (Евро-Сиб.); ST,Ra,Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm;Pmel>
944. *Euclidium syriacum*(L.)R.Br. - Крепкоплодник сирийский = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Ирано-Туран.); Rb(T); [Pl.]
945. *Neslia paniculata*(L.)Desv. - Неслия метельчатая = Все районы: (Евро-Сиб.); ST,Ra,Rb(T); [Pl.] <Pm>
946. *Bunias orientalis* L. - Свербига восточная = III(СКТ); IV(БН): (Евро-Кавк.); ST,Ra,Rb(НК:pb); [Pl.]
947. *Hesperis matronalis* L. (*H. caucasica* Rupr.) - Ночная фиалка обыкновенная = III(СКТ,Тер): (Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]
948. *H. meyerana*(Trautv.)N.Busch – Н.ф. Мейера = III(Тер): (Эукавк.); Pb(НК:pb); [Sp.]
949. *H. ruscotricha* Vorb.et Degen - Н.ф. густоволосистая = III(СКТ,Тер): (Евро-Сиб.); S(НК:pb); [Pl.]
950. *Sterigmostemum incanum* Vieb. (*S. torulosum*(Vieb.)Stapf) – Стеригма серая = III(Ч): (Армено-Иран.); ST(НК:pb): [R.]
951. *Erysimum cuspidatum*(Vieb.)DC. - Желтушник щитовидный = Все районы: (Общедр.средиз.); Pa,ST(НК:pb); [R.]
952. *E. aureum* Vieb. - Ж. золотистый = III(СКТ,Тер): (Кавк.); S,Pa(НК:pb); [Sp.]
953. *E. ibericum*(Adams)DC. – Ж. грузинский = III(Тер): (Кавк.); Pb(НК); [Sp.]
954. *E. substrigosum*(Rupr.)N.Busch - Ж. шершавый = III(BC): (Эукавк.); Da(НК); [Sp.]
955. *E. repandum* L. - Ж. выгрызенный = III(СКТ): (Общедр.средиз.); Ra,Rb(T); [Sp.]

956. *E. subnivale* Prima – Ж. приснежный = III(BC - Тебулос-мта): (Эукавк.); Pс,Do(НК); [R.] <Es>
957. *E. leucanthemum*(Steph.)В.Fedtsch. - Ж. бледноцветковый = I(M); II(Кизл); III(ЧО): (Ирано-Туран.); ST(НК:pb); [Sp.]
958. *E. versicolor*(Bieb.)Andrz. - Ж. разноцветный = I(M); II(КН): (Палеаркт.); ST(НК); [R.]
959. *E. canescens* Roth (*E. diffusum* Ehrh.) - Ж. раскидистый = III(ТС); IV(БН): (Вост.др.средиз.); ST(НК:pb); [Sp.] <Pm>
960. *Syrenia siliculosa*(Bieb.)Andrz. - Сирения стручковая = I(M); II(ВП): (Субтуран*.); Db(НК:pb); [Pl.] <Pm>
961. *Matthiola daghestanica*(Conti)N.Busch – Левкой дагестанский = IV(БН): (Эукавк.); Da(НК); [R.] <EsubE>
962. *Chorispora tenella*(Pall.)DC. - Хориспора нежная = Все районы: (Общедр.средиз.); Ra,Rb(Т); [Pl.]
Сем. 72. CAPPARACEAE Juss. - КАПЕРЦЕВЫЕ
963. *Cleome daghestanica*(Rupr.)Tzvel. (*C. ornithopodioides* L.) – Клеома дагестанская = III(BC): (Вост.др.средиз.); Da(Т); [R.]
964. *Capparis herbacea* Willd. (*C. spinosa* L.) - Каперцы колючие = II(Кизл); IV(БН): (Вост.др.средиз.); Dd(Ch:sf); [Sp.] <Pa;Pm;Pmel>
Сем. 73. RESEDACEAE S.F.Gray - РЕЗЕДОВЫЕ
965. *Reseda lutea* L. - Резеда жёлтая = III(СКТ); IV(БН): (Зап.др.средиз.); Pa,Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm>
Сем. 74. DROSERACEAE Salisb. - РОСЯНКОВЫЕ
966. *Drosera rotundifolia* L. – Росянка круглолистная = III(BC): (Голаркт.); Aa(НК:pi); [R.] <Rg><Pm>
Сем. 75. CRASSULACEAE DC. - ТОЛСТЯНКОВЫЕ
967. *Sempervivum caucasicum* Rupr.ex Boiss. - Молодило кавказское = III(BC): (Эукавк.); Da(НК:ps); [Sp.] <Po>
968. *S. pumilum* Bieb. - М. низкое = III(BC): (Кавк.); Da(НК:ps); [Pl.] <Po>
969. *Hylotelephium caucasicum*(Grossh.)H.Ohba (*Sedum caucasicum* Grossh.) - Очиток кавказский = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Кавк.); Da(НК:ps); [Pl.] <Pm>
970. *Prometheum pilosum*(Bieb.)H.Ohba (*Rosularia pilosa*(Grossh.)Boriss., *Sedum pilosum* Bieb.) – Прометеум волосистый = III(BC): (Субкавк*.); Pb,Do(НК:ps); [Sp.]
971. *Sedum stevenianum* Rouy et Camus – Очиток Стевена = III(BC): (Эукавк.); Pс,Do(НК:ps); [Sp.]
972. *S. involucratum* Bieb. – О. обёртковый = III(BC): (Эукавк.); Pb,Do(НК:ps); [Sp.]
973. *S. spurium* Bieb. - О. ложный = III(Тер): (Эвксин.); Da(НК:ps); [R.]
974. *S. oppositifolium* Sims - О. супротиволистный = III(Тер): (Субкавк*.); Da(НК:ps); [Sp.] <Pm>
975. *S. stoloniferum* S.G.Gmel. - О. побегоносный = III(Ч): (Субкавк*.); S(НК:ps); [R.] <Rg>
976. *S. tenellum* Bieb. – О. тоненький = III(Тер): (Кавк.); Pb,Pс(НК:ps); [Pl.]

977. *S. gracile* C.A.Mey. – О. стройный = III(BC): (Субкавк*.); Pb,Do(НК:ps); [Sp.]
978. *S. acre* L. - О. едкий = III(Тер): (Европ.); Da(НК:ps); [Sp.] <Pt;Pm;Po>
979. *S. hispanicum* L. - О. испанский = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Средиземн.); ST,Da,Db(Т:ps); [Pl.]
980. *S. pallidum* Bieb. - О. бледный = III(ЧО): (Армено-Иран.); ST,Rb(Т:ps); [Pl.]
981. *S. argunense* Galushko – О. аргунский = III(Ч – р.Аргун): (Эукавк.); S,Do(Т:ps); [R.] <Es>
982. *S. annuum* L. – О. однолетний = III(BC): (Европ.); ST,Do(Т:ps); [R.]
983. *S. tetramerum* Trautv. – О. четырёхчленный = IV(БН): (Ирано-Туран.); ST,Do(Т:ps); [R.]
- Сем. 76. SAXIFRAGACEAE Juss. - КАМНЕЛОМКОВЫЕ
984. *Saxifraga hirculus* L. – Камнеломка болотная = III(BC): (Палеаркт.); Pc,Aa(НК); [Sp.]
985. *S. flagellaris* Willd.ex Sternb. - Камнеломка плетистая = III(BC): (Евро-Сиб.); Da(НК); [Rs.]
986. *S. cymbalaria* L. – К. кимвальная = III(Тер): (Вост.др.средиз.); S(НК); [Sp.]
987. *S. tridactylites* L. - К. трёхпалая = III(BC): (Европ.); Da(Т); [Pl.]
988. *S. mollis* Smith – К. мягкая = III(Тер): (Армено-Иран.); Pb,Pc,Do(НК); [Pl.]
989. *S. moschata* Wulf – К. мускусная = III(Тер): (Европ.); Pb,Pc,Do(НК); [Pl.]
990. *S. pontica* Albov – К. понтийская = III(Тер): (Кавк.); Pc,Do(НК); [Sp.]
991. *S. exarata* Vill. – К. рыхлая = III(Тер): (Европ.); Pb,Do(НК); [Pl.]
992. *S. adenophora* C.Koch – К. железистая = III(BC): (Армено-Иран.); Pb,Do(НК); [R.]
993. *S. cartilaginea* Willd. – К. хрящеватая = III(Тер): (Кавк.); Pb,Pc,Do(НК); [Pl.]
994. *S. kolenatiana* Regel – К. Коленати = III(Тер): (Кавк.); Pb,Pc,Do(НК); [Sp.]
995. *S. juniperifolia* Adams – К. можжевелолистная = III(Тер): (Кавк.); Pb,Do(Ch); [Pl.]
996. *S. subverticillata* Boiss. – К. почтимутовчатая = III(BC): (Эукавк.); Pc,Do(Ch); [Sp.]
997. *S. meyeri* Manden – К. Мейера = III(BC): (Эукавк.); Pc,Do(Ch); [R.]
998. *S. ruprechtiana* Manden. – К. Рупрехта = III(BC): (Эукавк.); Pc,Do(НК); [Sp.]
999. *S. pseudolaevis* Oetting. (*S. laevis* Bieb.) – К. ложногладкая = III(BC): (Эукавк.); Pc,Do(Ch); [R.]
1000. *S. charadzae* Otsch. – К. Харадзе = III(Ч): (Эукавк.); Pb,Do(НК); [R.] <Esub>
1001. *S. scleropoda* Somm. et Levier – К. сухоногая = III(BC): (Эукавк.); Pb,Pc,Do(Ch); [Pl.]

1002. *Chrysosplenium alternifolium* L. - Селезёночник очереднолистный = III(Тер): (Панбор.); S(T); [Pl.] <Pm>
Сем. 77. PARNASSIACEAE S.F.Gray – БЕЛОЗОРОВЫЕ
1003. *Parnassia palustris* L. - Белозор болотный = III(Тер): (Голаркт.); Аа(НК); [R.] <Pm>
Сем. 78. GROSSULARIACEAE DC. - КРЫЖОВНИКОВЫЕ
1004. *Ribes biebersteinii* Berl. ex DC. – Смородина Биберштейна = III(ЧО,Тер): (Кавк.); S(Phn); [Pl.]
1005. *Grossularia reclinata*(L.)Mill. - Крыжовник отклонённый = III(Тер): (Европ.); S(Phn); [Pl.] <Pa;Pm>
Сем. 79. ROSACEAE Juss. - РОЗОВЫЕ
1006. *Spiraea crenata* L. - Спирея(Таволга) городчатая = III(СКТ,Тер): (Понт.-Южносиб.); Pa,ST(Phn); [Sp.] <Pmel>
1007. *S. hypericifolia* L. – С.(Т.) зверобоелистная = III(Тер): (Туранск.); ST,Da(Phn); [Sp.]
1008. *Aruncus vulgaris* Rafin. - Волжанка обыкновенная = III(СКТ,Тер): (Европ.); S(НК); [Sp.] <Po>
1009. *Cotoneaster melanocarpus* Fisch.ex Blytt - Кизильник черноплодный = III(Тер): (Палеаркт.); Da(Phn); [Sp.]
1010. *C. integerrimus* Medik. - К. цельнокрайний = III(Тер): (Европ.); Pb(Phn); [Pl.]
1011. *C. suavis* Pojark.(*C. racemiflorus*(Desf.)Booth ex Bosse) - К. приятный = III(Тер); IV(БН): (Ирано-Туран.); Da(Phn); [R.]
1012. *Cydonia oblonga* Mill. - Айва продолговатая = II(КН – Терек); III(ЧО - Сунжа): (Общедр.средиз.); S(Phm); [Sp.] <Pa>
1013. *Pyrus caucasica* Fed. - Груша кавказская = II(ВП); III(СКТ,Тер); IV(БН): (Кавк.); S(Phms); [Pl.] <Pa;Pmel>
1014. *P. salicifolia* Pall. - Г. иволистная = II(КН - Киссык): (Кавк.); Db(Phm); [Sp.] <Rx> I.c. Червлёная
1015. *Malus orientalis* Uglitzk. - Яблоня восточная = Все районы: (Субкавк*.); S(Phms); [Pl.] <Pa;Pm>
1016. *Sorbus aucuparia* L. (*S. caucasigena* Kom. et Gatsch.) - Рябина обыкновенная = III(Тер): (Европ.); S(Phms); [Pl.] <Pm;Pa>
1017. *S. migarica* Zinserl. - Р. мигарская = III(ВС): (Эукавк.); Da(Phn); [R.]
1018. *S. fedorovii* Zaikovn. – Р. Фёдорова = III(ВС): (Эукавк.); Do(Phn); [R.]
1019. *S. torminalis*(L.)Crantz - Р. глоговина = III(Ч): (Европ.); S(Phms); [Sp.] <Rg;Rt>
1020. *Amelanchier ovalis* Medik. (*A. rotundifolia*(Lam.)Dum.-Cours. nom. illegit.) - Ирга овальная = III(Тер): (Средиземн.); Da(Phn); [Sp.] <Pa>
1021. *Mespilus germanica* L. - Мушмула германская = II(М - Терек); III(СКТ,Тер); IV(БН): (Общедр.средиз.); S(Phm); [R.] <Pm>
1022. *Crataegus pentagyna* Waldst.et Kit. - Боярышник пятипестичный = II(Кизл); III(СКТ,Тер); IV(БН): (Зап.др.средиз.); Pa,ST(Phm); [Pl.] <Pm;Pa;Pmel>

1023. *C. curvisepala* Lindm. (*C. kyrstostyla auct.*) - Б. согнуточашелистниковый = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Европ.); S(Phm); [Sp.] <Pm;Pa;Pmel>
1024. *C. pallasii* Griseb. - Б. Палласа = II(ВП); IV(БН): (Понтич.); Db(Phm); [Sp.] <Pmel>
1025. *C. monogyna* Jacq. - Б. однопестичный = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Европ.); S(Phm); [Sp.] <Pm;Pa;Pmel>
1026. *C. ambigua* С.А.Мей. ex А.Веск. - Б. сомнительный = I(М); II(ВП): (Понтич.); Db(Phm); [Sp.] <Pmel>
1027. *Rubus saxatilis* L. - Костяника обыкновенная = III(Тер): (Панбор.); Pb(НК); [Sp.] <Pa;Pmel;Pm>
1028. *R. buschii* Grossh.ex Sinjakova - Малина Буша = III(Тер): (Кавк.); S(Ch); [Sp.] <Pm;Pa;Pmel>
1029. *R. ibericus* Juz. - Е. грузинская = III(Ч – Шали-Ножай-Юрт): (Кавк.); S(Phn); [R.] <Pa;Pmel>
1030. *R. candicans* Weihe - Е. беловатая = III(Ч): (Европ.); S(Phn); [R.] <Pa;Pmel>
1031. *R. caesius* L. - Е. сизая = Все районы: (Палеаркт.); S,Pa(Phn); [Pl.] <Pa;Pm;Pmel>
1032. *R. hirtus* Waldst. et Kit. - М. щетинистая = III(Тер): (Средиземн.); S(Phn); [Sp.] <Pa;Pm;Pmel>
1033. *Fragaria viridis*(Duch.)Weston - Земляника зелёная = Все районы: (Евро-Сиб.); Pa(НК); [Pl.] <Pm;Pa>
1034. *F. vesca* L. - З. лесная = Все районы: (Голаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pm;Pa>
1035. *F. moschata*(Duch)Weston - З. мускусная = I(М); III(ЧО); IV(БН): (Европ.); S(НК); [R.] <Pm;Pa>
1036. *Pentaphylloides fruticosa*(L.)O.Schwarz (*Dasiphora fruticosa*(L.) Rydb., *Potentilla fruticosa* L.) - Курильский чай кустарниковый = III(ВС): (Панбор.); Pb(Ch); [R.] <Pa;Pm>
1037. *Potentilla elatior* Willd. ex Schlecht. - Лапчатка высокая = III(ВС): (Кавк.); Pb(НК); [R.]
1038. *P. ghalgana* Juz. (*P. oweriniana* Boiss.) - Л. ингушская = III(Ч): (Эукавк.); Da(НК); [Rs.] <Esub>
1039. *P. sterilis*(L.)Garcke - Л. бесплодная = III(Ч – верховья Гехи): (Европ.); S(НК); [R.] <Rg>
1040. *P. micrantha* Ramond ex DC. - Л. мелкоцветковая = III(ЧО,Тер): (Средиземн.); S(НК); [Sp.]
1041. *P. foliosa* Somm. et Levier - Л. олиственная = III(Тер): (Кавк.); S,Pb(НК); [R.]
1042. *P. alexeenkoi* Lipsky - Л. Алексеенко = III(ВС - Шаро-Аргун): (Эукавк.); Do(НК); [Rs.] <Esub>
1043. *P. agrimonioides* Vieb. - Л. репейниколистная = III(ВС): (Кавк.); Do(НК); [Pl.]
1044. *P. nivea* L. - Л. снежная = III(ВС): (Голаркт.); Pc,Do(НК); [R.]
1045. *P. argentea* L. - Л. серебристая = Все районы: (Евро-Сиб.); ST(НК); [Pl.] <Pm>

1046. *P. canescens* Bess. (*P. inclinata auct.*) - Л. седая = Все районы: (Палеаркт.); Pa(НК); [Sp.]
1047. *P. recta* L. - Л. прямая = Все районы: (Палеаркт.); Pa,ST(НК); [Pl.]
1048. *P. obscura* Willd. - Л. неясная = Все районы: (Субкавказ*.); Pa,ST(НК); [Sp.]
1049. *P. semilaciniosa* Borb. - Л. полунадрезанная = III(ЧО); IV(БН): (Субкавказ*.); Pa(НК); [R.]
1050. *P. supina* L. - Л. низкая = I(М); II(ВП): (Голаркт.); Aa(T); [Pl.]
1051. *P. ruprechtii* Boiss. - Л. Рупрехта = III(BC): (Эукавказ.); Pb,Pc(НК); [Sp.]
1052. *P. caucasica* Juz. - Л. кавказская = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Кавк.); Pa,ST(НК); [Sp.]
1053. *P. gelida* С.А.Мей. - Л. холодная = III(BC): (Субкавказ*.); Do(НК); [Pl.]
1054. *P. crantzii* (Crantz)G.Beck ex Fritsch - Л. Кранца = III(Тер): (Кавк.); Pb,Pc(НК); [Pl.]
1055. *P. arenaria* Borkh. (*P. glaucescens Schlecht.*) - Л. сизоватая = III(Ч): (Понт.-Южносиб.); ST,Da(НК); [Sp.]
1056. *P. erecta*(L.)Ralusch. - Л. прямостоящая = III(Тер): (Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pm>
1057. *P. reptans* L. - Л. ползучая = Все районы: (Палеаркт.); Aa(НК); [Pl.] <Pm;Pp>
1058. *Sibbaldia parviflora* Willd. - Зиббальдия редкоцветковая = III(BC): (Субкавказ*.); Pb,Pc(НК); [Pl.]
1059. *S. semiglabra* С.А.Мей. - З. полуголая = III(BC): (Субкавказ*.); Pc,Do(НК); [Sp.]
1060. *Geum urbanum* L. - Гравилат городской = Все районы: (Палеаркт.); S,Rb(НК); [Pl.] <Pm;Pa>
1061. *G. allepicum* Jacq. (*G. strictum Ait.*) - Г. аллепский = III(Тер): (Голаркт.); S(НК); [R.]
1062. *G. rivale* L. - Г. речной = III(Тер): (Голаркт.); S,Aa(НК); [Pl.]
1063. *Dryas caucasica* Juz. - Куропаточья трава кавказская = III(BC): (Эукавказ.); Pc,Do(Ch:hv); [Pl.]
1064. *Filipendula vulgaris* Moench (*F. hexapatala Gilib.*) - Лабазник обыкновенный = Все районы: (Евро-Сиб.); Pa,ST(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>
1065. *F. ulmaria*(L.)Maxim. - Л. вязолистный = III(Тер): (Евро-Сиб.); Aa(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>
1066. *Alchemilla sericea* Willd. - Манжетка шелковая = III(BC): (Субкавказ*.); Pc,Do(НК); [Pl.]
1067. *A. chlorosericea*(Buser)Juz. - М. зелёношелковая = III(BC): (Эукавказ.); Pc,Do(НК); [R.] <Esub>
1068. *A. sericata* Reichenb.ex Bus. - М. шелковистая = III(Тер): (Кавк.); Pb,Pc,Do(НК); [Pl.]
1069. *A. rigida* Bus. - М. жёсткая = III(Тер): (Кавк.); Pc(НК); [Pl.]
1070. *A. elisabethae* Juz. - М. Елизаветы = III(BC): (Эукавказ.); Pc(НК); [Pl.] <EsubE>
1071. *A. caucasica* Bus. - М. кавказская = III(BC): (Кавк.); Pc(НК); [Pl.] <Pp>

1072. *A. languida* Bus. - М. вялая = III(BC): (Эукавк.); Pс(НК); [Sp.]
1073. *A. microdonta* Juz. – М. мелкозубчатая = III(BC): (Кавк.); Pa,Pb(НК); [Sp.]
1074. *A. tamarae* Juz. – М. Тамары = III(Ч): (Эукавк.); Pa(НК); [Sp.]
1075. *A. persica* Rothm. (*A. oxusepala* Juz.) – М. персидская = III(Тер): (Субкавк*.); Pb(НК); [Sp.]
1076. *A. ortotricha* Rothm. (*A. holotricha* Juz.) – М. прямоволосистая = III(Тер): (Кавк.); Pb,Аа(НК); [R.]
1077. *A. dura* Buser – М. твёрдая = III(BC): (Кавк.); Pb,Pс(НК); [Pl.]
1078. *A. retinervis* Buser – М. сетчатожилковая = III(BC): (Субкавк*.); Pb,Pс(НК); [Pl.]
1079. *Agrimonia eupatoria* L. – Репейничек аптечный = Все районы: (Евро-Кавк.); Pa,ST(НК); [Pl.] <Pm>
1080. *Sanguisorba officinalis* L. - Кровохлёбка аптечная = III(Тер): (Голаркт.); Pb(НК); [Sp.] <Pm;Pp>
1081. *Poterium polygamum* Waldst. et Kit. - Черноголовник многобрачный = Все районы: (Общедр.средиз.); Pa,ST(НК); [Pl.]
1082. *Rosa pimpinellifolia* L. (*R. spinosissima* L.) - Шиповник бедренецелистный = Все районы: (Палеаркт.); ST(Phn); [Pl.] <Pmel>
1083. *R. oxyodon* Boiss. – Ш. острозубчатый = III(BC): (Кавк.); Pb(Phn); [Sp.]
1084. *R. buschiana* Chrshan. – Ш. Буша = III(BC): (Кавк.); Pb(Phn); [Sp.]
1085. *R. canina* L. - Ш. собачий = Все районы: (Евро-Кавк.); Pa,ST(Phn); [Pl.] <Pm;Pmel>
1086. *R. dumalis* Beshst. (*R. afzeliana* Fries) – Ш. терновый = III(BC): (Европ.); Pa(Phn); [Sp.]
1087. *R. corymbifera* Borkh. - Ш. щитконосный = Все районы: (Палеаркт.); Pa,ST(Phn); [Pl.] <Pmel>
1088. *R. balsamina* Bess. (*R. klukii* Bess.) - Ш. Клюка = Все районы: (Евро-Кавк.); ST(Phn); [Sp.] <Pmel>
1089. *R. marschalliana* Sosn. - Ш. Маршалла = I(М); II(ВП): (Эукавк.); Pa,ST(Phn); [R.] <Pmel>
1090. *R. iberica* Stev.ex Bieb. - Ш. грузинский = III(Тер): (Субкавк*.); ST(Phn); [Sp.] <Pmel>
1091. *R. pulverulenta* Bieb. (*R. glutinosa auct.*) - Ш. припудренный = III(Тер): (Зап.др.средиз.); ST(Phn); [Sp.] <Pmel>
1092. *R. tomentosa* Smith (*R. cuspidata* Bieb.) - Ш. войлочный = II(Кизл); III(Ч); IV(БН): (Европ.); S(Phn); [Sp.] <Pmel>
1093. *R. mollis* Smith - Ш. мягкий = III(BC): (Евро-Кавк.); S(Phn); [R.] <Pmel>
1094. *R. pomifera* Herrm. – Ш. яблочный = III(BC): (Европ.); Da,Do(Phn); [Sp.]
1095. *R. boissieri* Crep. - Ш. Буасье = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Субкавк*.); S(Phn); [Sp.] <Pmel>
1096. *R. jundzillii* Bess. - Ш. Юндзилла = III(ЧО): (Европ.); ST(Phn); [R.] <Pmel>
1097. *R. tschatyrdagi* Chrshan. - Ш. чатырдагский = II(Кизл - Сулак): (Субпонт*.); Da(Phn); [R.] <Rx;Pmel>

1098. *Prunus spinosa* L. - Слива колючая = Все районы (Евро-Кавк.);
Pa,ST(Phn); [Pl.] <Pa;Pm>
1099. *P. divaricata* Ledeb. - С. растопыренная(Алыча) = Все районы:
(Общедр.средиз.); S(Phm); [Pl.] <Pa;Pm>
1100. *Amygdalus nana* L. - Миндаль низкий = I(M); II(ВП); III(СКТ); IV(БН):
(Понтич.); ST(Ch); [Sp.]
1101. *Cerasus avium*(L.)Moench - Вишня птичья (Черешня) = III(Ч): (Европ.);
S(Phms); [Pl.] <Pa;Pmel>
1102. *C. incana*(Pall.)Sprach - В. серая = III(BC); IV(БН): (Армено-Иран.);
ST(Phn); [R.] <Rx>
1103. *Padus avium* Mill. (*P. racemosus*(Lam.)Gilib.) – Черёмуха обыкновенная
= III(BC): (Палеаркт.); S(Phm); [Pl.] <Pm>
1104. **Armeniaca vulgaris* Lam. – Абрикос обыкновенный = I(M); II(ВП);
III(СКТ,Ч); IV(БН): (Адвент.[Центр.Азия]); Da(Phm); [Pl.] <Pa;Pm>
Сем. 80. FABACEAE Lindl. - БОБОВЫЕ
1105. *Pseudosophora alopecuroides*(L.)Sweet (*Sophora alopecuroides* L.,
Goebelia alopecuroides(L.)Bunge) - Псевдософора лисохвостная = I(M);
II(ВП); IV(БН): (Вост.др.средиз.); Db(НК); [Sp.] <Pt>
1106. *Ononis pusilla* L. - Стальник маленький = IV(БН): (Средиземн.);
Pa(Ch:sf); [Rs.] <Rx>
1107. *O. arvensis* L. - С. пашенный = Все районы: (Евро-Сиб.); Pa(НК); [Pl.]
<Pm;Pmel>
1108. *Trigonella orthoceras* Kar.et Kir. – Пажитник пряморогий = I(M); II(КН):
(Вост.др.средиз.); ST(T); [Sp.]
1109. *T. monspeliaca* L. - П. монпельевский = I(M); II(Кизл); IV(БН):
(Субпонт*.); Dc,Rb(T); [R.]
1110. *T. procumbens*(Bess.)Reichenb. - П. простёртый = I(M); II(КН):
(Палеаркт.); ST(T); [Sp.]
1111. *T. coerulescens*(Bieb.)Halacsy - П. голубоватый = I(M); II(КН):
(Зап.др.средиз.); ST(T); [R.] <Rx>
1112. *Medicago lupulina* L. - Люцерна хмелевидная = Все районы: (Палеаркт.);
Pa,Rb(НК); [Pl.] <Pp>
1113. *M. falcata* L. - Л. серповидная = Все районы: (Палеаркт.); ST(НК); [Pl.]
<Pp;Pmel>
1114. *M. romanica* Prod. - Л. румынская = III(ТС); IV(БН): (Палеаркт.);
ST(НК); [R.] <Pp>
1115. *M. sativa* L. - Л. посевная = I(M); II(ВП); III(СКТ): (Голаркт.);
Pa,ST(НК); [Sp.] <Pp;Pm;Pmel>
1116. *M. gunibica* Vass. - Л. гунибская = III(ЧО); IV(БН): (Эукавк.); ST(НК);
[R.] <Pp>
1117. *M. vardanis* Vass. – Л. варданикская = IV(БН): (Эукавк.); Pb(НК); [Sp.]
1118. *M. caerulea* Less.ex Ledeb. - Л. голубая = I(M); II(ВП); III(СКТ); IV(БН):
(Туранск.); ST,Db(НК); [Pl.] <Pp>
1119. *M. glutinosa* Bieb. (*M. virescens* Grossh.) - Л. клейкая = III(СКТ,Тер);
IV(БН): (Эукавк.); Pa,ST(НК); [R.] <Pp>

1120. *M. orbicularis*(L.)Bartalini - Л. округлая = III(ЧО); IV(БН):
(Зап.др.средиз.); ST,Rb(НК); [Sp.] <Pp>
1121. *M. rigidula*(L.)All. (*M. agrestis* Ten.) - Л. жестковатая = III(ЧО); IV(БН):
(Общедр.средиз.); ST,Rb(T); [R.]
1122. *M. daghestanica* Rupr. – Л. дагестанская = III(BC - Итумкале): (Кавк.);
Da(НК); [Sp.] <EsubE>
1123. *M. minima*(L.)Bartalini - Л. мелкая = Все районы: (Общедр.средиз.);
ST,Rb(T); [Pl.]
1124. *Melilotis polonicus*(L.)Pall. (*M. caspius* Grun.) – Донник каспийский =
I(M); II(ВП): (Субтуран*.); Db(НК); [Pl.] <Pp>
1125. *M. dentatus*(Waldst.et Kit)Pers. - Д. зубчатый = I(M); II(ВП); III(СКТ);
IV(БН): (Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.] <Pp>
1126. *M. albus* Medik. - Д. белый = I(M); II(ВП); III(СКТ); IV(БН):
(Палеаркт.); Rb(НК); [Pl.] <Pm;Pmel;Pp>
1127. *M. wolgicus* Poir. - Д. волжский = II(КН): (Понт.-Южносиб.); Rb(T);
[Rs.] <Pp> <Rx>
1128. *M. officinalis*(L.)Pall. - Д. лекарственный = Все районы: (Палеаркт.);
Rb(НК); [Pl.] <Pm;Pmel;Pp>
1129. *Lupinaster polyphyllum*(C.A.Mey.)Latsch. (*Trifolium polyphyllum*
C.A.Mey.) – Люпинастер многолистный = III(BC): (Кавк.); Pb,Pc(НК); [Pl.]
1130. *Amoria montana*(L.)Sojak (*Trifolium montanum* L.) – Амория(Клевер)
горный = III(СКТ,Тер): (Евро-Сиб.); Pa(НК); [Pl.] <Pp>
1131. *A. elisabethae*(Grossh.)Roskov (*T. elisabethae* Grossh.) – А.(К.) Елизаветы
= III(BC): (Эукавк.); Pc,Do(НК); [Pl.] <Esub>
1132. *A. ambigua*(Vieb.)Sojak (*T. ambiguum* Vieb.) – А.(К.) непостоянный = Все
районы: (Субпонт*.); Pa(НК); [Pl.] <Pp>
1133. *A. repens*(L.)C.Presl (*T. repens* L.) – А.(К.) ползучий = Все районы:
(Палеаркт.); Pa,Rb(НК); [Pl.] <Pp;Pmel;Pm>
1134. *A. hybrida*(L.)C.Presl (*T. hybridum* L.) – А.(К.) гибридный =
III(СКТ,Тер): (Европ.); Pa(НК); [Sp.] <Pp;Pm>
1135. *A. angulata*(Waldst.et Kit.)C.Presl (*T. angulatum* Waldst. et Kit.) – А.(К.)
угловатый = I(M); III(ЧО): (Евро-Кавк.); Pa(T); [R.] <Pp>
1136. *A. retusa*(L.)Dostal (*T. retusum* L.; *T. parviflorum* Ehrh.) – А.(К.)
притупленный = I(M); III(ЧО); IV(БН): (Субсредиз*.); Pa,Aa(T); [Sp.]
1137. *A. fragifera*(L.)Roskov (*T. fragiferum* L.) – А.(К.) земляничный = I(M):
(Палеаркт.); Aa(НК); [R.] <Pp>
1138. *A. bonannii*(C.Presl)Roskov (*T. bonnani* C.Presl; *T. neglectum* C.A.Mey.) -
А.(К.) Бонанна = Все районы: (Общедр.средиз.); Aa(НК); [Sp.] <Pp>
1139. *A. tumens*(Stev.ex Vieb.)Roskov (*T. tumens* Stev.ex Vieb.) – А.(К.) вздутый
= III(Ч); IV(БН): (Субкавк*.); Pa(НК); [R.]
1140. *Chrisaspis spadicea*(L.)Greene (*Trifolium spadiceum* L.) – Хризаспис
(Клевер) тёмно-каштановый = III(Тер): (Европ.); Pb,Pc(T); [Pl.]
1141. *Ch. aurea*(Poll.)Greene (*T. aureum* Poll.; *T. strepens* Crantz) - X.(К.)
золотисто-жёлтый = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Евро-Сиб.); Pa(T); [Sp.]

1142. *Ch. campestris*(Schreb.)Desv. (*T. campestre Schreb.*) - X.(К.) полевой =
Все районы: (Палеаркт.); Pa(T); [Pl.]
1143. *Ch. sebastianii*(Savi)Hendrych (*T. sebastianii Savi*) - X.(К.) Себастьяна =
III(ЧО); IV(БН): (Средиземн.); Pa(T); [R.]
1144. *Ch. rytidospermia*(Boiss. et Hohen.)Roskov (*T. rytidospermium Boiss. et Hohen.*) – X.(К.) морщинистый = III(BC): (Эукавк.); Pb, Pc(T); [Pl.]
1145. *Trifolium trichosephalum* Vieb. – Клевер волосистоголовый = III(BC):
(Кавк.); Pb, Pc(НК); [Pl.]
1146. *T. caucasicum* Tausch - К. кавказский = III(СКТ, Тер); IV(БН):
(Субкавк*.); S, Pb(НК); [Sp.]
1147. *T. canescens* Willd. – К. седоватый = III(СКТ, Тер); IV(БН): (Субкавк*.);
Pb, Pc(НК); [Pl.]
1148. *T. echinatum* Vieb. - К. иглистый = III(ЧО); IV(БН): (Средиземн.);
Db(T); [R.]
1149. *T. phleoides* Pourr. - К. батлачковый = III(ТС); IV(БН): (Средиземн.);
Pb(T); [R.]
1150. *T. striatum* L. - К. ребристый = III(СКТ, Ч); IV(БН): (Субсредиз*.); Pa(T);
[R.]
1151. *T. medium* L. - К. средний = III(СКТ, Тер); IV(БН): (Палеаркт.);
Pa, Pb(НК); [Sp.] <Pm; Pp>
1152. *T. alpestre* L. - К. предальпийский = III(СКТ, Тер); IV(БН): (Евро-Кавк.);
Pa, Pb(НК); [Pl.] <Pp>
1153. *T. pratense* L. - К. луговой = Все районы: (Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.]
<Pp; Pm>
1154. *T. fontanum* Vobr. – К. ключевой = III(BC): (Эукавк.); Pb(НК); [Sp.]
1155. *T. diffusum* Ehrh. - К. раскидистый = III(ЧО); IV(БН): (Европ.); Pa(T);
[Sp.]
1156. *T. arvense* L. - К. пашенный = Все районы: (Палеаркт.); Pa, ST(T); [Sp.]
1157. *Anthyllis caucasica*(Grossh.)Juz. (*A. varieagata auct.p.p.*) – Язвенник
кавказский = III(BC): (Субкавк*.); Pb, Pc, Do(НК); [Pl.]
1158. *A. macrocephala* Wend. (*A. polyphylla(DC.)Kit.ex Loud.*) – Я.
крупноголовый = III(СКТ, Ч): (Европ.); ST(НК); [Pl.] <Pm>
1159. *A. lachnophora* Juz. (*A. boissieri(Sagor.)Grossh.*) - Я. шерстеносный =
III(СКТ, Тер); IV(БН): (Кавк.); Pa, Pb, Do(НК); [Pl.]
1160. *Lotus corniculatus* L. - Лядвенец рогатый = I(M); III(ТС):
(Палеаркт.); ST(НК); [Sp.] <Pm; Pp>
1161. *L. tenuis* Waldst.et Kit. - Л. тонкий = I(M); II(Кизл); IV(БН):
(Субсредиз*.); Aa(НК); [Sp.] <Pm; Pp>
1162. *L. caucasicus* Kurgian.ex Juz. - Л. кавказский = Все районы: (Кавк.);
Pa(НК); [Pl.] <Pp>
1163. *Galega orientalis* Lam. - Козлятник восточный = III(СКТ, Тер); IV(БН):
(Кавк.); S(НК); [Pl.] <Pp>
1164. **Robinia pseudacacia* L. – Робиния лжеакация = I(M); II(ВП); III(СКТ);
IV(БН): (Адвент.[Сев.Америка]); ST(Phm); [Sp.]

1165. ★ *Eremosparton aphyllum* (Pall.) Fisch. et C.A. Mey. - Эremosпартон безлистный = I(M); II(KH): (Туранск.); Db(Ch); [Rs.] <Rx>
1166. *Colutea orientalis* Mill – Пузырник восточный = III(BC - Итумкале): (Кавк.); Da,Do(Phn); [Sp.] <Rx>
1167. *Caragana mollis* (Bieb.) Bess. - Карагана мягкая = III(TC); IV(BH): (Понтич.); ST(Ch); [Sp.] <Rx;Pmel;Po>
1168. *Astracantha caucasica* (Pall.) Podlech (*Tragacantha caucasica* Stev., *Astragalus caucasicus* Pall.) – Астраканта кавказская = IV(BH): (Субкавк*.); Da(Phn); [R.]
1169. *A. aurea* (Willd.) Podlech (*T. aurea* Stev., *Astragalus aureus* Willd.) – А. золотистая = III(BC): (Субкавк*.); Da(Ch:fl); [Rs.]
1170. *A. denudata* (Stev.) Podlech (*T. denudata* (Stev.) Stev., *A. denudatus* Stev., *A. marschallianus* Fisch.) – А. обнажённая = III(BC): (Эукавк.); Da(Phn); [R.]
1171. *Astragalus contortuplicatus* L. - Астрагал свёрнутый = II(KH); III(ЧО): (Понтич.); Aa(T); [R.]
1172. *A. striatellus* Pall. ex Vieb. - А. полосатый = II(Кизл); IV(BH): (Ирано-Туран.); Dd(T); [Rs.]
1173. *A. hamosus* L. (*A. brachyceras* Ledeb.) – А. крючковатый = II(Кизл); III(ЧО); IV(BH): (Ирано-Туран.); ST, Rb(T); [R.]
1174. *A. cicer* L. - А. нутовый = Все районы: (Европ.); Pa(HK); [Pl.] <Pr>
1175. *A. oreades* C.A. Mey. – А. горный = III(BC): (Эукавк.); Pc(HK); [Pl.]
1176. *A. supinus* Bunge – А. прилегающий = III(BC): (Эукавк.); Pc, Do(HK); [Sp.] <EsubE>
1177. *A. danicus* Retz. - А. датский = II(Кизл); III(СКТ, Тер): (Евро-Сиб.); Pb(HK); [Sp.]
1178. *A. brachytropis* (Stev.) C.A. Mey. - А. коротколодочковый = III(BC): (Эукавк.); Pc(HK); [Rs.]
1179. *A. alpinus* L. – А. альпийский = III(BC): (Голаркт.); Pc(HK); [Pl.]
1180. *A. glycyphyllos* L. - А. сладколистный = Все районы: (Европ.); S(HK); [Pl.] <Pm;Pr>
1181. *A. galegiformis* L. - А. козлятниковый = III(СКТ, Тер); IV(BH): (Кавк.); Pa, ST(HK); [Sp.]
1182. *A. longipetalus* Chater (*A. longiflorus* Pall. nom. illegit. superfl.) - А. длинноцветковый = I(M); II(BП): (Туранск.); Db(Ch); [Sp.]
1183. *A. maximus* Willd. – А. большой = III(BC): (Субкавк*.); Pa, Pb(HK); [Sp.]
1184. *A. lehmannianus* Bunge - А. Леманна = II(KH): (Туранск.); Db(Ch); [Rs.] <Rx>
1185. *A. falcatus* Lam. - А. серповидный = III(СКТ, Тер); IV(BH): (Евро-Кавк.); Pb(HK); [Sp.] <Pr>
1186. *A. asper* Jacq. - А. шершавый = III(TC); IV(BH): (Понтич.); ST(HK); [R.]
1187. *A. austriacus* Jacq. - А. австрийский = III(СКТ, Тер); IV(BH): (Понт.-Южносиб.); ST(HK); [Sp.]
1188. *A. cartiosus* Boriss. (*A. interpositus* Boriss.) - А. межлежащий = III(BC): (Эукавк.); ST(HK); [Sp.]

1189. *A. bungeanus* Boiss. - А. Бунге = III(ТС); IV(БН): (Субкавказ*.); ST(НК); [Sp.] <Pp>
1190. *A. onobrychis* L. - А. эспарцетный = Все районы: (Европ.); ST,Db(НК); [Pl.] <Pp>
1191. *A. dolichophyllus* Pall. - А. длиннолистный = I(М); II(Кизл); IV(БН): (Понтич.); ST(НК); [Sp.]
1192. *A. alexandri* Charadze – А. Александра = III(Тер): (Эукавказ.); Pb,Do(НК); [Sp.]
1193. *A. kasbeki* Charadze – А. казбекский = III(ВС): (Эукавказ.); Pb,Pc,Do(НК); [Sp.]
1194. *A. brachycarpus* Vieb. - А. короткоплодный = IV(БН): (Субкавказ*.); ST(НК); [R.]
1195. *A. brachylobus* Fisch. - А. коротколопастный = I(М); II(КН): (Понт.-Южносиб.); Db(Phn); [Sp.] <Rx>
1196. *A. varius* S.G.Gmel. (*A. virgatus* Pall.) - А. разнообразный = II(КН) (Понт.-Южносиб.); Db(Ch); [R.] <Rx>
1197. *A. cornutus* Pall. - А. рогоплодный = I(М); II(КН - Терские пески): (Субтуран*.); ST(Ch); [R.] <Rx>
1198. *A. subuliformis* DC. (*A. subulatus* Pall.) - А. шилоподобный = III(ЧО); IV(БН): (Понт.-Южносиб.); Da(Ch); [R.]
1199. ★ *A. karakugensis* Bunge - А. каракугинский = I(М); II(КН): (Туранск.); Db(Ch:sf); [Rs.] <Rx>
1200. *A. hircanus* Pall. – А. гирканский = II(Кизл) – южная часть): (Туранск.); Db(Ch:sf); [Sp.]
1201. *A. calycinus* Vieb. - А. чашечный = I(М); IV(БН): (Кавк.); ST(НК); [R.]
1202. *Oxytropis owerinii* Bunge - Остролодочник Оверина = III(Тер): (Эукавказ.); Pc(НК); [Pl.]
1203. *O. pilosa*(L.)DC. - О. волосистый = Все районы: (Евро-Сиб.); ST(НК); [Pl.]
1204. *O. cyanea* Vieb. - О. синий = III(Тер): (Кавк.); Da(НК); [Pl.]
1205. *Glycyrrhiza glabra* L. - Солодка голая = I(М); II(ВП); III(СКТ): (Общедр.средиз.); ST(НК); [Pl.] <Pm;Pp>
1206. *G. aspera* Pall. - С. шершавая = III(ТС); IV(БН): (Туранск.); ST(НК); [R.]
1207. *G. echinata* L. - С. щетинистая = II(Кизл); III(ЧО): (Зап.др.средиз.); Aa(НК); [Sp.]
1208. *G. foetidissima* Tausch (*G. macedonica* Boiss.et Orph.) - С. зловонная = I(М); II(ВП); III(ЧО): (Зап.др.средиз.); Aa(НК); [Sp.]
1209. *Coronilla coronata* L. – Вязель корончатый = III(ЧО,Тер); IV(БН): (Евро-Кавк.); ST,Da(НК); [Sp.]
1210. *Securigera varia*(L.)Lassen (*Coronilla varia* L.) - Вязель пёстрый = Все районы: (Евро-Кавк.); Pa(НК); [Pl.] <Pm>
1211. *Hedysarum biebersteinii* Zertova (*H. argenteum* Vieb.) – Копеечник Биберштейна = III(ВС): (Предкавказ.); Da(НК); [Sp.]
1212. *H. saucasicum* Vieb. – К. кавказский = III(Тер): (Эукавказ.); Pc(НК); [Pl.]

1213. *Xanthobrychis majorovii*(Grossh.)Galushko (*O. majorovii* Grossh.) - Ксантобрихис Майорова = III(ТС); IV(БН): (Предкавк.); Db,ST(НК); [Sp.] <EsubE>
1214. *Onobrychis petraea*(Bieb. ex Willd.)Fisch. - Эспарцет каменный = III(BC): (Кавк.); Da(НК); [Sp.] <Pmel>
1215. *O. biebersteinii* Sirj. – Э. Биберштейна = III(Тер): (Кавк.); Pb,Рс(НК); [Pl.]
1216. *O. cyri* Grossh. - Э. куринский = Все районы: (Кавк.); ST(НК); [Pl.] <Pp;Pmel>
1217. *O. dielsii*(Sirj.)Vass. - Э. Дильса = III(СКТ); IV(БН): (Предкавк.); ST(НК); [R.] <Pp;Pmel> <EsubE>
1218. *O. novopokrovskii* Vass. - Э. Новопокровского = I(М); II(КН); III(ТС); IV(БН): (Предкавк.); Db,Dd(НК); [Sp.] <Pmel> <Esub> I.c. ст. Червлёная
1219. *O. inermis* Stev. - Э. невооружённый = III(СКТ); IV(БН): (Предкавк.); Pa(НК); [Sp.]
1220. *Alhagi pseudalchagi*(Bieb.)Fisch. - Верблюжья колючка обыкновенная = I(М); II(Кизл): (Ирано-Туран.); ST(Ch); [Pl.] <Pm;Pmel>
1221. *Vicia sepium* L. - Горошек заборный = Все районы: (Евро-Сиб.); Pa(НК); [Pl.] <Pmel;Pp>
1222. *V. truncatula* Fisch.ex Bieb. - Г. обрубленный = III(Тер): (Субкавк*.); Pb(НК); [Sp.]
1223. *V. balansae* Boiss. – Г. Балансы = III(Тер): (Кавк.); Pb(НК); [Pl.]
1224. *V. ciliatula* Lipsky - Г. реснитчатый = III(СКТ): (Кавк.); S(T); [Sp.]
1225. *V. rannonica* Crantz - Г. венгерский = III(СКТ): (Зап.др.средиз.); Pa,Rb(T); [Sp.] <Pmel;Pp>
1226. *V. hybrida* L. - Г. гибридный = III(Ч): (Субсредиз*.); Ra,Rb(T); [Rs.]
1227. *V. grandiflora* Scop. - Г. крупноцветковый = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Субсредиз*.); Pa(T); [Sp.] <Pmel>
1228. *V. sativa* L. - Г. посевной = Все районы: (Европ.); Ra,Rb(T); [Sp.] <Pmel;Pp>
1229. *V. angustifolia* Reichard - Г. узколистный = II(Кизл); III(ТС,Тер): (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.] <Pmel;Pp>
1230. *V. peregrina* L. - Г. иноземный = IV(БН): (Общедр.средиз.); Ra,Rb(T); [Rs.] <Pp>
1231. *V. cassubica* L. - Г. кашубский = III(Ч): (Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]
1232. *V. caucasica* Evktim – Г. кавказский = III(Тер): (Эукавк.); Pb,РсDo(НК); [Pl.]
1233. *V. larissae* Prima – Г. Ларисы = III(Тер): (Эукавк.); Рс,Do(НК); [Sp.]
1234. *V. alpestris* Stev. – Г. предальпийский = III(Тер): (Субкавк*.); Pb,Рс,Do(НК); [Pl.]
1235. *V. cracca* L. - Г. мышинный = I(М); III(ТС); IV(БН): (Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pm;Pmel;Pp>
1236. *V. grossheimii* Evktim – Г. Гроссгейма = III(Тер): (Кавк.); Pb,Рс(НК); [Pl.]

1237. *V. tenuifolia* Roth (*V. variabilis* Freyn et Sint.) - Г. тонколиственный = Все районы: (Палеаркт.); Pa(НК); [R.] <Pmel;Pp>
1238. *V. biennis* L. (*V. picta* Fisch.et C.A.Mey.) - Г. разукрашенный = II(КН): (Понт.-Южносиб.); Aa(НК); [R.]
1239. ★ *V. hololasia* Woronow – Г. плотноволоосистый = IV(БН): (Субтуран*.); Pa(НК); [R.]
1240. *V. cinerea* Bieb. - Г. пепельный = I(М); II(КН); III(ТС); IV(БН): (Туранск.); Ra,Rb(T); [R.]
1241. *V. varia* Host (*V. dasycarpa* Ten.) - Г. шерстистоплодный = Все районы: (Евро-Кавк.); Pa,Ra(T); [Pl.]
1242. *V. villosa* Roth - Г. мохнатый = I(М); II(ВП); IV(БН): (Палеаркт.); Da,Ra(T); [R.] <Pp>
1243. *V. hirsuta*(L.)S.F.Gray - Г. волосистый = III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); Pa,Ra(T); [Sp.]
1244. *V. tetrasperma*(L.)Schreb. - Г. четырёхсеменной = III(СКТ): (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Sp.]
1245. *Lathyrus arphaca* L. - Чина безлисточковая = I(М); II(ВП); III(СКТ): (Общедр.средиз.); Pa(T); [Sp.] <Pmel;Pp>
1246. *L. nissolia* L. - Ч. Ниссоля = III(СКТ); IV(БН): (Субсредиз*.); Pa(T); [Sp.]
1247. *L. hirsutus* L. - Ч. шершавая = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); Pa,Rb(T); [Sp.] <Pmel;Pp>
1248. *L. tuberosus* L. - Ч. клубненосная = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); Ra,Rb(НК:lh); [Pl.] <Pmel;Pp>
1249. *L. sylvestris* L. - Ч. лесная = III(СКТ); IV(БН): (Европ.); S(НК:lh); [Sp.] <Pm;Pmel;Pp>
1250. *L. miniatus* Bieb.ex Stev. - Ч. киноваревая = I(М); III(СКТ,Тер); IV(БН): (Кавк.); S(НК:lh); [Sp.] <Pmel;Pp>
1251. *L. sphaericus* Retz - Ч. шаровидная = IV(БН): (Общедр.средиз.); Pa,Ra(T); [R.] <Pmel;Pp>
1252. *L. pratensis* L. - Ч. луговая = Все районы: (Палеаркт.); Pa(НК:lh); [Pl.] <Pm;Pmel;Pp>
1253. *L. incurvus*(Roth)Roth - Ч. согнутая = Все районы: (Субтуран*.); Aa(НК); [Sp.] <Pmel;Pp>
1254. *Orobis cyaneus* Stev. – Сочевичник синий = III(Тер): (Субкавк*.); Pb,Pc(НК); [Pl.]
1255. *Pisum elatius* Bieb. - Горох высокий = III(Ч): (Зап.др.средиз.); S(T); [R.]
1256. ★ *Vavilovia formosa*(Stev.)Fed. – Вавиловия красивая = III(ВС): (Эукавк.); Pc,Do(НК); [Sp.] <EsubE>
- Сем. 81. GERANIACEAE Juss. - ГЕРАНИЕВЫЕ
1257. *Geranium tuberosum* L. - Герань клубневая = I(М); III(ТС): (Субсредиз*.); ST(НК); [Sp.]
1258. *G. linearilobum* DC. - Г. линейнолопастная = IV(БН): (Понтич.); ST(НК); [R.]
1259. *G. sanguineum* L. - Г. кроваво-красная = I(М); III(СКТ,Тер); IV(БН): (Евро-Кавк.); Pa(НК); [Pl.] <Pm>

1260. *G. ibericum* Cav. – Г. грузинская = III(BC): (Субкавказ*.); Pb, Pс(НК); [R.]
1261. *G. platypetalum* Fisch. et C.A. Mey. – Г. плосколепестная = III(BC): (Кавк.); Pb(НК); [Sp.]
1262. *G. gymnocaulon* DC. – Г. голостебельная = III(BC): (Кавк.); Pс(НК); [Pl.]
1263. *G. sylvaticum* L. - Г. лесная = III(СКТ, Тер) IV(БН): (Евро-Сиб.); S(НК); [Pl.]
1264. *G. palustre* L. - Г. болотная = II(Кизл); III(ЧО, Тер): (Европ.); Aa(НК); [Sp.]
1265. *G. collinum* Steph. - Г. холмовая = III(ТС, Тер); IV(БН): (Субтуран*.); Pa(НК); [Sp.]
1266. *G. kemulariae* Charadze – Г. Кумулярии = III(BC): (Эукавказ.); Pb(НК); [Sp.] <EsubE>
1267. *G. ruprechtii*(Woronow)Grossh. – Г. Рупрехта = III(Тер): (Кавк.); Pa, Pb(НК); [Pl.]
1268. *G. depilatum*(Somm. et Levier)Grossh. - Г. безволосая = III(СКТ, Тер); IV(БН): (Субкавказ*.); Pa, Rb(НК); [Sp.]
1269. *G. sibiricum* L. - Г. сибирская = III(СКТ, Тер); IV(БН): (Панбор.); Pa(НК); [Sp.]
1270. *G. rotundifolium* L. - Г. круглолистная = IV(БН): (Палеаркт.); Pa, Rb(T); [R.]
1271. *G. pusillum* L. - Г. маленькая = Все районы: (Евро-Кавк.); Pa, Rb(T); [Pl.]
1272. *G. columbinum* L. - Г. голубиная = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Европ.); Pa, Rb(T); [Pl.]
1273. *G. dissectum* L. - Г. рассечённая = III(Тер); IV(БН): (Субсредиз*.); Pa, Rb(НК); [R.]
1274. *G. divaricatum* Ehrh. - Г. раскидистая = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Общедр.средиз.); S, Rb(T); [Pl.]
1275. *G. robertianum* L. - Г. Роберта = III(СКТ, Тер); IV(БН): (Палеаркт.); S(T); [Pl.] <Pm>
1276. *G. lucidum* L. - Г. блестящая = III(ЧО): (Субсредиз*.); S, Aa(T); [Sp.]
1277. *Erodium malacoides*(L.)L'Her. - Журавельник мальвовидный = II(ВП): (Средиземн.); Db(T); [Sp.]
1278. *E. hoefftianum* C.A. Mey. - Ж. Гёффта = II(ВП): (Субтуран*.); Db(T); [Sp.]
1279. *E. ciconium*(L.)L'Her. - Ж. аистовый = I(М); II(ВП); IV(БН): (Субсредиз*.); ST, Rb(T); [Sp.]
1280. *E. fumarioides* Stev. – Ж. дымянковидный = III(Ч): (Эукавказ.); ST(НК); [Sp.]
1281. *E. cicutarium*(L.)L'Her. - Ж. цикутовый = Все районы: (Палеаркт.); Db(T); [Sp.] <Pm; Pp>
- Сем. 82. OXALIDACEAE R.Br. - КИСЛИЧНЫЕ
1282. *Oxalis acetosella* L. – Кислица обыкновенная = III(Тер): (Голаркт.); S(НК); [Pl.]
1283. *Xanthoxalis corniculata*(L.)Small (*Oxalis corniculata* L.) - Ксантоксалис рожковый = III(ЧО - Терек): (Общедр.средиз.); Rb(T); [R.]

Сем. 83. LINACEAE S.F.Gray - ЛЬНОВЫЕ

1284. *Linum catharticum* L. - Лён слабительный = III(СКТ, Тер): (Европ.); S, Pa(T); [Sp.]
1285. *L. austriacum* L. - Л. австрийский = Все районы: (Зап.др.средиз.); ST(НК); [Pl.]
1286. *L. squamulosum* Rudolphi – Л. чешуйчатый = II(Кизл): (Кр.-Новоросс.); ST(НК); [R.]
1287. *L. hypericifolium* Salisb. - Л. зверобоелистный = III(Тер): (Субкавказ*.); Pb(НК); [Sp.] <Po>
1288. *L. tenuifolium* L. - Л. тонколиственный = III(Тер): (Обшедр.средиз.); ST, Da(НК); [Sp.]
1289. *L. nervosum* Waldst.et Kit. - Л. жилковатый = Все районы: (Понт.-Южносиб.); Pa(НК); [Pl.]
1290. *L. corymbulosum* Reichenb. (*L. liburnicum* Scop.) - Л. либурнийский = III(ТС); IV(БН): (Средиземн.); Pa(T); [R.]
1291. *L. nodiflorum* L. (*L. luteolum* Bieb.) - Л. желтоватый = IV(БН): (Субкавказ*.); ST(T); [Sp.]
1292. *L. alexeenkoanum* E.Wulf (*L. orientale* auct.) - Л. Алексеенко = III(ВС): (Субкавказ*.); Da(НК); [Sp.] <Po>

Сем. 84. PEGANACEAE (Engl.) Tiegh. - ГАРМАЛОВЫЕ

1293. *Peganum harmala* L. - Гармала обыкновенная = I(M); II(ВП); IV(БН): (Обшедр.средиз.); ST(НК); [R.] <Pt; Pm>

Сем. 85. ZYGOPHYLLACEAE R.Br. - ПАРНОЛИСТНИКОВЫЕ

1294. *Zygophyllum fabago* L. - Парнолистник обыкновенный = II(Кизл): (Обшедр.средиз.); ST(НК); [Sp.] <Pt; Pm>
1295. *Tribulus terrestris* L. - Якорцы стелющиеся = I(M); II(ВП); III(ТС); IV(БН): (Обшедр.средиз.); Da, Rb(T); [Pl.] <Pm>

Сем. 86. NITRARIACEAE Bercht.et J.Presl - СЕЛИТРЯНКОВЫЕ

1296. *Nitraria schoberi* L. (*N. caspia* Willd.) - Селитрянка Шобера = II(Кизл): (Ирано-Туран.); Dc(Ch); [R.] <Rx>

Сем. 87. RUTACEAE Juss. - РУТОВЫЕ

1297. *Narphoerythron villosum* (Bieb.) G.Don fil. - Цельнолистник мягковолосистый = IV(БН): (Армено-Иран.); ST(НК); [R.] <Rx>
1298. *Dictamnus caucasicus* (Fisch.et C.A.Mey.) Grossh. - Ясенец кавказский = III(СКТ, Тер); IV(БН): (Субкавказ*.); Pa(НК); [Pl.] <Pt; Pm; Pmel>

Сем. 88. POLYGALACEAE R.Br. - ИСТОДОВЫЕ

1299. *Polygala sosnowskyi* Kem.-Nath. (*P. sibirica* auct. non L.) – Истод Сосновского = III(Тер): (Эукавказ.); Da(НК); [Sp.]
1300. *P. amoenissima* Tamamsch. - И. прелестнейший = III(СКТ, Тер): (Средиземн.); Pa(НК); [Sp.] <Pmel>
1301. *P. comosa* Schkuhr - И. хохлатый = III(СКТ, Тер): (Европ.); Pa(НК); [Sp.] <Pmel>
1302. *P. alpicola* Rupr. – И. альпийский = III(Тер): (Кавк.); Pb, Pc(НК); [Pl.]
1303. *P. anatolica* Boiss.et Heldr. - И. анатолийский = III(Тер): (Субкавказ*.); Pa(НК); [Pl.] <Pm; Pmel>

1304. *P. alata*(Tamamsch.)Galushko – И. крылатый = III(BC): (Эукавк.); Pb(НК); [Sp.]
1305. *P. caucasica* Rupr. - И. кавказский = II(Кизл); III(СКТ,Тер); IV(БН): (Кавк.); Pa(НК); [Pl.] <Pmel>
Сем. 89. EUPHORBACEAE Juss. - МОЛОЧАЙНЫЕ
1306. *Mercurialis ovata* Sternb. et Норре – Пролесник яйцевидный = III(Ч): (Субсредиз*.); S(НК); [Sp.]
1307. *Acalypha australis* L. - Акалифа южная = III(ЧО - Грозный): (Адвент.[Юго-Вост.Азия]); Rb(Т); [R.]
1308. *Tithymalus dentatus*(Michx.)Gaertn. (*E. dentata* Michx.) – Молочай зубчатый = I(М); III(ЧО): (Адвент.[Ср.Азия]); Rb(Т); [Sp.]
1309. *T. helioscopius*(L.)Scor. (*E. helioscopia* L.) - М. солнечный = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); Rb(Т); [Pl.] <Pt>
1310. *T. rhabdospermus*(A.Radcliffe-Smith)Klotzsch et Garcke (*E. rhabdotosperma* A.Radcliffe-Smith) - М. рабдотоспермум = [I(М – Терек); II(Кизл - Терек,Сулак): Гельтман, 1991]); III(СКТ): (Кавк.); Da,Rb(Т); [R.]
1311. *T. glareosus*(Pall.ex Bieb.)Prokh. (*E. glaeosa* Pall. ex Bieb., *E. maleevii* Tamamsch.) - М. хрящеватый = IV(БН): (Кавк.); Da,Dd(НК); [Sp.] <Rx;Pt>
1312. *T. procerus*(Bieb.)Galushko (*E. procera* Bieb., *E. villosa* Waldst. et Kit.) - М. мохнатый = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Понтич.); Aa(НК); [Sp.] <Pt>
1313. *T. seguierianus*(Neck.)Prokh. (*E. seguieriana* Neck.) - М. Сегиеров = I(М); II(ВП); IV(БН): (Субтуран*.); ST(НК); [pl.] <Pt>
1314. *T. stepposus*(Zoz)Prokh. (*E. stepposa* Zoz) - М. степной = III(BC): (Понт.- Южносиб.); ST, Da(НК); [Sp.] <Pt>
1315. *T. micranthus*(Steph.)Sojak (*E. micrantha* Steph., *E. stricta* L.) - М. мелкоцветковый = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Евро-Кавк.); S(Т); [Sp.]
1316. *T. condylocarpus*(Bieb.)Klotzsch et Garcke ex Klotzsch (*E. condylocarpa* Bieb.) - М. членистоплодный = III(ТС); IV(БН): (Субкавк*.); ST(НК); [Sp.] <Pt>
1317. *T. squamosus*(Willd.)Klotzsch et Garcke ex Klotzsch (*E. squamosa* Willd.) - М. чешуйчатый = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Кавк.); S(НК); [Pl.] <Pt>
1318. *T. falcatus*(L.)Klotzsch et Garcke (*E. falcata* L., *E. acuminata* Lam.) - М. серповидный = I(М); II(ВП); IV(БН): (Общедр.средиз.); Dd,Ra,Rb(Т); [Sp.] <Pt>
1319. *T. szovitsii* (Fisch.et C.A.Mey.) Klotzsch et Garcke ex Klotzsch (*E. szovitsii* Fisch.et C.A.Mey.) - М. Шовица = III(BC): (Субкавк*.); Da,Db(Т); [Rs.] <Rx>
1320. *T. macroceras*(Fisch. et C.A.Mey.)Klotzsch et Garcke (*E. macroceras* Fisch. et C.A.Mey.) – М. длиннорогий = III(Ч): (Кавк.); S(НК); [Sp.]
1321. *T. astrachanicus* (C.A.Mey.)Prokh. (*E. astrachanica* C.A.Mey. ex Prokh., *E. praecox*(Fisch. ex Boiss.)B.Fedtsch. et Fler.) - М. астраханский = II(КН): (Туранск.); ST(НК); [R.] <Rx> <Pt>
1322. *T. boissierianus* (Woronow)Prokh. (*E. boissieriana* Woronow, *E. virgata* Waldst.et Kit.) - М. Буасье = I(М); II(ВП); III(ТС): (Армено-Иран.); ST(НК); [Sp.] <Pt>

1323. *T. ibericus*(Boiss.)Prokh. (*E. iberica Boiss.*) - М. грузинский = Все районы: (Субкавказ*.); ST,Rb(НК); [Pl.] <Pt>
1324. *T. leptocaulis*(Boiss.)Prokh. (*E. leptocaula Boiss.*) - М. тонкостебельный = II(КН): (Понтич.); ST(НК); [R.] <Pt>
1325. *T. esulus*(L.)Gaertn. (*E. esula L.*) - М. острый = II(Кизл); III(Тер); IV(БН): (Палеаркт.); Pa(НК); [R.] <Pt>
1326. *Chamaesice humifusa*(Schlecht.)Prokh. (*E. humifusa Schlecht.*) - Хамезице приземистый = II(ВП); III(СКТ): (Адвент.[Китай]); Rb(Т); [Sp.] <Pt>
1327. *Ch. vulgaris* Prokh. (*E. chamaesyce L.*) - М. обыкновенный = II(КН); IV(БН): (Субсредиз*.); Ra,Rb(Т); [R.] <Pt>
- Сем. 90. CALLITRICHACEAE Link - БОЛОТНИКОВЫЕ
1328. *Callitriche palustris* L. (*C. verna L.*) - Водяная звёздочка весенняя = III(Тер): (Плюрирег.); Ac(К); [Sp.]
- Сем. 91. EMPETRACEAE S.F.Gray – ВОДЯНИКОВЫЕ
1329. *Empetrum caucasicum* Juz. – Водяника кавказская = III(Тер): (Субкавказ*.); Pb,Pc(Phn); [Pl.]
- Сем. 92. ANACARDIACEAE Lindl. - СУМАХОВЫЕ
1330. *Cotinus coggygria* Scop. - Скумпия кожевенная = III(BC): (Общедр.средиз.); Da(Phn); [Sp.] <Rt;Pm>
- Сем. 93. CELASTRACEAE R.Br. - БЕРЕСКЛЕТОВЫЕ
1331. *Euonymus europaea* L. - Бересклет европейский = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Европ.); S(Phn); [Pl.] <Pm>
1332. *E. verrucosa* Scop. - Б. бородавчатый = III(Тер): (Европ.); S(Phn); [Sp.]
1333. *E. latifolia*(L.)Mill. - Б. широколистный = III(Ч): (Субсредиз*.); S(Phn); [R.]
- Сем. 94. ACERACEAE Juss. - КЛЁНОВЫЕ
1334. *Acer laetum* С.А.Мей. - Клён светлый = III(Ч): (Эвксин.); S(Phms); [Sp.] <Rt;Pmel>
1335. *A. platanoides* L. - К. остролистный = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Европ.); S(Phmg); [Pl.] <Pmel>
1336. *A. campestre* L. - К. полевой = Все районы: (Евро-Кавк.); S(Phms); [Pl.] <Pmel>
1337. *A. trautvetteri* Medw. – К. Траутфеттера = III(Тер): (Кавк.); S(Phms); [Pl.]
1338. **Negundo aceroides* Moench (*Acer negundo L.*) - Негундо клёновидный = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Адвент.[Сев.Америка]; Rb(Phms); <Po>
- Сем. 95. BALSAMINACEAE A.Rich. - БАЛЬЗАМИНОВЫЕ
1339. *Impatiens noli-tangere* L. - Недотрога обыкновенная = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Евро-Сиб.); S(Т); [Pl.]
- Сем. 96. RHAMNACEAE Juss. - КРУШИНОВЫЕ
1340. *Paliurus spina-christi* Mill. - Держи-дерево христово колючка = II(Кизл); III(ЧО); IV(БН): (Общедр.средиз.); ST(Phn); [Rs.] <Pmel;Pm>
1341. *Frangula alnus* Mill. - Крушина ломкая = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Палеаркт.); S(Phn); [Sp.] <Pm>
1342. *Rhamnus cathartica* L. - Жостер слабительный = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Палеаркт.); S(Phm); [Pl.] <Pm>

1343. *Rh. pallasii* Fisch. et C. A. Mey. - Ж. Палласа = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Ирано-Туран.); Da(Phn); [Pl.]
1344. *Rh. tortuosa* Somm. et Levier (*Rh. awarica Sachok.*) – Ж. извилистый = III(BC): (Эукавк.); Do(Phn); [Sp.]
Сем. 97. VITACEAE Juss. - ВИНОГРАДОВЫЕ
1345. *Vitis sylvestris* C. C. Gmel. - Виноград лесной = I(М); II(КН): (Субсредиз*.); S(Phn:ll); [Sp.] <Pa>
Сем. 98. TILIACEAE Juss. - ЛИПОВЫЕ
1346. *Tilia cordata* Mill. – Липа сердцевидная = III(Тер): (Палеаркт.); S(Phms); [Sp.]
1347. *T. platyphyllos* Scop. - Липа широколистная = III(Ч): (Европ.); S(Phmg); [R.] <Pm;Pmel>
1348. *T. caucasica* Rupr. - Л. кавказская = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Кавк.); S(Phmg); [Pl.] <Pm;Pmel>
Сем. 99. MALVACEAE Juss. - МАЛЬБОВЫЕ
1349. *Abutilon theophrasti* Medik. - Канатник Теофраста = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Плюрирег.); Rb(T); [Sp.]
1350. *Lavatera thuringiaca* L. - Хатьма тюрингенская = Все районы: (Палеаркт.); Pa,ST(НК); [Pl.] <Pm;Po>
1351. *Althaea hirsuta* L. - Алтей жёстковолосистый = Все районы: (Субсредиз*.); ST,Rb(T); [Sp.]
1352. *A. officinalis* L. - А. лекарственный = II(ВП): (Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.] <Pm>
1353. *A. armeniaca* Ten. - А. армянский = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Субтуран*.); Pa,Aa(НК); [Sp.] <Pm>
1354. *A. cannabina* L. - А. коноплевый = I(М); III(СКТ): (Общедр.средиз.); Pa,ST(НК); [Sp.]
1355. *Alcea rugosa* Alef. - Шток-роза морщинистая = Все районы: (Понтич.); ST,Pa(НК); [Pl.] <Po>
1356. *Malva sylvestris* L. - Просвирник лесной = I(М); II(ВП); III(Ч): (Палеаркт.); Pa,ST,Rb(T); [Sp.] <Pm;Pmel>
1357. *M. nicaeensis* All. - П. ницкий = I(М); II(ВП): (Общедр.средиз.); Rb(T); [R.] <Pmel>
1358. *M. neglecta* Wallr. - П. пренебрежённый = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); Rb(T); [Pl.] <Pa;Pmel>
1359. *M. pusilla* Smith - П. низкий = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); Rb(T); [Pl.] <Pa;Pmel>
1360. *Hibiscus trionum* L. - Гибискус тройчатый = IV(БН): (Плюрирег.); Ra,Rb(T); [Sp.]
Сем. 100. HYPERICACEAE Juss. - ЗВЕРОБОЙНЫЕ
1361. *Hypericum asperuloides* Czern. ex Turcz. – Зверобой ясменниковый = III(Ч): (Эукавк.); Pb,Pc,Do(НК); [R.] <EsubE>
1362. *H. hirsutum* L. – З. жёстковолосистый = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Палеаркт.); Pa,ST(НК); [Pl.]

1363. *H. polygonifolium* Rupr. – З. гречишколистный = III(Тер): (Субкавказ*.); Pb, Pc, Do(НК); [Pl.]
1364. *H. quadrangulum* L. (*H. tetrapterum* Fries; *H. acutum* Moench, nom. illegit.) - З. четырехкрылый = III(Ч): (Европ.); Aa(НК); [Sp.]
1365. *H. elegans* Steph. - З. изящный = II(Кизл); III(ТС); IV(БН): (Евро-Сиб.); ST(НК); [Sp.]
1366. *H. perforatum* L. - З. продырявленный = Все районы: (Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pm>
Сем. 101. FRANKENIACEAE S.F.Gray - ФРАНКЕНИЕВЫЕ
1367. *Frankenia hirsuta* L. - Франкения жестковолосистая = I(М); II(ВП): (Зап.др.средиз.); Dc(Ch:sf); [R.]
Сем. 102. TAMARICACEAE Link - ГРЕБЕНЩИКОВЫЕ
1368. *Tamarix meyeri* Boiss. - Гребенщик Мейера = II(Кизл): (Ирано-Туран.); Db, Aa(Phn); [R.]
1369. *T. laxa* Willd. - Г. рыхлый = II(Кизл): (Ирано-Туран.); Aa(Phn); [Rs.]
1370. *T. hohenackeri* Bunge - Г. Гогенакера = II(Кизл): (Ирано-Туран.); Db(Phn); [Sp.]
1371. *T. ramosissima* Ledeb. - Г. многоветвистый = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Вост.др.средиз.); Aa, Db(Phn); [Sp.] <Pm>
1372. *Myricaria bracteata* Royle (*M. alopecuroides* Schrenk) - Мирикария прицветниковая = III(СКТ, Тер); IV(БН): (Общедр.средиз.); Aa(Phn); [Sp.]
Сем. 103. CISTACEAE Juss. - ЛАДАННИКОВЫЕ
1373. *Helianthemum lasiocarpum* Jacques et Herincq - Солнцецвет опушенноплодный = III(ЧО); IV(БН): (Субкавказ*.); ST(Т); [Sp.] <Pmel>
1374. *H. salicifolium*(L.)Mill. – С. иволистный = IV(БН): (Средиземн.); ST(Т); [Sp.]
1375. *H. nummularium*(L.)Mill. – С. монетолистный = III(ВС): (Средиземн.); Pb(Ch:sf); [Pl.]
1376. *H. ovatum*(Viv.)Dun. - С. яйцевидный = III(СКТ, Тер); IV(БН): (Евро-Кавк.); Pb(Ch:sf); [Sp.] <Pmel>
1377. *H. nitidum* Clementi – С. блестящий = III(Тер): (Европ.); Pb(Ch:sf); [Sp.]
1378. *Fumana procumbens*(Dun.)Gren.et Godr. - Фумана лежачая = III(ВС): (Средиземн.); Da (Ch:sf); [Rs.] <Rx>
Сем. 104. VIOLACEAE Batsch - ФИАЛКОВЫЕ
1379. *Viola caucasica* Kolenati – Фиалка кавказская = III(Тер): (Кавк.); Pb, Pc, Do(НК); [Pl.]
1380. *V. alba* Bess. - Фиалка белая = III(СКТ, Тер); IV(БН): (Европ.); S(НК:eph); [Sp.]
1381. *V. odorata* L. - Ф. душистая = III(СКТ, Тер); IV(БН): (Евро-Кавк.); S(НК:eph); [Pl.] <Pm>
1382. *V. suavis* Bieb. - Ф. приятная = III(СКТ, Тер); IV(БН): (Субпонт*.); S(НК:eph); [Sp.]
1383. *V. hirta* L. - Ф. коротковолосистая = II(Кизл); III(СКТ): (Евро-Сиб.); Pa(НК:eph); [Pl.]

1384. *V. ambigua* Waldst.et Kit. - Ф. сомнительная = Все районы: (Понтич.); Pa(НК:ephd); [Pl.]
1385. *V. montana* L. (*Viola nemoralis* Kiitz) – Ф. горная = III(Тер): (Палеаркт.); S,Pb(НК); [Sp.]
1386. *V. canina* L. - Ф. собачья = Все районы: (Евро-Сиб.); S(НК:ephd); [Pl.] <Pm>
1387. *V. rupestris* F.W.Schmidt – Ф. скальная = III(Тер): (Палеаркт.); Pb(НК); [Pl.]
1388. *V. reichenbachiana* Jord.ex Boreau (*V. silvestris* Lam.) - Ф. Рейхенбаха = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Европ.); S(НК:ephd); [Sp.]
1389. *V. sieheana* W.Beck. (*V. caspica*(Rupr.)Freyn) – Ф. Зиге = III(Тер): (Субкавказ*.); S(НК); [Sp.]
1390. *V. mirabilis* L. - Ф. удивительная = III(Ч - Шами-юрт): (Палеаркт.); S(НК:ephd); [Sp.]
1391. *V. somchetica* С.Koch - Ф. сомхетская = III(Тер): (Кавк.); Pс(НК:ephd); [Pl.]
1392. *V. kitaibeliana* Schult. - Ф. Китайбелева = Все районы: (Понтич.); ST(Т); [Pl.]
1393. *V. arvensis* Murr. - Ф. полевая = Все районы: (Евро-Сиб.); Pa,Rb(Т); [Sp.] <Pm>
1394. *V. vespertina* Klok. - Ф. вечерняя = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Эукавказ.); Pa(Т); [Pl.]
1395. *V. oreades* Bieb. – Ф. высокогорная = III(Тер): (Субкавказ*.); Pс(НК); [Pl.]
1396. *V. minuta* Vieb. – Ф. мелкая = III(ВС): (Эукавказ.); Pс,Do(НК); [Sp.]
- Сем. 105. THYMELAEACEAE Juss. - ВОЛЧНИКОВЫЕ
1397. *Thymelaea passerina*(L.)Coss.et Germ. (*Lygia passerina*(L.)Fas.) - Тимелея воробьиная = I(М); II(ВП); IV(БН): (Общедр.средиз.); ST,Da(Т); [R.]
1398. *Daphne mezereum* L. - Волчник обыкновенный = III(Тер): (Европ.); S(Phn); [Sp.] <Pt;Pm>
1399. *D. glomerata* Lam. – В. сборный = III(Тер): (Субкавказ*.); Pb(Phn:sv); [Pl.] <Rt>
- Сем. 106. ELAEAGNACEAE Juss. - ЛОХОВЫЕ
1400. *Hippophaë rhamnoides* L. - Облепиха крушиновидная = Все районы: (Палеаркт.); Aa(Phn); [Pl.] <Pm;Pa;Pmel>
1401. *Elaeagnus angustifolia* L. - Лох узколистный = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Общедр.средиз.); Db(Phn); [Sp.] <Pa;Pm;Pmel>
1402. *E. caspica* Grossh. – Л. каспийский = II(Кизл); IV(БН): (Ирано-Туран.); Db(Phn); [Sp.]
- Сем. 107. LYTHRACEAE J.St.-Hil. - ДЕРБЕННИКОВЫЕ
1403. *Lythrum virgatum* L. - Дербенник лозный = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.] <Pmel>
1404. *L. salicaria* L. - Д. иволистный = Все районы: (Палеаркт.); Aa(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>
- Сем. 108. ONAGRACEAE Juss. – КИПРЕЙНЫЕ (ОСЛИННИКОВЫЕ)

1405. *Epilobium hirsutum* L. - Кипрей шерстистый = Все районы: (Палеаркт.); Аа(НК); [Pl.]
1406. *E. parviflorum* Schreb. - К. бледноцветковый = III(СКТ); IV(БН): (Общедр.средиз.); Аа(НК); [Sp.]
1407. *E. montanum* L. - К. горный = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Палеаркт.); Аа(НК); [Pl.]
1408. *E. tetragonum* L. (*E. adnatum* Griseb.) - К. четырёхугольный = III(Тер): (Палеаркт.); Аа(НК); [R.]
1409. *E. nervosum* Boiss.et Buhse - К. жилковатый = II(Кизл); III(СКТ,Тер); IV(БН): (Вост.др.средиз.); Аа(НК); [Sp.]
1410. *E. palustre* L. - К. болотный = III(Тер): (Голаркт.); Аа,Ab(НК); [Sp.]
1411. *E. alpestre*(Jacq.)Krock. - К. предальпийский = III(Тер): (Европ.); Pb,Аа(НК); [R.]
1412. *E. algidum* Vieb. - К. холодный = III(Тер): (Субкавказ*.); Аа(НК); [Pl.]
1413. *E. gemmascens* С.А.Меу. - К. почконосный = III(BC): (Армено-Иран.); Pc,Аа(НК); [R.]
1414. *E. anagallidifolium* Lam. (*E. alpinum non L.*) - К. анагилиелистный = III(Тер): (Палеаркт.); Pc,Аа(НК); [Sp.]
1415. *Chamerion angustifolium*(L.)Scop. (*Chamerion angustifolium (L.) Holub*) - Иван-чай узколистный = III(Тер): (Плюрирег.); S(НК); [Sp.] <Pa;Pm;Pmel>
1416. *Ch. dodonae*(Vill.)Kost. (*Ch. angustissimum(Web.)Grossh.*) - И.-ч. Додоны = III(Тер): (Голаркт.); Аа(НК); [Sp.]
1417. *Ch. caucasicum*(Hausskn.)Sosn. ex Grossh. (*Ch. caucasicum (Hausskn.) Galushko*) - И.-ч. кавказский = III(Тер): (Кавк.); Pb,Pc(НК); [Pl.]
1418. *Oenothera biennis* L. (*Onagra biennis(L.)Scop.*) - Ослиник двулетний = III(СКТ); IV(БН): (Адвент.[Сев.Америка]); Rb(НК:pb); [Pl.] <Po;Pm>
1419. *Circaea lutetiana* L. - Двулепестник парижский = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Евро-Сиб.); S(НК); [Sp.]
1420. *C. alpina* L.- Д. альпийский = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Голаркт.); S(НК); [Pl.]
- Сем. 109. TRAPACEAE Dumort. - ЧИЛИМОВЫЕ
1421. *Трапа хурсана* Woronow - Чилим гирканский = II(Кизл - Гудермес-Хасавьюрт): (Туранск.); Ac(T); [R.] <Rg>
- Сем. 110. HALORAGACEAE R.Br. - УРУТЕВЫЕ
1422. *Myriophyllum verticillatum* L. - Уруть мутовчатая = I(M); II(ВП): (Голаркт.); Ac(K); [Sp.]
1423. *M. spicatum* L. - У. колосовая = I(M); II(ВП); III(BC): (Голаркт.); Ac(K); [Sp.]
- Сем. 111. HIPPURIDACEAE Link - ХВОСТНИКОВЫЕ
1424. *Hippuris vulgaris* L. - Хвостник обыкновенный = II(ВП): (Голаркт.); Ac(K); [R.]
- Сем. 112. ARALIACEAE Juss. - АРАЛИЕВЫЕ
1425. ★ *Hedera pastuchovii* Woronow - Плющ Пастухова = IV(БН): (Кавк.); S(Ch:ll:sv); [R.] <Rt>

Сем. 113. APIACEAE Lindl. – СЕЛЬДЕРЕЙНЫЕ (ЗОНТИЧНЫЕ)

1426. *Sanicula europaea* L. - Подлесник европейский III(СКТ,Тер); IV(БН): (Евро-Сиб.); S(НК); [Pl.] <Pm>
1427. *Astrantia trifida* Hoffm. - Астранция трёхнадрезанная = III(BC): (Кавк.); Pb,Рс(НК); [Sp.]
1428. *A. biebersteinii* Trautv. = А. Биберштейна = III(СКТ,Тер): (Кавк.); Pb,Рс(НК); [Pl.]
1429. *A. maxima* Pall. – А. наибольшая = III(Тер): (Субкавк*.); Pb(НК); [Sp.]
1430. *Eryngium planum* L. - Синеголовник плосколистный = III(ЧО,Тер): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Sp.] <Pm;Po>
1431. *E. campestre* L. - С. полевой = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Субсредиз*.); ST,Rb(НК); [Pl.] <Pm>
1432. *E. caucasicum* Trautv. (*E. caeruleum* Bieb.; *E. biebersteinianum* Nevsky) - С. голубой = II(КН); III(СКТ); IV(БН): (Армено-Иран.); ST(НК); [Sp.]
1433. *Physocaulis nodosus*(L.)Koch (*Myrrhoides nodosa*(L.)Cannon) - Вздуплоплодник узловатый = III(Ч): (Общедр.средиз.); S,Rb(Т); [R.]
1434. *Chaerophyllum aureum* L.(*Ch. maculatum* Willd.ex DC.) - Бутень пятнистый = II([ВП: Меницкий, 1991]); III(СКТ,Тер); IV(БН): (Армено-Иран.); S(НК); [Sp.]
1435. *Ch. roseum* Bieb.(*Ch. millefolium* DC.) - Б. тысячелистный = III(Тер): (Кавк.); Pb(НК); [Pl.]
1436. *Ch. bulbosum* L. (*Ch. caucasicum*(Hoffm.)Schischk.) - Б. клубненосный = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Евро-Кавк.); S,Rb(Т); [Sp.]
1437. *Ch. humile* Stev. – Б. низкий = III(Тер): (Кавк.); Pd(К); [Pl.]
1438. *Anthriscus sylvestris* (L.)Hoffm. – Купырь лесной = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Палеаркт.); Ra,Rb(НК); [Sp.]
1439. *A. nemorosa*(Bieb.)Spreng. (*A. sylvestris auct. non L.*) – К. дубравный = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Палеаркт.); Rb(НК); [Sp.]
1440. *A. cereifolium*(L.)Hoffm. (*A. longirostris* Bertol.) - К. длинноносиковый = II(Кизл); III(СКТ,Тер); IV(БН): (Европ.); Rb(Т); [R.]
1441. *A. ruprechtii* Boiss. – К. Рупрехта = III(BC): (Кавк.); Pb,Рс,Do(НК); [Pl.]
1442. *Scandix pecten-veneris* L. - Скандикс гребенчатый = I([М: Меницкий, 1991]); II(КН: Меницкий, 1991)]; IV(БН): (Общедр.средиз.); Rb(Т); [Sp.]
1443. *S. australis* L. (*S. falcata* Londes, *S. grandiflora* auct.) - С. серповидный = IV(БН): (Кр.-Новоросс.); Rb(Т); [R.]
1444. *Torilis japonica*(Houtt.)DC. - Пупырник японский = II(Кизл); III(СКТ,Тер); IV(БН): (Палеаркт.); S(Т); [Pl.]
1445. *T. arvensis*(Huds.)Link - Т. полевой = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Общедр.средиз.); S,Rb(Т); [Pl.]
1446. *T. heterophylla* Guss. - Т. разнолистный = III(СКТ); IV(БН): (Зап.др.средиз.); S(Т); [R.]
1447. *Astrodaucus orientalis*(L.)Drude - Морковница восточная = III(Тер): (Армено-Иран.); Dd,Rb(Т); [Pl.]
1448. *Caucalis lappula*(Web.)Grande - Прицепник липучковый = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); ST,Ra,Rb(Т); [Sp.] <Pa>

1449. *Turgenia latifolia*(L.)Hoffm. - Тургенеция широколистная = II([КН: Меницкий, 1991]); IV(БН): (Общедр.средиз.); Rb(T); [R.]
1450. *Coriandrum sativum* L.- Кориандр посевной = III(ЧО): (Общедр.средиз.); Rb(T); [R.]
1451. *Smyrniun perfoliatum* L. - Смирния пронзённолистная = III(Ч): (Средиземн.); S(НК:pb); [Sp.]
1452. *Physospermum cornubiense*(L.)DC. (*Ph. danaa*(Bieb.)Schishk.; *Danaa nudicaulis*(Bieb.)Grossh.) - Вздутосемянник Дана = III(Ч): (Зап.др.средиз.); S(НК); [Sp.]
1453. *Conium maculatum* L. - Болиголов пятнистый = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pt;Pm>
1454. *Eleutherospermum cicutarium*(Bieb.)Voiss. - Свободносемянник цикутовый = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Субкавказ*.); S(НК); [Sp.]
1455. *Bilacunaria microcarpa*(Bieb.)M.Pimen. et V. Tichomirov (*Hippomarathrum microcarpum*(Bieb.)V.Petrov; *Cachrys microcarpos* Bieb.) - Конский фенхель мелкоплодный = III(СКТ,BC): (Субкавказ*.); Pa(НК); [Sp.]
1456. *Prangos odontalgica*(Pall.)Herrnst. et Heyn (*Cachris odontalgica* Pall.) - Прангос противозубной = I(M); II(КН); III(ЧО); IV(БН): (Субтуран*.); Dc(НК); [R.]
1457. *Vupleurum rotundifolium* L. - Володушка круглолистная = II(Кизл); III(СКТ,Ч); IV(БН): (Палеаркт.); Pa,Rb(T); [Sp.]
1458. *V. falcatum* L. – В. серповидная = III(BC): (Европ.); Pb(НК); [Sp.]
1459. *V. exaltatum* Bieb. - В. высокая = III(СКТ,Тер): (Вост.др.средиз.); Da(НК); [Pl.]
1460. *V. polyphyllum* Ledeb. – В. многолистная = III(Тер): (Кавк.); Pb(НК); [Sp.]
1461. *V. nordmannianum* Ledeb. – В. Нордмана = III(BC): (Субкавказ*.); Pb,Pc(НК); [Pl.]
1462. *V. gerardii* All. (*V. commutatum* Boiss. et Bal.) - В. изменчивая = I(M); II(КН): (Зап.др.средиз.); ST(T); [Sp.]
1463. *V. brachiatum* С.Коч - В. ветвистая = III(ТС): (Эвксин.); ST(T); [R.]
1464. *V. marschallianum* С.А.Мей. - В. Маршалла = I(M); II(ВП); III(ТС); IV(БН): (Субкавказ*.); Dc(T); [R.]
1465. *Trinia kitaibeli* Bieb. - Триния Китайбея = I(M); II(КН); III(ТС): (Понтич.); ST(НК:pb); [R.]
1466. *T. leiogona*(С.А.Мей.)В.Fedtsch. - Т. гладкоплодная = I(M); II(КН); III(ТС); IV(БН): (Субкавказ*.); ST(НК); [Sp.]
1467. *T. hispida* Hoffm. - Т. щетинистоволосистая = I(M); II(Кизл): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.]
1468. *Arium graveolens* L. - Сельдерей пахучий = I(M); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); Rb(НК:pb); [R.] <Pa>
1469. *Visnaga daucoides* Gaertn. (*Ammi visnaga*(L.)Lam.) - Амми зубная = II(КН): (Средиземн.); ST(НК:pb); [R.] <Pm>
1470. *Falcaria vulgaris* Bernh. (*F. sioides*(Wib.)Aschers.) - Резак обыкновенный = I(M); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); Pa,ST(НК); [Pl.] <Pm>

1471. *Carum carvi* L. - Тмин обыкновенный = III(Тер): (Палеаркт.); Pb,Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm>
1472. *C. alpinum* (Bieb.)Benth. et Hook. fil. – Т. альпийский = III(Тер): (Эукавк.); Do(НК); [Pl]
1473. *C. meifolium*(Bieb.)Voiss. – Т. рассечённолистный = III(BC): (Эукавк.); Do(НК); [Pl.]
1474. *C. caucasicum*(Bieb.)Voiss. – Т. кавказский = III(BC): (Субкавк*.); Pb,Pc,Do(НК); [Pl.]
1475. *Chamaesciadium acaule*(Bieb.)Voiss. - Низкозонтичник бесстебельный = III(Тер): (Субкавк*.); Pb(НК); [Sp.]
1476. *Pimpinella affinis* Ledeb. - Бедренец близкий = III(Ч); IV(БН): (Средиземн.); ST(Т:pb); [R.]
1477. *P. saxifraga* L. – Б. камнеломка = III(Тер): (Евро-Сиб.); Pb(НК); [Pl.] <Pm>
1478. *Albovia tripartita*(Kalen.)Schischk. (*Pimpinella tripartita* Kalen) - Б. трёхраздельный = III(СКТ,Тер): (Субкавк*.); S(НК); [Sp.]
1479. *Aegorodium podagraria* L. - Сныть обыкновенная = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Палеаркт.); S,Rb(НК); [Pl.] <Pm>
1480. *Sium latifolium* L. - Поручейник широколистный = II([ВП: Меницкий, 1991]): (Палеаркт.); Da(НК); [Sp.] <Pt>
1481. *S. sisaroides* DC. - П. сизаровидный = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Субтуран*.); Aa(НК); [Pl.]
1482. *Verula erecta*(Huds.)Cov. (*Sium erectum* Huds.) - Берула прямая = I(М); II(КН); III(ЧО): (Евро-Кавк.); Ab(К); [Sp.]
1483. *Seseli petraeum* Bieb. (*S. floribundum* Somm. et Levier) - Жабрица каменная = III(СКТ,Тер): (Кавк.); Db(НК); [Sp.]
1484. *S. peucedanoides*(Bieb.)K.-Pol. - Ж. горичниковидная = III(ЧО); IV(БН): (Субкавк*.); Pa(НК); [Sp.]
1485. *S. varium* Trev. - Ж. варьирующая = III(СКТ,Тер): (Эукавк.); ST(НК); [Sp.]
1486. *S. tortuosum* L - Ж. извилистая = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Средиземн.); Pa,ST(НК); [Sp.]
1487. *Libanotis transcaucasica* Schischk. (*Seseli libanotis*(L.)Koch) - Порезник кавказский = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Субкавк*.); Pa,Pb(НК:pb); [Sp.] <Pm>
1488. *Oenanthe aquatica*(L.)Poir. - Омежник водяной = I(М); II(Кизл): (Палеаркт.); Ab(К); [Sp.]
1489. *Macrosiadium alatum*(Bieb.)V.Tichomirov et Lavrova (*Ligusticum alatum*(Bieb.)Spreng.) - Макросциadium крылатый = III(Тер): (Субкавк*.); Pb(НК); [Sp.]
1490. *Agasyllis latifolia*(Bieb.)Voiss. - Агазилис широколистный = III(ЧО,Тер): (Кавк.); Pb(НК); [Sp.]
1491. *Levisticum officinale* Koch – Любистик лекарственный = III(СКТ): (Европ.); Rb(НК); [R.]
1492. *Ferula tatarica* Fisch.ex Spreng. - Ферула татарская = I(М); II(Кизл); III(ТС); IV(БН): (Субтуран*.); Dc(НК); [Sp.]

1493. *F. caspica* Vieb. - Ф. каспийская = I(М); II(ВП); IV(БН): (Субтуран*.); Dc(НК); [Sp.]
1494. *Ferulago campestris*(Bess.)Grec. - Ферульник полевой = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Субпонт*.); Pa(НК); [R.]
1495. *Laser trilobum*(L.)Borkh. - Лазурник трёхлопастный = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Евро-Кавк.); Pa,S(НК); [Sp.]
1496. *Peucedanum ruthenicum* Vieb. - Горичник русский = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Понт.-Южносиб.); Pa(НК); [Pl.]
1497. *P. pshawicum* Boiss. - Г. пшавский = III(BC): (Эукавк.); Pb(НК); [Sp.]
1498. *Pastinaca sylvestris* Mill. - Пастернак лесной = III(СКТ,Тер): (Палеаркт.); Pa(НК:pb); [Sp.]
1499. *P. umbrosa* Stev. ex DC. - П. теневой = III(Ч): (Субкавк*.); S,Rb(НК); [Sp.]
1500. *P. pimpinellifolia* Vieb. - П. бедреницелистный = II(ВП); III(СКТ,Тер); IV(БН): (Кавк.); Pa(НК); [Pl.]
1501. *P. armena* Fisch. et C.A.Meу. – П. армянский = III(Тер): (Субкавк*.); Pb(T); [Sp.]
1502. *P. clausii*(Ledeb.)M.Pimen. (*P. biebersteinii Galushko*) - Биберштейна = I(М); II(КН); III(СКТ): (Понтич.); Pa(НК); [Sp.]
1503. *Symphyloma graveolens* C.A.Meу. – Сростноплодник пахучий = III(BC): (Эукавк.); Do(НК); [Sp.] <Esub>
1504. *Heracleum sibiricum* L. - Борщевик сибирский = III(СКТ): (Палеаркт.); Pa(НК); [Sp.] <Pt;Pm>
1505. *H. asperum*(Hoffm.)Vieb. - Б. жёсткий = III(Тер): (Кавк.); Pa(НК); [Pl.] <Pt>
1506. *H. mantegazzianum* Somm.et Levier - Б. Мантегацци = III(СКТ,Тер): (Эвксин.); S,Pb(НК:pb); [Pl.] <Pt>
1507. *H. chorodanum*(Hoffm.)DC. - Б. айрный = III(Тер): (Кавк.); Pb(НК); [Sp.]
1508. *H. roseum* Stev. – Б. розовый = III(BC): (Кавк.); Pc(НК); [R.]
1509. *H. sommieri* Manden. – Б. Соммье = III(BC): (Кавк.); Pb,Do(НК); [Sp.]
1510. *H. grandiflorum* Stev. – Б. крупноцветковый = III(BC): (Эукавк.); Do(НК); [Sp.]
1511. *Zosima orientalis* Hoffm. (*Z. absinthifolia*(Vent.)Link) – Зосима восточная (полыннолистная) = III(СКТ); IV(БН): (Общедр.средиз.); Da(НК); [Sp.]
1512. *Tordylium maximum* L. - Тордилиум крупный = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Общедр.средиз.); Pa,Rb(T); [Sp.]
1513. ★*Mandenovia komarovii*(Manden.)Alava – Манденовия Комарова = III(BC - Аргун): (Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Esub>
1514. *Daucus carota* L. - Морковь дикая = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); Pa,Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm>
- Сем. 114. CORNACEAE Dumort. - КИЗИЛОВЫЕ
1515. *Cornus mas* L. - Кизил обыкновенный = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Общедр.средиз.); S(Phm); [Pl.] <Pa;Pm>

1516. *Swida australis*(C.A.Mey.)Pojark.ex Grossh. (*Thelycrania australis auct.*) - Свидина южная = I(М); III(СКТ,Тер); IV(БН): (Общедр.средиз.); S(Phm); [Pl.]

Сем. 115. PYROLACEAE Dumort. - ГРУШАНКОВЫЕ

1517. *Moneses uniflora*(L.)A.Gray – Одноцветка крупноцветковая = III(BC): (Голаркт.); S(НК); [Sp.]

1518. *Orthilia secunda*(L.)House - Ортилия маленькая = III(Тер): (Панбор.); S(НК:hv); [Rs.]

1519. *Pyrola minor* L. – Грушанка малая = III(Тер): (Голаркт.); S,Pb,Pc(НК); [Sp.]

1520. *P. media* Sw. – Г. средняя = III(BC): (Европ.); S,Pb,Pc(НК); [Sp.]

1521. *P. rotundifolia* L. – Г. круглолистная = III(BC): (Голаркт.); S(НК:hv); [Rs.] <Rt;Pm>

1522. *P. chlorantha* Sw. – Г. зеленоцветковая = III(BC): (Европ.); S,Pb,Pc(НК); [Sp.]

Сем. 116. MONOTROPACEAE Nutt. - ПОДЪЕЛЬНИКОВЫЕ

1523. *Hyropitis monotropa* Crantz - Подъельник обыкновенный = III(BC): (Голаркт.); S(НК:sap); [Rs.]

Сем. 117. ERICACEAE Juss. - ВЕРЕСКОВЫЕ

1524. *Rhododendron caucasicum* Pall. – Рододендрон кавказский = III(BC): (Кавк.); Pb,Pc(Phn:sv); [Pl.] <Rt;Pm;Po>

1525. *Azalea pontica* L. (*Rhododendron luteum Sweet*) – Азалия жёлтая = III(ЧО,Тер): (Евро-Кавк.); S,Pb(Phn); [Sp.] <Po;Pt>

1526. *Arctostaphylos caucasica* Lipsch. (*A. uva-ursi (L.) Spreng.*) – Толокнянка кавказская = III(Ч): (Субкавк*.); Da(Ch:sv); [R.] <Rt;Pm>

Сем. 118. VACCINIACEAE S.F.Gray – БРУСНИЧНЫЕ

1527. *Rhodococcum vitis-idaea*(L.)Avror. (*Vaccinium vitis-idaea L.*) – Брусника обыкновенная = III(Тер): (Голаркт.); S,Pb,Pc(Ch:fl:sv); [Pl.] <Rt;Pa>

1528. *Vaccinium myrtillus* L. – Черника обыкновенная = III(Тер): (Голаркт.); S,Pb,Pc(Ch:fl); [Pl.] <Pa>

1529. *V. arctostaphylos* L. – Ч. кавказская = III(Ч): (Кавк.); S(Phn); [R.] <Pa>

Сем. 119. PRIMULACEAE Vent. - ПЕРВОЦВЕТНЫЕ

1530. *Primula sibthorpii* Hoffm. – Первоцвет Сибторпа = IV(БН): (Вост.др.средиз.); Pa,S(НК); [Sp.] <Po>

1531. *P. woronowii* Losinsk. - Первоцвет Воронова = III(Ч): (Кавк.); S(НК); [Sp.] <Po>

1532. *P. amoena* Bieb. - П. приятный = III(BC): (Кавк.); Pa,Pb(НК); [Rs.] <Po>

1533. *P. kuznetzovii* Fed. – П. Кузнецова = III(BC): (Кавк.); Pb,Pc,Do(НК); [Sp.] <Po>

1534. *P. macrocalyx* Bunge - П. крупночашечковый = I(М); III(СКТ,Тер); IV(БН): (Евро-Сиб.); S,Pa(НК); [Pl.] <Pm;Po>

1535. *P. ruprechtii* Kusn. – П. Рупрехта = III(Тер): (Кавк.); Pb,Pc(НК); [Pl.] <Po>

1536. *P. cordifolia* Rupr. – П. сердцелистный = III(Тер): (Кавк.); S,Pb,Do(НК); [Pl.] <Po>

1537. ★*P. darialica* Rupr. – П. дарьяльский = III(BC): (Эукавк.); Pb,Do(HK); [Sp.] <Esub;Po>
1538. *P. farinifolia* Rupr. – П. мучнистый = III(BC): (Эукавк.); Pb,Do(HK); [Sp.] <Po>
1539. *P. zeylamica* Charadze et Karell. – П. цейламский = III(Ч): (Эукавк.); S,Do(HK); [Sp.] <Es;Po>
1540. *P. algida* Adams – П. холодный = III(Тер): (Субкавк*.); Pb,РсHK); [Pl.] <Po>
1541. *P. luteola* Rupr. – П. жёлтенький = III(BC): (Эукавк.); Рс,Аа(HK); [Sp.] <Esub;Po>
1542. *P. auriculata* Lam. – П. ушковатый = III(Тер): (Армено-Иран.); Pb,Рс(HK); <Po>
1543. *P. bayernii* Rupr. – П. Баварна = III(BC): (Эукавк.); Рс,Do(HK); [Sp.] <EsubE;Po>
1544. *Androsace lehmanniana* Spreng. (*A. chamaejasme* Host.) – Проломник Лемана = III(Тер): (Эукавк.); Рс,Do(HK); [Sp.]
1545. *A. albana* Stev. – П. азербайджанский = III(BC): (Кавк.); Рс(HK:pb); [Sp.]
1546. *A. raddeana* Somm. et Levier – П. Радде = III(BC): (Кавк.); Рс,Do(HK:pb); [Sp.]
1547. *A. septentrionalis* L. – П. северный = III(BC): (Голаркт.); Pb,Рс,Do(T); [Pl.]
1548. *A. barbulata* Ovcz. (*A. villosa auct.*) - Проломник бородчатый – III(ЧО,Тер): (Кавк.); Da(HK); [Pl.] <Po>
1549. *A. elongata* L. - П. удлинённый = III(BC): (Палеаркт.); Ра(HK); [Pl.]
1550. *A. turczaninovii* Freyn. (*A. maxima* L.) - П. Турчанинова = Все районы: (Палеаркт.); ST,Rb(T); [Pl.]
1551. *Lysimachia nummularia* L. - Вербейник монетный = III(Ч): (Европ.); S(HK); [R.] <Rg;Pm;Po>
1552. *L. verticillaris* Spreng. - В. мутовчатый = III(СКТ,Тер): (Субкавк*.); Ра(HK); [Pl.] <Po>
1553. *L. dubia* Soland. - В. сомнительный = I(M); II(Кизл); III(ЧО,Ч); IV(БН): (Субкавк*.); Аа(T); [Sp.]
1554. *L. vulgaris* L. - В. обыкновенный = Все районы: (Палеаркт.); S,Аа(HK); [Sp.]
1555. *Glaux maritima* L. - Млечник приморский = III(Ч): (Голаркт.); Аа,Дс(HK); [R.]
1556. *Anagallis arvensis* L. - Очный цвет полевой = I(M); II(ВП); III(СКТ): (Палеаркт.); Ра,Rb(T); [R.] <Pm>
1557. *A. foemina* Vill. (*A. caerulea* Schreb.) - О.ц. женский = III(СКТ); IV(БН): (Общедр.средиз.); Ра,Rb(T); [R.]
1558. *Samolus valerandi* L. - Северница Валеранда = II(ВП): (Общедр.средиз.); Аа(HK); [R.]
- Сем. 120. LIMONIACEAE Ser. – КЕРМЕКОВЫЕ
1559. *Goniolimon tataricum*(L.)Boiss. - Гониолимон татарский = Все районы: (Понт.-Южносиб.); ST(HK); [Sp.] <Po>

1560. *G. besserianum*(Schult.)Kusn. - Г. Бессера = I(М); II(КН): (Понтич.); Дс(НК); [Rs.] <Rx>
1561. *Limonium meyeri*(Boiss.)O.Kuntze - Кермек Мейера = I(М); II(ВП); III(ТС); IV(БН): (Субтуран*.); Дс(НК); [Pl.] <Pm;Pmel;Po>
1562. *L. tomentellum*(Boiss.)O.Kuntze - К. опушённый = II([ВП: Гроссгейм, 1967]): (Понтич.); Дс,Аа(НК); [Sp.] <Pmel>
1563. *L. platyphyllum* Lincz. (*L. latifolium*(Smith)O.Kuntze) - К. широколистный = I(М); II(ВП); III(ТС); IV(БН): (Понтич.); ST(НК); [Pl.] <Pmel;Po>
1564. *L. caspium*(Willd.)Gams - К. каспийский = I(М); II(ВП): (Субтуран*.); Дс(НК); [Sp.] <Pmel;Po>
1565. *Psylliostachys spicata*(Willd.)Nevski - Подорожничкоцветник колосистый = II(ВП): (Ирано-Туран.); Дс(Т); [R.]
Сем. 121. OLEACEAE Hoffm. et Link - МАСЛИНОВЫЕ
1566. *Fraxinus excelsior* L. – Ясень обыкновенный = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Европ.); S(Phmg); [Pl.] <Pm>
1567. *Ligustrum vulgare* L. - Бирючина обыкновенная = Все районы: (Европ.); S(Phn); [Pl.] <Po;Pm;Pmel>
Сем. 122. GENTIANACEAE Juss. - ГОРЕЧАВКОВЫЕ
1568. *Centaurium pulchellum*(Sw.)Druce - Золототысячник красивый = III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); Аа(Т); [Sp.] <Pm>
1569. *C. meyeri*(Bunge)Druce - З. Мейера = I(М); II(КН); III(ЧО): (Обшедр.средиз.); Аа(Т); [Sp.]
1570. *C. minus* Moench (*C. littorale*(D.Turner)Gilmour, *C. erythraea* Rafin, *C. umbellatum* Gilib.) - З. малый = Все районы: (Европ.); Ра(НК:pb); [Pl.] <Pm>
1571. *C. spicatum*(L.)Fritsch - З. колосовидный = II(КН); IV(БН): (Обшедр.средиз.); Дс(Т); [R.] <Rx>
1572. *Gentiana schistocalyx*(С.Коч)С.Коч – Горечавка раздельночашечковая = III(Тер): (Кавк.); Pb,Рс(НК); [Pl.] <Pm>
1573. *G. grossheimii* Doluch. – Г. Гроссгейма = III(Тер): (Эукавк.); Da(НК): [Sp.] <Esub>
1574. *G. septemfida* Pall. - Горечавка семираздельная = III(Тер): (Субкавк*.); S,Pb(НК); [Sp.]
1575. *G. cruciata* L. - Г. крестообразная = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Палеаркт.); Ра(НК); [Sp.] <Pm>
1576. *G. djimilensis* С.Коч – Г. джимильская = III(Тер): (Субкавк*.); Рс,Do(НК); [Pl.]
1577. *G. aquatica* L. - Г. водная = III(Тер): II(Голаркт.); Pb,Рс(Т); [Sp.]
1578. *G. angulosa* Vieb. – Г. угловатая = III(Тер): (Эукавк.); Pb,Рс(НК); [Pl.]
1579. *Gentianopsis blepharophora*(Bordz.)Galushko (*Gentiana blepharophora* Bordz.) - Горечавочник ресниченосный = III(Тер): (Субкавк*.); ST(НК:pb); [R.]
1580. *Gentianella biebersteinii*(Bunge)Holub (*Gentiana biebersteinii* Bunge) - Горечавочка caucasea(Lodd. ex Sims.)Holub (*G. caucasica* Lodd., *G.*

- marcowiczii* Kusn.) – Горечавочка кавказская = III(BC): (Эукавк.); Pb, Pc(НК:pb); [Sp.]
1581. *G. umbellata*(Bieb.)Holub (*G. umbellata* Bieb.) – Г. зонтичная = III(BC): (Субкавк*.); Pb, Pc(НК:pb); [R.]
1582. *G. promethea*(Juz.)Holub (*Gentiana caucasica* Bieb.) - Г. Прометея = III(Тер): (Субкавк*.); Pb, Pc(НК); [Sp.]
1583. *Comastoma dechyana*(Somm. et Levier)Holub (*Gentiana dechyana* Somm. et Levier) – Комастома Деши = III(BC): (Эукавк.); Pc, Do(T); [Sp.]
1584. *Lomatogonium carinthiacum*(Wulf.)Reichenb. – Ломатогониум каринтийский = III(Тер): (Палеаркт.); Pb, Aa(T); [Pl.]
1585. *Swertia iberica* Fisch. et C.A.Mey. – Сверция грузинская = III(Тер): (Кавк.); Pb(НК); [Pl.]
- Сем. 123. MENYANTHACEAE Dumort. – ВАХТОВЫЕ
1586. *Nymphoides peltatum*(S.G.Gmel.)O.Kuntze - Болотноцветник щитолистный = II(Кизл): (Палеаркт.); Ac(K); [Sp.]
- Сем. 124. APOCYNACEAE Juss. - КУТРОВЫЕ
1587. *Vinca herbacea* Waldst.et Kit. – Барвинок травянистый = I(M); III(СКТ, Тер); IV(БН): (Субпонт*.); Pa(НК); [Pl.] <Pt;Po>
1588. *Trachomitum sarmatiense* Woodson - Кендырь сарматский = I(M); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Понт.-Южносиб.); Aa(НК); [Sp.]
- Сем. 125. ASCLEPIADACEAE R.Br. – ЛАСТОВНЕВЫЕ
1589. *Periploca graeca* L. - Обвойник греческий = II(ВП); III(ЧО); IV(БН): (Зап.др.средиз.); S(Ch:ll); [R.] <Pm;Po>
1590. *Vincetoxicum rehmannii* Boiss. (*A. rehmannii*(Boiss.)Pobed.) - Ластовень Реманна = III(СКТ, Тер); IV(БН): (Кавк.); S(НК); [Sp.] <Pmel>
1591. *V. hirundinaria* Medik. (*V. laxum*(Bartl.)Gren. et Gord.; *V. officinale* Moench, *V. cretaceum*(Pobed.)Vassjul., *A. laxum*(Bartl.)Pobed.) - Л. ласточкин = III(СКТ, Тер); IV(БН): (Европ.); Pa(НК); [Pl.] <Pmel>
1592. *V. funebre* Boiss.et Kotschy (*A. funebre*(Boiss. et Kotschy)Pobed.) - Л. погребальный = III(BC): (Субкавк*.); Dd(НК); [R.] <Pmel>
1593. *V. schmalhauseni*(Kusn.)Stank. (*A. schmalhauseni*(Kusn.)Pobed.) - Л. Шмальгаузена = III(Тер): (Кавк.); Pa(НК); [Sp.] <Pmel>
1594. *Synanchum acutum* L. - Цинанхум острый = I(M); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Субсредиз*.); Db, Rb(НК:lh); [Sp.]
- Сем. 126. CONVULVULACEAE Juss. - ВЬЮНКОВЫЕ
1595. *Convolvulus cantabrica* L. - Вьюнок кантабрийский = II(Кизл); III(ЧО): (Зап.др.средиз.); Da(НК); [R.]
1596. *C. lineatus* L. - В. узколистный = II(КН); III(СКТ): (Общедр.средиз.); ST, Da(НК); [Sp.] <Pm>
1597. *C. arvensis* L. - В. полевой = Все районы: (Плюрирег.); ST, Ra, Rb(НК:lh); [Pl.] <Pm>
1598. *Calystegia sepium*(L.)R.Br. - Повой заборный = Все районы: (Плюрирег.); S, Aa(НК:lh); [Sp.] <Pm>

1599. *C. silvatica*(Kit.)Griseb. (*Convolvulus silvaticus* Kit.; *Calystegia sylvestris*(Willd.)Roem. et Schult.) - П. лесной = Все районы:
(Зап.др.средиз.); S,Aa(НК:lh); [Sp.]
Сем. 127. CUSCUTACEAE Dumort. - ПОВИЛИКОВЫЕ
1600. *Cuscuta epithymum*(L.)L. - Повилика тимьяновая = II(Кизл);
III(СКТ,Тер); IV(БН): (Палеаркт.); ST(Т:par); [Pl.]
1601. *C. approximata* Bab. (*C. cupulata* Engelm.) - П. сближенная = II(Кизл);
III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); ST(Т:par); [Pl.]
1602. *C. europaea* L. - П. европейская = III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.);
Pa(Т:par); [Sp.] <Pm>
1603. *C. tinei* Insenga (*C. australis* R.Br.; *C. brevifolia* Vis.) - П. Тина = II(Кизл):
(Общедр.средиз.); Ra(Т:par); [R.]
1604. *C. monogyna* Vahl. - П. одностолбиковая = I(М); II(ВП); III(СКТ);
IV(БН): (Общедр.средиз.); Pa(Т:par); [Sp.]
Сем. 128. POLEMONIACEAE Juss. – СИНЮХОВЫЕ
1605. *Polemonium caucasicum* N.Busch (*P. coeruleum non L.*) – Синюха
кавказская = III(BC): (Кавк.); S,Pb(НК); [Sp.] <Pm>
Сем. 129. HYDROPHYLLACEAE R.Br. - ГИДРОФИЛИЕВЫЕ
1606. *Phacelia tanacetifolia* Benth. - Фацелия пижмолистная = III(ЧО):
(Адвент.[Сев. Америка]); Ra,Rb(Т); [R.]
Сем. 130. BORAGINACEAE Juss. - БУРАЧНИКОВЫЕ
1607. *Argusia sibirica*(L.)Dandy (*Tournefortia sibirica* L.) - Аргузия сибирская =
I(М); II(ВП); III(Ч): (Палеаркт.); Db(НК); [Sp.]
1608. *Heliotropium ellipticum* Ledeb. – Г. эллиптический = I(М); II(ВП);
IV(БН): (Вост.др.средиз.); ST,Rb(Т); [R.]
1609. *H. europaicum* L. - Г. европейский = I(М); II(Кизл); III(ТС); (БН):
(Субпонт*.); Rb(Т); [Sp.]
1610. *H. styligerum* Trautv. – Г. столбиковый = III(BC): (Эукавк.); ST,Do(Т);
[Sp.]
1611. *H. suaveolens* Vieb. - Г. душистый = I(М); II(ВП); III(ТС); IV(БН):
(Субпонт*.); ST,Dc(Т); [Sp.]
1612. *Omphalodes rupestris* Rupr. ex Boiss. – Пупочник скальный = III(Ч):
(Эукавк.); Pb,Do(НК); [Sp.] <EsubE>
1613. *Cynoglossum officinale* L. - Чернокорень лекарственный = Все районы:
(Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm>
1614. *Rindera tetraspis* Pall. - Риндера четырёхщитковая = III(СКТ):
(Субтуран*.); ST(НК); [Rs.] <Rx>
1615. *Lappula spinocarpos*(Forssk.)Aschers. – Липучка колючеплодная =
IV(БН): (Субсредиз*.); ST?Rb(Т); [R.]
1616. *L. consanguinea*(Fisch. ex C.A.Mey.)Guerke – Л. кровавая = IV(БН):
(Средиземн.); Rb(Т); [Sp.]
1617. *L. squarrosa*(Retz.)Dumort. (*L. myosotis* Moench; *L. echinata* Gilib. nom.
invalid.) – Л. ежевидная = Все районы: (Палеаркт.); ST,Rb(Т); [Pl.]
1618. *L. heteracantha*(Ledeb.)Vorb. - Л. разношипая = II(ВП); III(ТС): (Понт.-
Южносиб.); ST(Т); [R.]

1619. *L. barbata*(Bieb.)Guerke - Л. бородчатая = III(СКТ); IV(БН): (Ирано-Туран.); ST,Rb(T); [Pl.]
1620. *L. patula*(Lehm.)Menyharth - Л. пониклая = I(М); II(ВП); III(СКТ): (Общедр.средиз.); Rb(T); [Sp.]
1621. *L. marginata*(Lehm.)Guerke - Л. окаймлённая = I(М); II(ВП); IV(БН): (Туранск.); ST(T); [R.]
1622. *Asperugo procumbens* L. - Асперуга простёртая = Все районы: (Палеаркт.); Rb(T); [Sp.]
1623. *Symphytum officinale* L. - Окопник лекарственный = I(М): (Европ.); Aa(НК); [R.] <Pm;Pmel>
1624. *S. caucasicum* Vieb. - О. кавказский = I(М); II(ВП); III(Ч); IV(БН): (Кавк.); S(НК); [Sp.] <Pmel>
1625. *S. asperum* Lerech. - О. шершавый = III(СКТ); IV(БН): (Евро-Кавк.); S,Rb(НК); [Pl.] <Pmel;Pp>
1626. *Anchusa azurea* Mill. (*A. italica* Retz.) - Воловик итальянский = III(ЧО); IV(БН): (Общедр.средиз.); Ra,Rb(НК); [Sp.] <Pm>
1627. *Brunnera macrophylla*(Bieb.)Johnst. – Бруннера крупнолистная = III(Ч): (Кавк.); S(НК); [Sp.] <Rt>
1628. *Lycopsis orientalis* L. (*L. arvensis* (non L.) Ledeb., *Anchusa arvensis* (L.)Bieb.) - Кривоцвет восточный = Все районы: (Общедр.средиз.); Pa,Ra,Rb(T); [Pl.]
1629. *Trigonocaryum involucratum*(Stev.)Kusn. – Трёхгранноплодник окутанный = III(BC): (Эукавк.); Pb,Pc,Do(T); [Sp.]
1630. *Nonea lutea*(Desv.)DC. - Ноня жёлтая = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Субкавк*.); Db,Rb(T); [Pl.]
1631. *N. setosa*(Lehm.)Roem.et Schult. - Н. щетинистая = II(КН); III(ЧО); IV(БН): (Кавк.); ST,Dd(T); [Sp.]
1632. *N. rosea*(Bieb.)Link - Н. розовая = II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Кавк.); ST,Rb(T); [Sp.]
1633. *N. versicolor*(Stev.)Sweet – Н. разноцветная = III(Тер): (Субкавк.*); Do(T); [Pl.]
1634. *N. caspica*(Willd.)G.Don fil. - Н. каспийская = II(ВП): (Ирано-Туран.); ST(T); [R.]
1635. *N. intermedia* Ledeb. – Н. промежуточная = III(BC): (Кавк.); Pb,Pc,Do(НК); [Sp.]
1636. *Pulmonaria mollis* Wulf. ex Hornem. (*Pulmonaria mollissima* A.Kerner) - Медуница мягкая = III(Ч): (Евро-Сиб.); S(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>
1637. *Myosotis amoena*(Rupr.)Voiss. - Незабудка приятная = III(СКТ): (Эвксин.); S(НК); [Sp.]
1638. *M. sparsiflora* Pohl - Н. редкоцветковая = III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); S,Aa(T); [Sp.]
1639. *M. palustris*(L.)L. (*M. scorpioides* L.) – Н. болотная = III(СКТ): (Голаркт.); Aa(НК); [R.]
1640. *M. cespitosa* K.F.Schultz - Н. дернистая = I(М); III(ЧО): (Голаркт.); Aa(НК); [Sp.]

1641. *M. micrantha* Pall.ex Lehm. - Н. мелкоцветковая = II(КН); III(ТС): (Палеаркт.); Db(Т); [R.]
1642. *M. ramosissima* Rochel ex Schult. (*M. collina auct.*, *M. hispida Schlecht.*) – Н. ветвистая = III(BC): (Палеаркт.); ST,Rb(Т); [R.]
1643. *M. arvensis* (L.)Hill - Н. полевая = III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); Pa(Т); [Pl.] <Pm>
1644. *M. sylvatica* Ehrh.ex Hoffm. - Н. лесная = II(Кизл); III(СКТ); IV(БН): (Европ.); S(Т); [Pl.]
1645. *M. alpestris* F.W.Schmidt – Н. альпийская = III(Тер): (Голаркт.); Pb,Рс,Do(НК); [Pl.]
1646. *M. lithospermifolia*(Willd.)Hornem. (*M. suaveolens auct.*) - Н. воробейниколистная = III(СКТ,Тер): (Палеаркт.); Pa,Pb(НК); [Sp.]
1647. *Aegonichon purpureocaeruleum*(L.)Holub (*Lithospermum purpureocaeruleum* L.; *Buglossoides purpureocaerulea*(L.)Johnst.) - Эгонихон фиолетово-синий = II(Кизл); III(СКТ,Тер): (Европ.); S(НК); [Pl.]
1648. *Lithospermum officinale* L. - Воробейник лекарственный = Все районы: (Палеаркт.); ST,Rb(НК); [Sp.] <Pm>
1649. *Buglossoides arvensis*(L.)Johnst. (*Lithospermum arvense* L.) - Буглоссоид полевой = Все районы: (Палеаркт.); Pa(Т); [Pl.] <Pm>
1650. *B. tenuiflora*(L.fil.)Johnst. (*L. tenuiflorum* L.fil.) - Б. тонкоцветковый = II(КН): (Общедр.средиз.); Dc(Т); [R.]
1651. *Airyanthus echioides*(L.)Stev. (*Macrotomia echioides*(L.)Boiss., *Huynhia pulchra* (Roem. et Schult.)Greuter et Burdet) – Айпиант синяковидный = III(Тер): (Кавк.); Pb(НК); [Sp.]
1652. *Onosma armeniaca* Klok. ex M.Pop. (*O. hispida* Stev.) – Оносма армянская = III(BC): (Армено-Иран.); Da(НК); [Sp.]
1653. *O. tinctoria* Bieb. (*O. polychroma* Klok.ex M.Pop.) - О. красильная = II(КН); III(СКТ): (Субтуран*.); ST(Т); [Sp.]
1654. *O. caucasica* Levin ex M.Pop. - О. кавказская = III(Тер): (Эукавк.); Pb(НК); [Pl.]
1655. *Cerinthe minor* L. - Восковник малый = III(СКТ,Тер): (Субсредиз*.); Pa,Rb(НК:pb); [Pl.]
1656. *C. caucasica*(Hc)Galushko (*C. alpina* Kit.) – В. кавказский = III(BC): (Эукавк.); Рс,Do(НК); [R.]
1657. *Echium russicum* J.F.Gmel. (*E. rubrum* Jacq.) - Синяк русский = III(СКТ); IV(БН): (Субпонт*.); Pa(НК:pb); [Pl.]
1658. *E. biebersteinii*(Lacaita)Dobroc. (*E. italicum* L.) - С. Биберштейна = III(СКТ): (Общедр.средиз.); Rb(НК:pb); [Sp.]
1659. *E. vulgare* L. - С. обыкновенный = Все районы: (Палеаркт.); Pa,Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm;Pmel>
1660. *Rochelia retorta*(Pall.)Lipsky - Рохелия согнутая = III(ТС); IV(БН): (Субтуран*.); Pa(Т); [R.]
- Сем. 131. VERBENACEAE J.St.-Hil. - ВЕРБЕНОВЫЕ
1661. *Verbena officinalis* L. - Вербена лекарственная = Все районы: (Плюрирег.); Rb(НК); [Pl.] <Pm>

1662. *Lippia nodiflora*(L.)Michx. - Липпия узлоцветковая = II(Кизл):
(Общедр.средиз.); Аа,Аб(НК); [R.]
Сем. 132. LAMIACEAE Lindl. - ЯСНОТКОВЫЕ(ГУБООЦВЕТНЫЕ)
1663. *Ajuga reptans* L. - Живучка ползучая = III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.);
Ра(НК); [R.] <Pm>
1664. *A. genevensis* L. - Ж. женевская = Все районы: (Палеаркт.); Ра(НК); [Pl.]
<Pm>
1665. *A. orientalis* L. - Ж. восточная = Все районы: (Зап.др.средиз.);
ST(НК:ephd); [Pl.]
1666. *A. laxmannii*(L.)Benth. - Ж. Лаксмана = III(СКТ): (Понтич.); Ра(НК);
[Sp.]
1667. *A. chia* Schreb. - Ж. хиосская = II(КН): (Общедр.средиз.); ST(T); [R.]
<Pm>
1668. *A. glabra* C.Presl. (*A. pseudochia* Shost.) - Ж. ложнохиосская = III(СКТ);
IV(БН): (Зап.др.средиз.); ST,Rb(T); [Pl.]
1669. *Teucrium orientale* L. – Дубровник восточный = III(BC): (Армено-
Иран.); ST,Da(Ch:sf); [Pl.]
1670. *T. hircanicum* L. – Д. гирканский = III(Ч): (Кавк.); Ра(НК); [Sp.]
1671. *T. scordioides* Schreb. – Д. скордиевидный = II(Кизл); III(ЧО,Ч):
(Общедр.средиз.); Аа(НК); [Sp.]
1672. *T. nuchense* C.Koch - Д. нухинский = Все районы: (Субкавк*.);
Ра(Ch:sf); [Pl.]
1673. *T. chamaedrys* L. - Д. обыкновенный = Все районы: (Субпонт*.);
Ра(Ch:sf); [Sp.] <Pm>
1674. *T. polium* L. - Д. белый = Все районы: (Общедр.средиз.); Ра,ST(Ch:sf);
[Pl.] <Pm>
1675. *Scutellaria galericulata* L. - Шлемник обыкновенный = III(ЧО):
(Палеаркт.); Ра,Аа(НК); [Sp.] <Pm>
1676. *S. hastifolia* L. - Ш. копьелистный = I(M): (Европ.); Аа(НК); [Sp.]
1677. *S. altissima* L. - Ш. высочайший = III(Ч): (Субсредиз*.); S(НК); [Sp.]
1678. *S. leptostegia* Juz. – Ш. мелкочешуйчатый = III(BC): (Эукавк.);
Do(Ch:sf); [R.] <Esub>
1679. *S. raddeana* Juz. – Ш. Радде = III(BC): (Эукавк.); Pb(Ch:sf); [Sp.] <Es>
1680. *S. andina* Charadze – Ш. андийский = III(Тер): (Эукавк.); Do(Ch:sf); [R.]
<Esub>
1681. *S. oreophila* Grossh. - Ш. горолюбивый =III(BC): (Эукавк.); Pb(Ch:sf);
[Pl.]
1682. *Marrubium graecox* Janka - Шандра ранняя I(M); II(ВП); III(СКТ);
IV(БН): (Понтич.); ST,Rb(НК); [Pl.] <Pmel>
1683. *M. vulgare* L. - Ш. обыкновенная = I(M); III(СКТ,Тер):
(Общедр.средиз.); Ра,Ра,Rb(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>
1684. *M. plumosum* С.А.Меу. – Ш. перистая = III(BC - Аргун): (Эукавк.);
Pb,Pc,Do(НК); [R.] <Esub>
1685. *M. catariifolium* Desr. - Ш. котовниколистная = III(ТС,BC): (Субкавк*.);
ST(НК); [Sp.]

1686. *M. leonuroides* Desr. - Ш. пустырниковая = III(СКТ); IV(БН): (Кавк.); ST,Rb(НК); [Pl.]
1687. *M. peregrinum* L. - Ш. чужеземная = II(ВП); IV(БН): (Понтич.); ST(НК); [Sp.]
1688. *Sideritis montana* L. – Железница горная = Все районы: (Обшедр.средиз.); ST(T); [Pl.]
1689. *S. comosa*(Rochel ex Benth.)Stank. - Ж. хохлатая = III(BC): (Средиземн.); ST(T); [Sp.]
1690. *Nepeta supina* Stev. – Котовник лежащий = III(BC): (Кавк.); Pc,Do(НК); [Pl.]
1691. *N. cataria* L. – К. кошачий = Все районы: (Палеаркт.); Pa,Rb(НК); [Sp.] <Pm>
1692. *N. grandiflora* Vieb. - К. крупноцветковый = III(Тер): (Кавк.); Pa,Pb(НК); [Sp.]
1693. *N. cyanea* Stev. – К. синий = III(BC): (Эукавк.); Do(НК); [Pl.]
1694. *N. czegemensis* Pojark. – К. чегемский = III(BC): (Эукавк.); ST,Do(НК); [Sp.] <EsubE>
1695. *N. biebersteiniana*(Trautv.)Pojark. – К. Биберштейна = III(BC): (Эукавк.); Do(НК); [Sp.] <EsubE>
1696. *N. rannonica* L. - К. венгерский = Все районы: (Палеаркт.); ST(НК); [Pl.]
1697. *Glechoma hederacea* L. - Будра плющевидная = III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); S,Pa(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>
1698. *Dracoscephalum guyschiana* L. - Змееголовник Руйша = III(Тер): (Палеаркт.); Pb(НК); [Sp.] <Pmel;Po>
1699. *D. austriacum* L. - З. австрийский = III(Тер): (Евро-Кавк.); Pb(НК); [Pl.] <Pmel;Po>
1700. *Prunella vulgaris* L. - Черноголовка обыкновенная = Все районы: (Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pm>
1701. *P. laciniata*(L.)L. - Ч. разрезная = I(M); III(СКТ); IV(БН): (Евро-Кавк.); Pa,Aa(НК); [R.]
1702. *P. grandiflora*(L.)Scholl. - Ч. крупноцветковая = III(Тер): (Европ.); S,Pa(НК); [Sp.]
1703. *Eremostachis iberica* Vis. – Пустыноколосник грузинский = III(ЧО,Ч); IV(БН): (Субкавк*.); ST,Da(НК); [R.]
1704. *Phlomis pungens* Willd. - Зопник колючий = I(M); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Субпонт*.); ST(НК); [Pl.] <Pm>
1705. *Phlomoides tuberosa*(L.)Moench (*Phlomis tuberosa* L.) - Фломоидес клубненосный = Все районы: (Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pa;Pm>
1706. *Galeopsis bifida* Voenn. - Пикульник двунадрезанный = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Палеаркт.); S(T); [Sp.] <Pmel>
1707. *Lamium amplexicaule* L. - Яснотка стеблеобъемлющая = I(M); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); Pa,Ra,Rb(T); [Pl.] <Pm>
1708. *L. maculatum*(L.)L. - Я. пятнистая = III(Ч): (Европ.); S,Pa(НК); [Sp.] <Pmel>

1709. *L. album* L. - Я. белая = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); Rb(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>
1710. *L. tomentosum* Willd. - Я. войлочная = III(BC): (Субкавказ*.); Pс(НК); [Pl.]
1711. *L. purpureum* L. - Я. пурпурная = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); Pa,Rb(T); [Pl.] <Pmel>
1712. *Chaïturus marrubiastrum*(L.)Reichenb. - Гривохвост шандровский = II(ВП): (Палеаркт.); Rb(НК); [Sp.]
1713. *Leonurus quinquelobatus* Gilib (*Leonurus cardiaca* L.) - Пустырник пятилопастный = Все районы: (Евро-Сиб.); Rb(НК); [Sp.] <Pm;Pmel>
1714. *L. glaucescens* Bunge - П. сизый = II(Кизл): (Субтуран*.); Rb(НК); [R.] <Pmel>
1715. *Ballota nigra* L. - Белокудренник чёрный = Все районы: (Европ.); S,Rb(НК); [Pl.] <Pm>
1716. *Betonica macrantha* С.Кoch (*B. grandiflora* Willd.) – Буквица крупноцветковая = III(Тер): (Субкавказ*.); Pb,Pс(НК); [Pl.]
1717. *B. ossetica*(Bornm.)Chinth. – Б. осетинская = III(BC): (Эукавказ.); Da,Do(НК); [Pl.]
1718. *B. perauca* Klok. (*B. officinalis auct.*) – Б. сильно-расширенная = III(СКТ,Тер): (Палеаркт.); Pa,Pb(НК); [Pl.]
1719. *Stachys germanica* L. – Чистец германский = Все районы: (Европ.); S,Pa,Rb(НК); [Sp.] <Pmel>
1720. *S. balansae* Boiss. et Kotschy – Ч. Балансы = III(Тер): (Субкавказ*.); Pa,Pb(НК); [Pl.]
1721. *S. intermedia* Ait. - Ч. промежуточный = III(Тер): (Субкавказ*.); Pa,Pb(НК); [Sp.] <Pmel>
1722. *S. sylvatica* L. - Ч. лесной = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Евро-Сиб.); S(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>
1723. *S. palustris* L. - Ч. болотный = I(М); II(Кизл); III(ТС): (Палеаркт.); Aa(НК); [R.] <Pmel>
1724. *S. atherocalyx* С.Кoch - Ч. острочашечковый = Все районы: (Субкавказ*.); Dс(НК); [Sp.] <Pmel>
1725. *S. annua*(L.)L. - Ч. однолетний = II(КН); III(СКТ,BC); IV(БН): (Евро-Кавк.); Ra,Rb(T); [Sp.] <Pmel>
1726. *Salvia glutinosa* L. – Шалфей железистый = III(СКТ,Тер): (Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.] <Pm>
1727. *S. viridis* L. - Ш. зелёный = III(СКТ); IV(БН): (Средиземн.); ST,Rb(T); [R.]
1728. *S. daghestanica* Sosn. – Ш. дагестанский = III(BC): (Эукавказ.); Da(НК); [Sp.]
1729. *S. aethiops* L. - Ш. эфиопский = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Общедр.средиз.); ST,Da(НК); [Pl.] <Pm>
1730. *S. kuznetzovii* Sosn. – Ш. Кузнецова = III(BC): (Эукавказ.); Do(НК); [Sp.]
1731. *S. tesquicola* Klok.et Pobed. - Ш. сухостепной = Все районы: (Субтуран*.); ST(НК); [Pl.] <Pmel>

1732. *S. nemorosa* L. (*S. deserta* Schang.) - Ш. пустынный = I(M): (Туранск.); ST(НК); [R.]
1733. *S. fugax* Pobed. - Ш. опадающий = I(M); IV(БН): (Эукавк.); ST(НК); [R.] <Rx>
1734. *S. virgata* Jacq. – Ш. лозный = III(ТС): (Вост.др.средиз.); Pa(НК); [R.]
1735. *S. verticillata* L. - Ш. мутовчатый = Все районы: (Евро-Кавк.); Pa,Rb(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>
1736. *Ziziphora puschkinii* Adams – Зизифора Пушкина = III(Тер): (Эукавк.); Pc,Do(Ch:sf); [Pl.]
1737. *Melissa officinalis* L. - Мелисса лекарственная = III(BC): (Общедр.средиз.); Pa(НК); [Sp.] <Pm>
1738. *Satureja hortensis* L. (*Satureja laxiflora* C.Koch) - Чабер рыхлоцветковый = III(СКТ): (Понтич.); Da,Rb(T); [Sp.] <Pmel>
1739. *S. pachyphylla* C.Koch - Ч. толстолистный = II(КН): (Понтич.); ST(T); [R.] <Rx>
1740. *Clinopodium vulgare* L. - Пахучка обыкновенная = Все районы: (Евро-Сиб.); S(НК); [Pl.] <Pm>
1741. *Acinos arvensis*(Lam.)Dandy (*A. thymoides* Moench) - Душевка полевая = Все районы: (Евро-Кавк.); S,Pa(T); [Pl.]
1742. *A. rotundifolius* Pers. (*A. graveolens*(Bieb.)Link) - Д. округлолистная = Все районы: (Субпонт*.); ST(T); [Sp.]
1743. *Hyssopus angustifolius* Vieb. - Иссоп узколистный = III(BC): (Субкавк*.); ST(Ch:sf); [R.]
1744. *Origanum vulgare* L. - Душица обыкновенная = Все районы: (Палеаркт.); Pa,ST(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>
1745. *Thymus collinus* Vieb. – Чебрец холмовой = III(Тер): (Кавк.); Da(Ch:sf); [R.]
1746. *Th. marschallianus* Willd. (*Th. dimorphus* Klok.et Shost.) – Ч. Маршаллов = Все районы: (Понт.-Южносиб.); Pa,ST(Ch:sf); [Pl.] <Pm;Pmel>
1747. *Th. daghestanicus* Klok.et Shost. (*Th. mashukensis* Klok.) - Ч. дагестанский = III(BC); IV(БН): (Предкавк.); Da(Ch:sf); [R.] <Pmel>
1748. *Th. caucasicus* Willd. – Ч. кавказский = III(Тер): (Эукавк.); Pc,Do(Ch:sf); [Sp.]
1749. *Th. nummularius* Vieb. – Ч. монетный = III(BC): (Эукавк.); Pb,Pc(Ch:sf); [Pl.]
1750. *Lycopus europaeus* L. - Зюзник европейский = Все районы: (Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.] <Pm>
1751. *L. exaltatus* L.fil. - З. высокий = I(M); II(ВП); III(СКТ): (Палеаркт.); Aa(НК); [R.]
1752. *Mentha arvensis* L. - Мята полевая = III(ЧО): (Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.] <Pm;Pmel>
1753. *M. aquatica* L. - М. водная = II(Кизл); III(ЧО): (Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.] <Pmel;Pm>
1754. *M. caucasica* Gand. (*M. longifolia*(L.)Huds.) - М. кавказская = Все районы: (Кавк.); Aa(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>

Сем. 133. SOLANACEAE Juss. - ПАСЛЁНОВЫЕ

1755. ★ *Atropa caucasica* Kreyer (*A. bella-donna* L.) - Красавка кавказская = III(Тер): (Субкавказ*.); S(НК); [R.] <Pm;Pt>
1756. *Physochlaina orientalis*(Bieb.)G.Don fil. - Пузырница восточная = III(Ч): (Субкавказ*.); Pb(НК); [Sp.] <Pt>
1757. *Hyoscyamus niger* L. (*H. bohemicus* F.W.Schmidt) - Белена чёрная = Все районы: (Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm;Pt>
1758. *Physalis alkekengi* L. - Физалис обыкновенный = II(Кизл); III(СКТ): (Европ.); S,Rb(НК); [Pl.] <Pa;Pm;Po>
1759. *Solanum nigrum* L. - Паслён чёрный = Все районы: (Палеаркт.); Rb(T); [Pl.] <Pa;Pt;Pm>
1760. *S. schultesii* Opiz (*S. decipiens* Opiz) - П. Шультеза = II(Кизл); III(ЧО): (Евро-Кавк.); Rb(T); [R.] <Pt>
1761. *S. villosum* Mill. (*S. luteum* Mill.) - П. мохнатый = II(Кизл): (Субсредиз*.); Rb(T); [R.] <Pt>
1762. *S. pseudopersicum* Pojark. - П. ложноперсидский = III(СКТ): (Субкавказ*); S,Rb(Ch:sf:lh); [Pl.] <Pt;Pm>
1763. *S. cornutum* Lam. (*S. rostratum* Dun.) - П. рогатый = I(М); II(КН) (Адвент.[Сев.Америка]); Ra,Rb(T); [Sp.] <Pt>
1764. *Datura stramonium* L. - Дурман обыкновенный = Все районы: (Палеаркт.); Rb(T); [Sp.] <Pm;Pt>

Сем. 134. SCROPHULARIACEAE Juss. - НОРИЧНИКОВЫЕ

1765. *Verbascum phlomooides* L. - Коровяк лекарственный = II(Кизл); III(ЧО,Ч); IV(БН): (Европ.); Pa(НК:pb); [Sp.] <Pm>
1766. *V. lychnitis* L. - К. мучнистый = I(М); III(ЧО,Тер); IV(БН): (Европ.); Pa(НК:pb); [Sp.]
1767. *V. laxum* Filag.et Jav. - К. раскидистый = Все районы: (Кавк.); Pa(НК); [Pl.]
1768. *V. ovalifolium* Donn ex Sims - К. овальнолистный = I(М); II(КН): (Понтич.); ST,Db(НК); [R.]
1769. *V. pyramidalatum* Vieb. - К. пирамидальный = III(СКТ); IV(БН): (Субкавказ*.); Pa(НК); [Pl.]
1770. *V. blattaria* L. - К. тараканий = I(М); II(ВП): (Палеаркт.); Pa(НК:pb); [Sp.] <Pm>
1771. *V. phoeniceum* L. - К. фиолетовый = Все районы: (Понт.-Южносиб.); Pa(НК); [Pl.]
1772. *Linaria vulgaris* Mill. - Льянка обыкновенная = Все районы: (Европ.); Pa,Rb(НК); [Sp.] <Pm>
1773. *L. biebersteinii* Bess. - Л. Биберштейна = I(М); II(Кизл); III(СКТ); IV(БН): (Понтич.); Pa(НК); [Sp.]
1774. *L. incompleta* Kuprian. - Л. неполноцветковая = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Туранск.); ST,Db(НК); [Sp.]
1775. *L. odora*(Bieb.)Fisch. - Л. душистая = II(ВП); III(ТС); IV(БН): (Понтич.); Db(НК); [R.]

1776. *L. simplex*(Willd.)DC. - Л. простая = II(КН); III(ТС): (Субсредиз*.); Rb(Т); [R.]
1777. *L. genistifolia*(L.)Mill. (*L. pontica* Kuprian.) - Л. дреколистная = I(М); II(Кизл); III(СКТ); IV(БН): (Европ.); Pa(НК); [Pl.]
1778. *L. caucasigena* Kem.-Nath. - Л. кавказская = III(Ч): (Кавк.); Pb(НК); [Sp.]
1779. *Chaenorhinum minus*(L.)Lange (*Ch. viscidum*(Moench)Simonk) - Хеноринум малый = III(Ч): (Евро-Кавк.); Da(Т); [R.]
1780. *Scrophularia lateriflora* Trautv. - Норичник бокоцветный = III(BC): (Эукавк.); Da(НК); [R.]
1781. *S. minima* Vieb. - Н. малый = III(BC): (Эукавк.); Pc,Do(НК); [Sp.] <Esub>
1782. *S. scorolii* Horre ex Pers. - Н. Скополи = III(Ч): (Общедр.средиз.); S(НК); [R.]
1783. *S. divaricata* Ledeb. - Н. растопыренный = III(Ч): (Кавк.); S(НК); [Sp.]
1784. *S. nodosa* L. - Н. узловатый = III(СКТ,Ч): (Панбор.); S,Аа(НК); [R.] <Pm;Pmel>
1785. *S. umbrosa* Dumort. (*S. alata* Gilib. nom. invalid.) - Н. теневой = III(СКТ,ЧО): (Палеаркт.); S(НК); [Sp.]
1786. *S. olympica* Boiss. - Н. олимпийский = III(Ч): (Субкавк*.); Pb,Pc,Do(НК); [Pl.]
1787. *S. ruprechtii* Boiss. - Н. Рупрехта = III(Тер): (Эукавк.); Pc,Do(НК); [Sp.]
1788. *S. rupestris* Vieb.ex Willd. - Н. скальный = III(Тер): (Субкавк*.); Da(НК); [Pl.]
1789. *S. charadzeae* Kem.-Nath. - Н. Харадзе = III(BC): (Эукавк.); Do(НК); [R.] <Esub>
1790. *Dodartia orientalis* L. - Додарция восточная = I(М); II(ВП): (Ирано-Туран.); Db,Dd(НК); [Sp.]
1791. *Limosella aquatica* L. - Лужница водяная = III(BC): (Плюрирег.); Аа(Т); [Sp.]
1792. *Veronica spicata* L. - Вероника колосистая = I(М); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); ST(НК); [Sp.]
1793. *V. orchidea* Crantz - В. орхидная = III(Тер): (Европ.); Pa(НК); [Sp.]
1794. *V. longifolia* L. - В. длиннолистная = I(М); II(Кизл); III(Ч): (Палеаркт.); Аа(НК); [R.]
1795. *V. gentianoides* Vahl - В. горечавковая = III(СКТ,Тер): (Субкавк*.); Pa(НК); [Pl.]
1796. *V. charadzeae* Kem.-Nath. - В. Харадзе = III(BC): (Эукавк.); Pb(НК); [R.] <Esub>
1797. *V. serpyllifolia* L. - В. тимьянолистная = III(СКТ): (Палеаркт.); Аа(НК); [Sp.]
1798. *V. minuta* C.A.Mey. - В. мелкая - III(Тер): (Кавк.); Pc,Do(НК); [Pl.]
1799. ★ *V. bogosensis* Tumad. - В. богосская = III(BC): (Эукавк.); Pc,Do(НК); [Sp.] <Esub>
1800. *V. anagallis-aquatica* L. - В. ключевая = Все районы: (Палеаркт.); Аа,Ab(К); [Pl.] <Pm>

1801. *V. beccabunga* L. - В. попочная = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.] <Pm>
1802. *V. propingua* Boriss. - В. близкая = III(Тер): (Эукавк.); Pb,Рс,Do(НК); [Pl.]
1803. *V. officinalis* L. - В. лекарственная = III(Тер): (Палеаркт.); S(НК); [R.]
1804. *V. magna* M.Fisch. (*V. melissifolia* Desf.ex Poir.) - В. мелиссолистная = III(СКТ,Тер): (Субкавк*.); S(НК); [Sp.]
1805. *V. peduncularis* Bieb. - В. цветоножковая = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Субкавк*.); S(НК); [Pl.]
1806. *V. umbrosa* Bieb. - В. теневая = III(Ч): (Субкавк*.); S(НК); [Sp.]
1807. *V. chamaedrys* L. - В. дубравная = I(СКТ,Тер); IV(БН): (Палеаркт.); S,Pa(НК); [Pl.] <Pm>
1808. *V. caucasica* Bieb. - В. кавказская = III(Тер): (Кавк.); Pb(НК); [Pl.]
1809. *V. teucrium* L. - В. широколистная = III(СКТ,Тер): (Палеаркт.); S,Pa(НК); [Pl.] <Pm>
1810. *V. prostrata* L. - В. простёртая = III(Ч): (Палеаркт.); Pa,ST(НК); [R.]
1811. *V. jacquinii* Baumg (*V. austriaca* L.) - В. Жаквина = III(СКТ): (Субкавк*.); ST(НК); [Sp.]
1812. *V. multifida* L. - В. многораздельная = III(Тер): (Субтуран*.); ST,Da(НК); [Sp.]
1813. *V. crista-galli* Stev. - В. петуший гребень = III(ЧО); IV(БН): (Субкавк*.); Rb(T); [R.]
1814. *V. arvensis* L. - В. полевая = Все районы: (Палеаркт.); ST,Pa(T); [Sp.]
1815. *V. verna* L. - В. весенняя = I(М); II(Кизл); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); ST,Db(НК); [Sp.]
1816. *V. hederifolia* L. - В. плющелистная = I(М); II(Кизл); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.]
1817. *V. triphyllos* L. - В. трёхлистная = I(М): (Зап.др.средиз.); ST(T); [Sp.]
1818. *V. praesox* All. - В. ранняя = I(М); II(Кизл); III(СКТ); IV(БН): (Средиземн.); ST(T); [Sp.]
1819. *V. polita* Fries (*V. didyma* Ten.) - В. изящная = Все районы: (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.]
1820. *V. persica* Poir. - В. персидская = I(М); II(Кизл); III(СКТ); IV(БН): (Общедр.средиз.); Ra,Rb(T); [Pl.]
1821. *V. filiformis* Smith - В. нитевидная = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Субкавк*.); S,Pa(T); [Sp.]
1822. *Melampyrum elatius*(Boiss.)Soo - Марьяник высокий = III(Ч): (Эвксин.); Pb(T:hpar); [Sp.]
1823. *M. arvense* L. - М. полевой = II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Европ.); Pa(T:hpar); [Pl.] <Pmel>
1824. *M. caucasicum* Bunge - М. кавказский = III(BC): (Кавк.); Pa,Pb(T:hpar); [R.]
1825. *M. cristatum* L. - М. гребенчатый = I([М - ст.Наурская: Галушко, 1980]): (Европ.); S,Rb(T:hpar); [R.] <Rg>

1826. *Euphrasia pectinata* Ten. (*Euphrasia tatarica* Fisch. ex Spreng.) - Очанка татарская = III(СКТ, Тер): (Палеаркт.); Pa(T:hpar); [Pl.]
1827. *E. hirtella* Jord. ex Rent. - О. волосистенькая = III(Тер): (Палеаркт.); Pb(T:hpar); [Sp.]
1828. *E. petiolaris* Wettst. - О. черешковая = III(Тер): (Кавк.); Pb, Pc(T:hpar); [Sp.]
1829. *Orthanthella lutea* (L.) Rauschert (*Orthantha lutea* (L.) A. Kerner ex Wettst.) - Органтелла жёлтая = III(ЧО): (Понтич.); Pa(T:hpar); [R.]
1830. *Odontites vulgaris* Moench (*O. rubra* (Baumg.) Opiz; *O. serotina* (Lam.) Dumort.) - Зубчатка обыкновенная = I(М); II(Кизл); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); Pa, Rb(T); [Sp.]
1831. *Rhinanthus minor* L. (*R. nigricans* Meinsh.) - Погремок малый = III(Тер): (Европ.); Pa, Pb(T:hpar); [Pl.]
1832. *Rh. vernalis* (N. Zing.) Schischk. et Serg. (*Rh. aestivalis* (N. Zing.) Schischk. et Serg.; *Rh. angustifolius* C. C. Gmel.) - П. весенний = I(М); III(Тер); IV(БН): (Евро-Сиб.); Pa(T:hpar); [Pl.]
1833. *Rh. subulatus* (Chabert) Soo - П. шиловидный = III(СКТ, Ч): (Кавк.); Pa, ST(T:hpar); [Sp.]
1834. *Pedicularis caucasica* Vieb. - Мытник кавказский = III(BC): (Субкавказ*.); Pc, Do(НК:hpar); [Sp.]
1835. *P. armena* Boiss. et Huet - М. армянский = III(Тер): (Субкавказ*.); Pb, Pc(НК:hpar); [R.]
1836. *P. condensata* Vieb. - М. сжатый = III(Тер): (Субкавказ*.); Pb, Pc(НК:hpar); [Pl.]
1837. *P. crassirostris* Bunge - М. толстоносый = III(Ч): (Кавк.); Pc(НК:hpar); [Pl.]
1838. *P. nordmanniana* Bunge - М. Нордмана = III(BC): (Кавк.); Pc(НК:hpar); [Pl.]
1839. *P. daghestanica* Bonati - М. дагестанский = III(ЧО, Ч); IV(БН): (Эукавказ.); Pa(НК:hpar); [Sp.]
1840. *P. chroorrhyncha* Vved. (*P. sibthorpii auct. fl. cauc.*) - М. окрашенноклювый = III(Тер): (Вост. др. средиз.); Pb, Pc(НК:hpar); [Pl.]
1841. *P. kaufmannii* Pinzg. - М. Кауфмана = III(СКТ): (Понт.-Южносиб.); Pa(НК:hpar); [Pl.]
1842. *Rhynchocorys elephas* (L.) Griseb. (*Rh. stricta* C. Koch) - Хоботник слоновый = III(BC): (Вост. др. средиз.); Pb, Pc(T); [Sp.]
1843. *R. orientalis* (L.) Benth. - Х. восточный = III(СКТ, Тер): (Кавк.); Pb(T); [Sp.]
1844. *Lathraea squamaria* L. - Петров крест чешуйчатый = III(СКТ, Тер): (Палеаркт.); S(НК:par); [Pl.]
- Сем. 135. MARTYNIACEAE Stapf - МАРТИНИЕВЫЕ
1845. *Proboscidea louisiana* (Mill.) Thell. - Пробосцидея луизианская = III(ЧО): (Адвент. [Сев. Америка]); Ra, Rb(T); [R.]
- Сем. 136. OROBANCHACEAE Vent. - ЗАРАЗИХОВЫЕ

1846. *Diphelyraea coccinea*(Bieb.)Nocolson (*Phelyraea coccinea*(Bieb.) Poir.) - Дифелипея красная = III(СКТ,Ч): (Субкавк*.); Pa(К:par); [Sp.]
1847. *Phelyranche purpurea*(Jacq.)Sojak (*Orobanchе purpurea Jacq.*) - Фелипанхе пурпуровая = III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); Pa(Т:par); [Sp.]
1848. *Ph. mutelii*(F.Schultz)Czer. (*O. mutelii F.Schultz*) – Ф. Мутеля = III(ЧО); IV(БН): (Зап.др.средиз.); Pa(Т:par); [Sp.]
1849. *Ph. dalmatica*(G.Beck)Sojak (*O. dalmatica(G.Beck)Tzvel.*) – Ф. далматская = III(ЧО): (Эвксин.); Pa(Т:par); [R.]
1850. *Ph. oxyloba*(Reut.)Sojak (*O. nana(Reut.)Noe ex G.Beck*) – Ф. низкая = III(ЧО): (Зап.др.средиз.); Ra(Т:par); [R.]
1851. *Ph. ramosa*(L.)Pomel (*O. ramosa L.*) – Ф. ветвистая = I(М); II(Кизл); III(СКТ); IV(БН): (Субсредиз*.); Ra(Т:par); [Sp.] <Pm>
1852. *Ph. laevis*(L.)Holub (*O. arenaria Borkh*) – Ф. песчаная = III(ЧО); IV(БН): (Понт.-Южносиб.); ST(Т:par); [R.]
1853. *Ph. lanuginosa*(С.А.Мей.)Holub (*O. lanuginosa(С.А.Мей.)Greuter et Burdet; O. caesia Reichenb.*) - Ф. голубая = III(ЧО); IV(БН): (Палеаркт.); ST(Т:par); [Sp.]
1854. *Orobanchе coerulescens* Steph. - З. синеватая = Все районы: (Палеаркт.); ST(К:par); [Sp.]
1855. *O. cernua* Loefl. - З. поницкая = I(М); II(Кизл); III(СКТ); IV(БН): (Зап.др.средиз.); Pa,Ra(Т:par); [Sp.]
1856. *O. cumana* Wallr. - З. подсолнечниковая = I(М); II(Кизл); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); Pa,Rb(Т:par); [Sp.]
1857. *O. gamoserpala* Reut. - З. сростночашелистниковая = III(Тер): (Кавк.); Pa,Pb(Т:par); [Sp.]
1858. *O. lutea* Baumg. - З. жёлтая = III(СКТ,Тер): (Палеаркт.); Pa(К:par); [Sp.]
1859. *O. caryophyllacea* Smith (*O. vulgaris Poir.*) - З. гвоздичная = I(М); II(Кизл); III(СКТ); IV(БН): (Зап.др.средиз.); Pa,ST(К:par); [Sp.]
1860. *O. alba* Steph. - З. белая = III(Тер): (Зап.др.средиз.); Pa(К:par); [Pl.]
1861. *O. reticulata* Wailr. – З. сетчатая = III(Тер): (Субсредиз*.); Pa,Pb(К:par); [R.]
1862. *O. raddeana* G.Beck - З. Раде = III(Тер): (Субкавк*.); Pb(К:par); [Sp.]
1863. *O. crenata* Forrsk. (*O. owerinii(G.Beck)G.Beck*) - З. Оверина = III(СКТ,Тер): (Субкавк*.); S,Pa(К:par); [Sp.]
1864. *O. picridis* F.Schultz - З. горчачковая = III(СКТ,Тер): (Евро-Кавк.); S(К:par); [R.]
1865. *O. grossheimii* Новорокр. – З. Гроссгейма = III(BC): (Кавк.); Pb(К:par);
1866. *O. elatior* Sutt. (*O. major L. p.p. nom. abig.*) - З. высокая = I(М); II(Кизл); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); ST(К:par); [R.]
1867. *O. inulae* Новорокр. et Абрамов - З. девясиловая = III(Ч); IV(БН): (Кавк.); Pb(К:par); [Sp.]
1868. *O. alsatica* Kirschl. - З. эльзасская = III(Ч): (Палеаркт.); Pa(К:par); [Pl.]
1869. *O. colorata* С.Koch - З. покрашенная = III(Ч): (Субкавк*.); S(К:par); [R.]
- Сем. 137. LENTIBULARIACEAE Rich. - ПУЗЫРЧАТКОВЫЕ

1870. *Utricularia vulgaris* L. - Пузырчатка обыкновенная = I(M); II(ВП); III(BC): (Голаркт.); Ac(T:pi); [R.]
Сем. 138. PLANTAGINACEAE Juss. - ПОДОРОЖНИКОВЫЕ
1871. *Plantago major* L. - Подорожник большой = Все районы: (Плюрирег.); Pa,Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm>
1872. *P. tenuiflora* Waldst. et Kit. - П. тонкоколосый = I(M); II(Кизл): (Палеаркт.); Db,Dc(НК); [Sp.]
1873. *P. cornuti* Gouan - П. Корнута = I(M); II(КН): (Палеаркт.); Dc(НК); [R.]
1874. *P. media* L. - П. средний = Все районы: (Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pm>
1875. *P. urvillei* Opiz (*P. stepposa* Kuprian.) - П. Урвиля = Все районы: (Понт.-Южносиб.); ST,Rb(НК); [Sp.]
1876. *P. maxima* Juss.ex Jacq. - П. крупный = I(M): (Евро-Сиб.); Dc(НК); [R.]
1877. *P. lanceolata* L. - П. ланцетолистный = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Плюрирег.); ST(НК); [Pl.] <Pm>
1878. *P. salsa* Pall. - П. солончаковый = I(M); II(ВП): (Плюрирег.); Dc(НК); [Sp.]
1879. *P. caucasica* Parava – П. кавказский = III(Ч): (Кавк.); Pc(НК); [Sp.]
1880. *P. saxatilis* Bieb. – П. скальный = III(Тер): (Кавк.); Pc(НК); [Pl.]
1881. *Psyllium scabrum*(Moench)Holub (*Plantago arenaria* Waldst.et Kit., *P. indica* L.) – Псиллиум шершавый = I(M); II(ВП): (Общедр.средиз.); Db(T); [Pl.]
Сем. 139. RUBIACEAE Juss. - МАРЕНОВЫЕ
1882. *Asperula molluginoides*(Bieb.)Reichenb. (*Crucianella molluginoides* Bieb.) - Ясменник моллюгообразный = III(СКТ,Тер): (Субкавк*.); Pa(НК); [Sp.]
1883. *A. albovii* Manden. – Я. Альбова = III(Ч): (Эукавк.); Pc,Do(НК); [Sp.]
1884. *A. odorata* L. (*Galium odoratum*(L.)Scop.) - Я. душистый = III(СКТ,Тер): (Палеаркт.); S(НК); [Pl.] <Pm>
1885. *A. biebersteinii* V.Krecz. - Я. Биберштейна = [I(M); II(ВП); Михеев, 1992]: (Предкавк.); Db(Ch:sf); [Sp.]
1886. *A. dasyantha* Klok. – Я. опушенноцветковый = III(BC): (Эукавк.); Pb,Pc,Do(Ch:sf); [R.] <Esub>
1887. *A. cristata*(Somm. et Levier)V.Krecz. – Я. гребенчатый = III(Тер): (Кавк.); Pc,Do(Ch:sf); [Pl.]
1888. *A. alpina* Bieb. – Я. альпийский = III(Ч): (Эукавк.); Pb,Pc,Do(Ch:sf); [Pl.]
1889. *A. graveolens* Bieb. ex Schult.et Schult. fil. - Я. пахучий = II(КН): (Понтич.); Db(Ch:sf); [R.]
1890. *A. diminuta* Klok. - Я. уменьшенный = I(M); II(ВП): (Предкавк.); Db(Ch:sf); [Sp.] <EsubE>
1891. *A. rivalis* Sibth. et Smith (*G. rivale*(Smith)Griseb.) - Я. ручейный = III(СКТ); IV(БН): (Европ.); Pa(НК); [Sp.]
1892. *A. galioides* Bieb. (*G. biebersteinii* Ehrend.) - Я. Биберштейна = III(BC): (Понтич.); ST(НК); [Pl.]
1893. *A. humifusa*(Bieb.)Bess. (*G. humifusum* Bieb.) – Я. распростёртый = Все районы: (Вост.др.средиз.); ST,Rb(НК); [Pl.]

1894. *A. arvensis* L. - Я. полевой = I(М); II(КН); IV(БН): (Средиземн.); Ра(Т); [Sp.]
1895. *Galium tricornutum* Dandy (*G. rticorne* Stokes) - Подмаренник трёхрогий = I(М); II(Кизл); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); Ра,Рb(Т); [Sp.]
1896. *G. aparine* L. (*G. spurium* L.) - П. цепкий = Все районы: (Голаркт.); Ра,Ра,Рb(Т); [Sp.] <Pm>
1897. *G. verum* L. - П. весенний = Все районы: (Субсредиз*.); ST(НК); [Pl.] <Pm>
1898. *G. palustre* L. - П. болотный = I(М): (Голаркт.); Ра,Рb,Аa(НК); [Sp.]
1899. *G. saturejifolium* Trev. - П. чаберолистный = II([ВП: Михеев, 1992]): (Туранск.); Ра(НК); [R.]
1900. *G. rubioides* L. (*G. articulatum* Lam.) - Подмаренник членистый = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Европ.); S,Ра,Аa(НК); [Sp.]
1901. *G. valantioides* Bieb. - П. валантиевидный = III(Тер): (Кавк.); Da(НК); [Pl.]
1902. *G. flaviflorum*(Trautv.)A.D.MikheeIV(*G. aureum* Vis.) - П. золотистый = Все районы: (Субкавказ*.); Ра,Da(НК); [Sp.]
1903. *G. ruthenicum* Willd. - П. русский = Все районы: (Понт.-Южносиб.); Ра,ST(НК); [Pl.]
1904. *G. mollugo* L. - П. мягкий = III(Тер): (Голаркт.); Ра,Аa(НК); [R.] <Rg>
1905. *G. album* Mill. (*G. erectum* Huds.) - П. прямой = I([М); II(ВП: Михеев, 1992]): (Субсредиз*.); S(НК); [R.]
1906. *G. brachyphyllum* Roem. et Schult. - П. коротколистный = III(Ч): (Кавк.); ST,Do(НК); [Pl.]
1907. *G. octonarium*(Klok.)Soo (*Asperula octonaria* Klok.) - П. восьмилистный = I(М): (Субтуран*.); ST(НК); [Sp.]
1908. *G. tenuissimum* Bieb. - П. тончайший = II(ВП: Михеев, 1992)]; III(СКТ); IV(БН): (Субтуран*.); Ра,ST(Т); [Sp.]
1909. *Cruciata glabra*(L.)Ehrend. (*Galium verum* Scop.) - Круциата голая = III(СКТ,Тер): (Палеаркт.); Ра,Рb(НК); [Pl.]
1910. *C. laevipes* Opiz (*G. cruciata*(L.)Scop.) - К. гладенькая = Все районы: (Зап.др.средиз.); Ра(НК); [Pl.] <Pm>
1911. *C. coronata*(Sibth. et Smith)Ehrend. (*G. coronatum* Sibth. et Smith) - К. венечная = III(Ч); IV(БН): (Субкавказ*.); Da(НК); [Sp.]
1912. *C. pedemontana*(Bell.)Ehrend. (*G. pedemontanum*(Bell.)All.) - К. пьемонтская = II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Общедр.средиз.); ST(Т); [R.]
1913. *C. rugosa*(Galushko)Galushko (*G. rugosum* Galushko) - К. морщинистая = III(BC): (Эукавказ.); Рс,Do(НК); [Pl.]
1914. *Rubia tinctorium* L. (*R. iberica*(Fisch.ex DC.)C.Koch) - Марена красильная = I(М); II(ВП); IV(БН): (Общедр.средиз.); Аa(НК); [R.] <Pm>
1915. *R. tatarica*(Trev.)Fr. (*Galium tataricum* Trev.) - М. татарская = II(ВП:Михеев, 1992]): (Понт.-Южносиб.); Ра,Аa(НК); [R.]
- Сем. 140. SAMBUCACEAE Batsch ex Borkh - БУЗИНОВЫЕ
1916. *Sambucus nigra* L. - Бузина чёрная = Все районы: (Европ.); S,Рb(Phn); [Pl.] <Pm;Ра>

1917. *S. ebulus* L. - Б. травянистая = Все районы: (Зап.др.средиз.); S,Rb(НК); [Sp.] <Pt;Pm>
Сем. 141. VIBURNACEAE Rafin. - КАЛИНОВЫЕ
1918. *Viburnum lantana* L. - Калина гордовина = III(СКТ,Тер): (Субсредиз*.); S(Phn); [Pl.]
1919. *V. opulus* L. - К. обыкновенная = III(СКТ,Тер): (Палеаркт.); S(Phn); [Pl.] <Pm;Pa;Pmel>
1920. *Linnaea borealis* L. – Линнея северная = III(Тер): (Голаркт.); S(Ch:sf); [Pl.]
Сем. 142. CAPRIFOLIACEAE Juss. - ЖИМОЛОСТНЫЕ
1921. *Lonicera caucasica* Pall. (*L. orientalis* Lam.) - Жимолость кавказская = III(СКТ,Тер): (Кавк.); S(Phn); [Pl.] <Pmel>
1922. *L. steveniana* Fisch.ex Rojark. (*L. xylosteum auct. fl. cauc.*) - Ж. Стевена = III(Тер): (Кавк.); S(Phn); [Pl.] <Pmel>
1923. *L. caprifolium* L. – Ж. каприфоль = III(СКТ,Тер): (Субкавк*.); S(Ch:ll); [Pl.] <Po;Pm;Pmel>
Сем. 143. ADOXACEAE Trautv. – АДОКСОВЫЕ
1924. *Adoxa moschatellina* L. – Адокса мускусная = III(BC): (Палеаркт.); S,Pb(НК); [R.] <Rg>
Сем. 144. VALERIANACEAE Batsch - ВАЛЕРИАНОВЫЕ
1925. *Valeriana tuberosa* L. - Валериана клубненосная = III(ТС): (Субтуран*.); Pa(K); [Sp.]
1926. *V. alliariifolia* Adams - В. чесночницелистная = III(Тер): (Эвксин.); Pb(НК); [Sp.]
1927. *V. tiliifolia* Troitzk. – В. липолистная = III(Тер): (Эукавк.); S,Pb(НК); [Pl.]
1928. *V. alpestris* Stev. – В. предальпийская = III(Тер): (Кавк.); Pb,Pc(НК); [Pl.]
1929. *V. jelenevskyi* P.Smirn. – В. Еленевского = III(Ч): (Кавк.); Pb,Pc,Do(НК); [Sp.]
1930. *V. cardamines* Vieb. - В. сердечниковая = III(Ч): (Эукавк.); Pb,Db(НК); [Sp.]
1931. *V. daghestanica* Rupr. ex Boiss. – В. дагестанская = III(BC): (Эукавк.); Pc,Do(НК); <EsubE>
1932. *V. officinalis* L. (*V. grossheimii* Worosch.) - В. лекарственная = Все районы: (Евро-Сиб.); S,Pa(НК); [Pl.] <Pm>
1933. *V. saxicola* С.А.Меу. – В. скальная = III(Тер): (Кавк.); Pb,Pc,Do(НК); [Sp.]
1934. *Valerianella uncinata*(Vieb.)Duf. – Валерианица крючковатая = III(Тер); IV(БН): (Субтуран*.); ST,Rb(T); [R.]
1935. *V. locusta*(L.)Laterrade – В. колосковая = I(M); II(Кизл); III(СКТ); IV(БН): (Субсредиз*.); ST,Rb(T); [Sp.]
1936. *V. dentata*(L.)Poll. - В. зубчатая = I(M); II(Кизл); III(СКТ); IV(БН): (Зап.др.средиз.); Pa,Rb(T); [Pl.]

1937. *V. carinata* Loisel. - В. килеватая = I(М); II(Кизл); III(СКТ); IV(БН):
(Субсредиз*.); Ra,Rb(T); [Pl.]
1938. *V. turgida*(Stev.)Betsche - В. вздутая = I(М); II(Кизл); III(СКТ); IV(БН):
(Понтич.); Db,Rb(T); [R.]
1939. *V. rimosa* Bast. - В. щелистая = I(М); II(Кизл); III(СКТ); IV(БН):
(Субсредиз*.); Pa,Ra,Rb(T); [R.]
1940. *V. pumila*(L.)DC. - В. маленькая = II(ВП); III(ТС); IV(БН):
(Зап.др.средиз.); ST,Db,Rb(T); [Sp.]
1941. *V. lasiocarpa*(Stev.)Betsche - В. пушистоплодная = III(СКТ): (Субпонт*.);
Da(T); [R.]
1942. *V. coronata*(L.)DC. - В. увенчанная = I(М); II(Кизл); III(СКТ):
(Зап.др.средиз.); ST,Rb(T); [Sp.]
1943. *Pseudobetschea caucasica*(Boiss.)Lincz. – Псевдобеткеа кавказская =
III(BC - Шаро-Аргун): (Эукавк.); Pc,Do(T); [Sp.] <Esub>
Сем. 145. DIPSACACEAE Juss. - ВОРСЯНКОВЫЕ
1944. *Knautia arvensis*(L.)Coult. - Короставник полевой = I(М); II(Кизл);
III(СКТ): (Евро-Сиб.); Pa(НК); [Pl.] <Pm>
1945. *K. montana*(Vieb.)DC. - К. горный = III(СКТ,Тер): (Кавк.); S,Pa(НК:pb);
[Sp.]
1946. *K. involucrata* Somm.et Levier - К. крупнообёртковый = III(Тер): (Кавк.);
Pb(НК:pb); [Sp.]
1947. *Dipsacus laciniatus* L. - Ворсянка разрезная = III(СКТ,Тер):
(Зап.др.средиз.); S,Pa,Aa(НК) [Sp.] <Po>
1948. *D. gmelinii* Vieb. - В. Гмелина = II(КН): (Субтуран*.); Aa(НК:pb); [R.]
<Po>
1949. *D. pilosus* L. - В. волосистая = III(СКТ): (Евро-Кавк.); S,Pa(НК); [Sp.]
1950. *D. strigosus* Willd.ex Roem.et Schult. - В. щетинистая = I(М); II(Кизл);
III(СКТ): (Субпонт*.); S,Aa(НК); [Sp.] <Po>
1951. *Cephalaria transsylvanica*(L.)Schrad.ex Roem.et Schult. - Головчатка
трансильванская = II(ВП); III(ТС): (Субпонт*.); Pa(T); [Sp.]
1952. *C. gigantea*(Ledeb.)Vobr. - Г. гигантская = III(Тер): (Кавк.); Pb(НК); [Pl.]
1953. *C. microdonta* Vobr. - Г. мелкозубцовая = III(СКТ); IV(БН): (Кавк.);
Pa(T); [R.]
1954. *C. velutina* Vobr. – Г. бархатистая = III(BC): (Кавк.); ST(НК); [R.]
1955. *C. media* Litv. – Г. средняя = III(BC): (Кавк.); Da,Db(НК); [Sp.]
1956. *Scabiosa ucranica* L. - Скабиоза украинская = I(М); II(ВП); III(СКТ):
(Понтич.); Db(НК:pb); [Pl.] <Pmel>
1957. *S. ochroleuca* L. - С. бледно-жёлтая = I(М); II(ВП); III(СКТ): (Понт.-
Южносиб.); ST(НК); [Sp.] <Pmel>
1958. *S. bipinnata* C.Koch - С. дваждыперистая = III(СКТ): (Кавк.); Pa(НК);
[Pl.] <Pmel>
1959. *S. caucasica* Vieb. - С. кавказская = III(Тер): (Кавк.); Pb(НК); [Sp.]
<Po;Pmel>
1960. *S. rotata* Vieb. - С. колесовидная = III(СКТ,Ч): (Армено-Иран.); ST(T);
[Rs.] <Pmel> <Rx>

1961. *S. micrantha* Desf. - С. мелкоцветковая =IV(БН): (Армено-Иран.); ST(T); [R.] <Pmel> <Rx>
Сем. 146. CUCURBITACEAE Juss. - ТЫКВЕННЫЕ
1962. *Bryonia alba* L. - Переступень белый = I(M); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); Rb(K:lh) [Sp.]; <Pm;Pt>
1963. *B. dioica* Jacq. - П. двудомный = I(M); II(ВП): (Палеаркт.); Rb(K:lh); [R.] <Pm;Pt>
1964. *Ecballium elaterium*(L.)A.Rich. - Бешеный огурец обыкновенный = I(M); II(Кизл): (Зап.др.средиз.); Rb(НК); [R.] <Pm>
Сем. 147. CAMPANULACEAE Juss. - КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ
1965. *Campanula trautvetteri* Grossh.ex Fed. - Колокольчик Траутфеттера = III(СКТ,Тер): (Кавк.); Pa(НК); [Pl.]
1966. *C. latifolia* L. - К. широколистный = III(Тер): (Европ.); S,Pb(НК); [Sp.] <Po>
1967. *C. rapunculoides* L. - К. рапунцелевидный = III(Тер): (Евро-Сиб.); S,Pa(НК); [Pl.]
1968. *C. grossheimii* Charadze – К. Гроссгейма = III(Тер): (Эукавк.); Pb(НК); [R.]
1969. *C. bononiensis* L. - К. болонский = III(СКТ); IV(БН): (Евро-Сиб.); S(НК); [Sp.]
1970. *C. elatior*(Fomin)Grossh. (*C. praealta Galushko*) – К. высокий = Все районы: (Понтич.); Pa(НК); [Pl.]
1971. *C. taurica* Juz. - К. крымский = I(M); III(СКТ): (Понтич.); Db(НК); [Sp.]
1972. *C. hohenackeri* Fisch. et C.A.Meу. – К. Гогенакера = III(Тер): (Кавк.); Pb(НК); [Pl.]
1973. *C. fedorovii* Charadze – К. Фёдорова = III(Ч): (Эукавк.); ST(НК); [R.] <Esub>
1974. *C. darialica* Charadze – К. дарьяльский = III(BC): (Эукавк.); Pb,Do(НК); [Sp.] <Esub>
1975. *C. charadzeae* Grossh. – К. Харадзе = III(BC): (Эукавк.); Pb,Do(НК); [Sp.] <Esub>
1976. *C. daghestanica* Fomin – К. дагестанский = III(Ч): (Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Esub>
1977. *C. caucasica* Vieb. – К. кавказский = IV(BC): (Эукавк.); Pc,Do(НК); [Sp.]
1978. *C. alliariifolia* Willd. (*C. ochroleuca Kem.-Nath.*) - К. чесночницелистный = III(Тер): (Субкавк*.); Da(НК); [Sp.]
1979. *C. sarmatica* Ker-Gawl. (*C. siegismundii Fed.*) - К. сарматский = III(Тер): (Эукавк.); Db(НК); [Sp.]
1980. *C. collina* Vieb. – К. холмовой = III(Тер): (Кавк.); Pb,Pc(НК); [Pl.]
1981. *C. annae* Kolak. – К. Анны = III(BC): (Эукавк.); Pb,Do(НК); [Sp.] <Esub>
1982. *C. andina* Rupr. – К. андийский = III(Тер): (Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Esub>
1983. *C. petrophila* Rupr. – К. скальный = III(BC): (Эукавк.); Pc,Do(НК); [Sp.] <EsubE>

1984. *C. argunensis* Rupr. – К. аргунский = III(Тер): (Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Esub>
1985. *C. meyeriana* Rupr. – К. Мейера = III(BC): (Эукавк.); Pc,Do(НК); [Pl.] <Esub>
1986. *C. biebersteiniana* Schult. (*C. tridentata* Schreb.) – К. Биберштейна = III(Тер): (Кавк.); Pc(НК); [Pl.]
1987. *C. ciliata* Stev. – К. реснитчатый = III(BC): (Кавк.); Pb,Pc(НК); [Pl.]
1988. *C. rapunculus* L. - К. рапунцель = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Европ.); S,Rb(НК:pb); [R.]
1989. *C. lambertiana* A.DC. - К. Ламберта = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Субкавк*.); S,Pa(НК); [R.]
1990. *C. stevenii* Bieb. - К. Стевена = III(Тер): (Субкавк*.); Pb(НК); [R.]
1991. *Gadellia lactiflora*(Bieb.)Schulkinina (*Campanula lactiflora* Bieb.) – Гаделия молочницевая = III(Ч): (Кавк.); Pb(НК); [Pl.]
1992. *Symphyandra pendula*(Bieb.)A.DC. (*Campanula pendula* Bieb.) - Зимфиандра повислая = III(Тер): (Эукавк.); Da(НК); [Pl.] <Rt>
1993. *Asyneuma campanuloides*(Bieb.ex Sims)Bornm. - Азинеума колокольчиковая = III(Тер): (Кавк.); Pb(НК); [Sp.]
Сем. 148. ASTERACEAE Dumort. - АСТРОВЫЕ(СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ)
1994. *Eupatorium cannabinum* L. - Посконник коноплевидный = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.] <Pm.>
1995. *Solidago virgaurea* L. - Золотая розга обыкновенная = III(Тер): (Евро-Сиб.); Pa(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>
1996. *S. caucasica* Kem.-Nath. – З.р. кавказская = III(BC): (Кавк.); Pb,Pc(НК); [R.]
1997. *Bellis perennis* L. – Маргаритка многолетняя = III(BC - Ведено): (Европ.); Pb(НК); [Sp.] <Rg>
1998. *Aster bessarabicus* Bernh.ex Reichenb. (*A. amelloides* Bess.) - Астра ложноитальянская = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Понтич.); Pa,ST(НК); [Pl.]
1999. *A. alpinus* L. - А. альпийская = III(Тер): (Панбор.); Pb(НК); [Sp.] <Po>
2000. *A. ibericus* Stev. – А. грузинская = III(Тер): (Субкавк*.); Pa(НК); [Pl.]
2001. *Galatella dracunculoides*(Lam.)Nees - Солонечник эстрагоновидный = Все районы: (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.]
2002. *G. pastuchovii*(Kem.-Nath.)Tzvel. - С. Пастухова = II(ВП); IV(БН): (Понтич.); Db,Dc(НК); [Sp.]
2003. *Crinitaria villosa*(L.)Grossh. (*Galatella villosa*(L.)Reichenb) - Грудница мохнатая = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.] <Pm>
2004. *C. linosyris* (L.)Less. (*G. linosyris* (L.)Reichenb.) - Г. обыкновенная = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.]
2005. *Tripolium vulgare* Nees - Триполиум обыкновенный = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Голаркт.); Aa(НК:pb); [Sp.] <Pm;Pp>
2006. *Erigeron orientalis* Boiss. - Мелколепестник восточный = III(СКТ,Тер): (Субкавк*.); ST(НК); [Pl.]

2007. *E. acris* L. (*E. acer auct.*) - М. едкий = Все районы: (Голаркт.);
Pa(НК:pb); [Sp.] <Pm>
2008. *E. venustus* Botsch. - М. приятный = III(Тер): (Кавк.); Pb, Pc(НК); [Pl.]
2009. *E. alpinus* L. - М. альпийский = III(Тер): (Евро-Кавк.); Pc, Do(НК); [Pl.]
2010. *E. uniflorus* L. - М. однокорзинковый = III(BC): (Голаркт.); Pc, Do(НК);
[Sp.]
2011. *E. caucasicus* Stev. - М. кавказский = III(Тер): (Кавк.); Pb(НК); [Sp.]
2012. *E. pseudoelongatus* Botsch. - М. ложноудлинённый = III(BC): (Кавк.);
Pb, Pc(НК); [Sp.]
2013. *E. podolicus* Bess. - М. подольский = III(Тер): (Палеаркт.); Pb(НК);
[Sp.]
2014. *Conyza canadensis*(L.)Cronq. (*Erigeron canadensis* L.) - Кониза канадская
= Все районы: (Адвент.[Сев.Америка]); Ra, Rb(T); [Pl.] <Pm>
2015. *Phalacrolooma annuum*(L.)Dumort. (*Erigeron annuus* (L.)Pers., *Stenactis*
annua(L.)Cass.) - Тонколучник однолетний = III(СКТ); IV(БН):
(Адвент.[Сев. Америка]); S, Pa, Rb(T); [Pl.]
2016. *Bombusilaena erecta*(L.)Smoljjan - Бомбицилена прямостоячая = I(M);
III(ТС); IV(БН): (Зап.др.средиз.); ST(T); [R.]
2017. *Filago vulgaris* Lam. (*F. germanica* L.) - Жабник обыкновенный = I(M);
II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Зап.др.средиз.); Da, Db(T); [R.]
2018. *F. erioccephala* Guss. - Ж. шерстистоголовый = I(M); II(ВП); III(СКТ);
IV(БН): (Зап.др.средиз.); Db(T); [R.]
2019. *F. arvensis* L. - Ж. полевой = I(M); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.);
ST(T); [Pl.] <Pm>
2020. *Antennaria caucasica* Boriss. (*A. dioica auct. fl. cauc.*) - Кошачья лапка
кавказская = III(Тер): (Кавк.); Pb, Pc(НК); [Pl.]
2021. *Omalotheca sylvatica*(L.)Sch.Bip.et F.Schultz (*Gnaphalium sylvaticum* L.) -
Омалотека лесная = III(Тер): (Голаркт.); S(НК); [R.]
2022. *O. supina*(L.)DC. (*G. supinum* L.) - О. приземистая = III(Тер):
(Палеаркт.); Pc, Do(НК); [Pl.]
2023. *Helichrysum arenarium*(L.)Moench - Бессмертник песчаный = I(M);
II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); Db(НК); [Sp.] <Pm>
2024. ★*Cladochaeta candidissima*(Vieb.)DC. - Кладохета белейшая = III(Тер):
(Эукавк.); Da, Do(НК); [Sp.]
2025. *Inula helenium* L. - Девясил высокий = Все районы: (Палеаркт.);
Pa, Aa(НК); [Pl.] <Pm>
2026. *I. orientalis* Lam. - Д. восточный = III(Тер): (Кавк.); Pb(НК); [Sp.]
2027. *I. hirta* L. - Д. жёстковолосистый = I(M): (Палеаркт.); ST(НК); [Sp.]
2028. *I. ensifolia* L. - Д. мечелистный = I(M); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Евро-
Кавк.); ST(НК); [Pl.]
2029. *I. germanica* L. - Д. германский = I(M); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Евро-
Кавк.); ST(НК); [Sp.]
2030. *I. aspera* Poir. - Д. шероховатый = Все районы: (Понт.-Южносиб.);
Pa(НК); [Pl.]
2031. *I. salicina* L. - Д. ивовый = I(M); III(СКТ): (Палеаркт.); ST(НК); [Sp.]

2032. *I. caspica* Blum ex Ledeb. - Д. каспийский = II(ВП - Терек, Сулак):
(Туранск.); Dc(НК:pb); [Sp.]
2033. *I. oculus-christi* L. - Д. христово око = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН):
(Зап.др.средиз.); ST(НК); [Sp.]
2034. *I. britannica* L. - Д. британский = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН):
(Палеаркт.); Aa(НК); [Pl.] <Pm>
2035. *I. conyza* DC. (*I. vulgaris* Trevis.) - Д. обыкновенный = III(Тер):
(Понтич.); ST(НК); [Sp.]
2036. *I. thapsoides*(Bieb.)Spreng. - Д. коровяковый = III(Ч); (Армено-Иран.);
Pa(НК); [Sp.]
2037. *I. magnifica* Lipsky - Д. великолепный = III(ЧО): (Кавк.); S(НК); [R.]
2038. *I. grandiflora* Willd. - Д. крупноцветковый = III(Тер): (Кавк.);
Pb, Pc(НК); [R.]
2039. *Pulicaria vulgaris* Gaertn. (*P. prostrata*(Gilib.)Aschers. nom. illegit.) -
Блошница обыкновенная = Все районы: (Палеаркт.); Aa(T); [Sp.] <Pm>
2040. *P. dysenterica*(L.)Bernh. (*P. uliginosa* Stev.ex DC.) - Б. топяная = I(М);
II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Общедр.средиз.); Aa(НК); [Sp.]
2041. *Telekia speciosa*(Schreb.)Baumg. - Телекия видная = III(ЧО,Тер): (Евро-
Кавк.); S(НК); [Sp.] <Po>
2042. *Ambrosia artemisifolia* L. - Амброзия полыннолистная = I(М); II(ВП);
III(СКТ); IV(БН): (Адвент. [Сев.Америка]); Ra,Rb(T); [Pl.]
2043. *Xanthium strumarium* L. - Дурнишник зобовидный = I(М); II(ВП);
III(СКТ); IV(БН): (Адвент.[Сев.Америка]); Rb(T); [Pl.] <Pm>
2044. *X. spinosum* L. - Д. колючий = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН):
(Адвент.[Сев.Америка]); Rb(T); [Pl.] <Pm>
2045. *Sigesbeckia orientalis* L. - Сигезбекия восточная = III(ЧО):
(Адвент.[Юго-Вост.Азия]); Rb(T); [Sp.]
2046. *Bidens tripartita* L. - Череда трёхраздельная = I(М); II(ВП); III(СКТ);
IV(БН): (Плюрирег.); Aa,Rb(T); [Pl.] <Pm>
2047. *Galinsoga parviflora* Cav. - Галинсога мелкоцветковая I(М); II(ВП);
III(СКТ); IV(БН): (Адвент.[Южн.Америка]); Rb(T); [Pl.]
2048. *G. ciliata*(Rafin.)Blake (*G. quadriradiata* auct.) - Г. реснитчатая = III(ЧО):
(Адвент.[Южн.Америка]); Rb(T); [R.]
2049. *Anthemis sosnovskyana* Fed. - Пупавка Сосновского = III(Тер): (Кавк.);
Da(НК); [Sp.]
2050. *A. ruthenica* Bieb. - П. русская = I(М); II(ВП); III(ТС); IV(БН): (Понтич.);
ST,Db,Dd(НК); [Pl.]
2051. *A. subtinctoria* Dobrocz. (*A. tinctoria* L.) - П. кровельная = III(ТС);
IV(БН): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Sp.]
2052. *A. rigescens* Willd. - П. жёсткая = III(Тер): (Субкавк*.); Pb(НК); [Pl.]
2053. *A. dumetorum* Sosn. - П. кустарниковая = III(СКТ); IV(БН): (Кавк.);
Pa(НК); [Sp.]
2054. *A. altissima* L. - П. высочайшая = III(ЧО); IV(БН): (Субкавк*.); Rb(T);
[R.]
2055. *A. cotula* L. - П. собачья = III(СКТ); IV(БН): (Евро-Кавк.); Rb(T); [Pl.]

2056. *A. marschalliana* Willd. – П. Маршалла = III(Тер): (Кавк.); Pb, Pc, Do(НК); [Pl.]
2057. *A. macroglossa* Somm. et Levier – П. крупноязычковая = III(Ч): (Эукавк.); Pb, Pc(НК); [Sp.]
2058. *A. iberica* Vieb. – П. грузинская = III(BC): (Кавк.); Pc, Do(НК); [Pl.]
2059. *A. fruticulosa* Vieb. – П. кустарничковая = III(BC): (Эукавк.); Pb, Do(Ch:fl); [Sp.]
2060. *Achillea nobilis* L. - Деревей благородный = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.] <Pm>
2061. *A. millefolium* L. - Д. тысячелистник = Все районы: (Евро-Сиб.); ST(НК); [Pl.] <Pm>
2062. *A. setacea* Waldst. et Kit. - Д. щетинистый = Все районы:(Палеаркт.); Pa, ST(НК); [Sp.] <Pm>
2063. *A. leptophylla* Vieb. - Д. тонколистный = I(М); II(ВП): (Понтич.); ST(НК); [R.]
2064. *A. micrantha* Willd. (*A. gerberi* Willd.) - Д. мелкоцветковый = II(ВП); III(ТС); IV(БН): (Понт.-Южносиб.); Db(НК); [Sp.] <Pm>
2065. *A. biebersteinii* Afan. - Д. Биберштейна = I(М); II(КН); III(СКТ); IV(БН): (Вост.др.средиз.); ST, Da, Dd(НК); [Pl.]
2066. *Ptarmica ptarmicifolia*(Willd.)Galushko (*A. ptarmicifolia*(Willd.)Rupr. ex Heimerl) – Чихотник птармиколистный = III(BC): (Эукавк.); Pb, Do(НК); [Sp.]
2067. *P. biserrata*(Vieb.)DC. (*A. biserrata* Vieb.) – П. дважды-пильчатая = III(BC): (Кавк.); S, Pb(НК); [Sp.]
2068. *Leucanthemum vulgare* Lam. - Нивянка обыкновенная = III(СКТ, Тер): (Евро-Сиб.); Pa, S(НК); [Pl.] <Pm; Po>
2069. *Matricaria recutita* L. (*Chamomilla recutita*(L.)Rauschert; *Matricaria chamomilla* L.) - Ромашка лекарственная = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Голаркт.); Rb(T); [Pl.] <Pm>
2070. *Lepidotheca suaveolens*(Purch)Nutt. (*Matricaria suaveolens*(Pursh) Buschenau; *M. discoidea* DC.; *Chamomilla discoidea*(DC.)J. Gay ex A.Br.) – Лепидотека пахучая = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Панбор.); Rb(T); [Pl.] <Pm>
2071. *Tripleurospermum perforatum*(Merat)M. Lainz (*Matricaria perforata* Merat; *Tripleurospermum inodorum*(L.)Sch. Bip. nom. illegit.) - Ромашник пронзённый = Все районы: (Палеаркт.); Rb(T); [Sp.]
2072. *T. parviflorum*(Willd.)Pobed. (*M. parviflora*(Willd.)Poir.) - P. мелкоцветковый = II(ВП): (Армено-Иран.); ST(T); [R.]
2073. *T. caucasicum*(Willd.)Hayek (*T. subnivale* Pobed., *M. subnivalis*(Pobed.) Rauschert) – P. кавказский = III(Тер): (Кавк.); Pb, Pc, Do(НК); [Pl.]
2074. *Pyrethrum parthenifolium* Willd. - Пиретрум девичьелистный = II(Кизл); III(СКТ, Тер): (Общедр.средиз.); S, Da(НК); [Pl.] <Pm>
2075. *P. demetrii* Manden. – П. Дмитрия = III(BC): (Эукавк.); Do(НК); [Pl.]
2076. *P. coccineum*(Willd.)Worosch. (*P. roseum*(Adams)Vieb.) - П. розовый = III(Тер): (Субкавк*.); Pb(НК); [Sp.] <Pt; Po>

2077. *P. corymbosum*(L.)Scop. - П. щитковый = III(СКТ,Тер): (Европ.); Pa(НК); [Sp.]
2078. *P. dolomiticum* Galushko – П. доломитный = III(Ч): (Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Esub>
2079. *P. daghestanicum*(Rupr. ex Boiss.)Fler. (*P. aromaticum* Tzvel.) – П. дагестанский = III(BC): (Эукавк.); Pc,Do(НК): [Pl.] <EsubE>
2080. *P. silaifolium* Stev. – П. морковниколистный = III(BC): (Эукавк.); Pb,Do(НК); [Sp.]
2081. *P. glanduliferum* Somm. et Levier – П. железконосный = III(BC): (Эукавк.); Pb,Pc,Do(НК); [Sp.]
2082. *P. fruticosum* Biehl. (*P. niveum*. Lag.) – П. кустарничковый = III(Ч); IV(Даг): (Эукавк.); Pb,Do(НК); [Sp.]
2083. *Tanacetum vulgare* L. - Пижма обыкновенная = Все районы: (Голаркт.); Pa,Rb(НК); [Sp.] <Pm>
2084. *T. millefolium*(L.)Tzvel. (*Pyrethrum millefolium*(L.)Willd.) - П. тысячелистная = III(ТС); IV(БН): (Понт.-Южносиб.); ST,Da(НК); [Sp.]
2085. *T. achilleifolium*(Bieb.)Sch.Bip. (*P. achilleifolium* Bieb.) - П. деревеелистная = I(М); II(ВП); III(ТС); IV(БН): (Понт.-Южносиб.); ST,Dc(НК); [Pl.]
2086. *Artemisia vulgaris* L. - Полынь обыкновенная (Чернобыльник) = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Голаркт.); Rb(НК); [Pl.] <Pm>
2087. *A. abrotanum* L. (*Artemisia procera* Willd.; *A. elatior* Klok.) - П. рослая = II(ВП): (Понт.-Южносиб.); Db(Ch:sf); [R.]
2088. *A. chamaemelifolia* Vill. - П. ромашколистная = III(Тер): (Субкавк*.); Da(Ch:sf); [Sp.]
2089. *A. annua* L. - П. однолетняя = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); Rb(T); [R.] <Pm>
2090. *A. austriaca* Jacq. - П. австрийская = Все районы: (Понт.-Южносиб.); Db,Dd,Dc(НК); [Pl.]
2091. *A. absinthium* L. - П. горькая = Все районы: (Палеаркт.); Rb(НК); [Pl.] <Pm>
2092. *A. campestris* L. - П. полевая = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Голаркт.); ST(НК); [Sp.]
2093. *A. scoraria* Waldst.et Kit. - П. метельчатая(веничная) = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); ST(T); [Pl.]
2094. *A. marschalliana* Spreng. (*A. sosnovskyi* Krasch. ex Novopokr.) - П. Маршалла = IV(БН): (Палеаркт.); ST(НК); [Sp.]
2095. *A. tschernieviana* Bess. - П. Черняева = I(М); II(ВП); III(ТС): (Понтич.); Db(Ch:sf); [Pl.]
2096. *A. lerchiana* Web.ex Stechm. (*A. fragrans* Willd.) - П. Лерхе = II(ВП): (Понт.-Южносиб.); ST,Dd(Ch:sf); [Pl.]
2097. *A. taurica* Willd. - П. крымская = I(М); II(ВП): (Понтич.); Dc,Dd(НК); [Pl.] <Pm;Pp>
2098. *A. santonica* L. - П. сантонинная = II(Кизл): (Туранск.); Dc(НК); [R.] <Pm>

2099. *A. daghestanica* Krasch. et A.Poretzky – П. дагестанская = III(Ч – Таргимская котловина): (Эукавк.); ST(НК); [Sp.]
2100. *A. splendens* Willd. – П. блестящая = III(BC): (Эукавк.); Pb, Pc, Do(НК); [Sp.]
2101. *Tussilago farfara* L. - Мать-и-мачеха обыкновенная = Все районы: (Палеаркт.); Dd(НК); [Pl.] <Pm>
2102. *Petasites hybridus*(L.)Gaertn., Mey. et Schreb. - Белокопытник гибридный = III(СКТ); IV(БН): (Евро-Кавк.); S, Aa(НК); [Pl.] <Pm>
2103. *P. albus*(L.)Gaertn. - Б. белый = III(СКТ); IV(БН): (Евро-Кавк.); S, Aa(НК); [Pl.]
2104. *Doronicum macrophyllum* Fisch. ex Hornem. - Дороникум крупнолистный = III(Тер): (Субкавк*.); Pb(НК); [Sp.]
2105. *D. oblongifolium* DC. – Д. продолговатолистный = III(Тер): (Палеаркт.); Pb(НК); [Pl.]
2106. *Senecio vulgaris* L. - Крестовник обыкновенный = III(СКТ): (Палеаркт.); Rb(T); [Sp.] <Pm>
2107. *S. viscosus* L. - К. липкий = III(BC): (Евро-Кавк.); Rb(T); [R.]
2108. *S. vernalis* Waldst. et Kit. - К. весенний = Все районы: (Палеаркт.); Rb(T); [Pl.]
2109. *S. poeanus* Rupr. - К. Ноя = I(M); II(ВП): (Ирано-Туран.); Dc(T); [Sp.]
2110. *S. jacobaea* L. - К. Якова = Все районы: (Палеаркт.); ST, Rb(T); [Sp.]
2111. *S. erucifolius* L. - К. эруколистный = I(M); II(ВП); III(СКТ): (Палеаркт.); Pa, Aa(НК); [Sp.]
2112. *S. schischkinianus* Sof. - К. Шишкина = II(КН): (Эукавк.); Dc(НК); [Sp.]
2113. *S. macrophyllum* Vieb. - К. крупнолистный = I(M – Терек); III(ЧО): (Эукавк.); S(НК); [Sp.] I.с. Терек и Кума
2114. *S. propinguus* Schischk. - К. близкий = III(Тер): (Кавк.); S, Pa(НК); [Sp.]
2115. *S. racemosus*(Vieb.)DC. – К. кистевой = III(BC): (Эукавк.); Pb, Pc(НК); [Sp.]
2116. *S. kolenatianus* C.A.Mey. – К. Коленати = III(BC): (Эукавк.); Pb, Pc(НК); [R.]
2117. *S. calvertii* Boiss. – К. Кальверта = III(BC): (Эукавк.); ST, Da(T); [Sp.]
2118. *S. sosnovskyi* Sof. – К. Сосновского = III(BC): (Эукавк.); Pc, Do(НК); [Pl.]
2119. *S. taraxacifolius*(Vieb.)DC. – К. одуванчиколистный = III(BC): (Эукавк.); Pb, Pc, Do(НК); [Pl.]
2120. *Tephroses subfloccosus*(Schischk.)Czer. (*Senecio subfloccosus* Schischk.) - Тэфросерис почтикочковатый = III(Тер): (Кавк.); Pb(НК); [Sp.]
2121. *T. caucasigena*(Schischk.)Czer. (*S. caucasigenus* Schischk.) – Т. кавказский = III(Тер): (Эукавк.); Pb, Pc(НК); [Pl.]
2122. *T. karjagini*(Sof.)Golub (*S. karjagini* Sof.) – Т. Карягина = III(BC): (Эукавк.); Pb, Pc, Do(НК); [Pl.]
2123. *T. cladobotrys*(Ledeb.)Griseb. et Schenk (*S. cladobotrys* Ledeb.) – Т. ветвистый = III(Ч): (Эукавк.); S, Pb(НК); [Sp.]

2124. *Dolichorrhiza caucasica*(Bieb.)Galushko (*Ligularia caucasica*(Bieb.)G.Don fil.) – Долихориза кавказская = III(Тер): (Кавк.); Pb,Рс(НК); [Sp.]
2125. *D. renifolia*(С.А.Мей.)Galushko (*L. renifolia*(С.А.Мей.)DC.) – Д. почколистная = III(Тер): (Эукавк.); S,Pb,Рс(НК); [Pl.]
2126. *Ligularia subsagittata* Pojark. – Бузульник полустреловидный = III(Тер): (Субкавк*.); Pb,Рс,Аа(НК); [Pl.]
2127. *Echinops sphaerocephalus* L. - Мордовник шароголовый = I(М); II(ВП); III(СКТ,Тер); IV(БН): (Понт.-Южносиб.); Ра(НК); [Sp.] <Pm;Pmel>
2128. *Xeranthemum annuum* L. - Сухоцвет однолетний = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Субпонт*.); ST(Т); [Pl.] <Ро;Pm>
2129. *X. cylindraceum* Sibth.et Smith. - С. цилиндрический = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Зап.др.средиз.); ST(Т); [Sp.] <Ро>
2130. *X. squarrosum* Boiss. – С. растопыренный = IV(БН): (Субтуран*.); ST,Da(Т); [Sp.]
2131. *Carlina vulgaris* L. (*C. biebersteiniana* Bernh. ex Hornem.) - Колючник обыкновенный = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Евро-Кавк.); ST(НК:pb); [Pl.]
2132. *Arctium lappa* L. - Лопух репейник = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); Rb(НК:pb); [R.] <Pm;Pmel>
2133. *A. nemorosum* Lej. - Л. дубравный = III(Ч): (Европ.); S,Rb(НК:pb); [Sp.] <Rg;Pmel>
2134. *A. palladinii*(Marc.)Grossh. - Л. Палладина = I(М); III(ЧО,Ч): (Кавк.); S,Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm;Pmel>
2135. *Jurinea cyanooides*(L.)Reichenb. - Наголоватка васильковая = I(КН): (Понт.-Южносиб.); Dd(НК); [R.]
2136. *J. polyclonos*(L.)DC. (*J. amplexicaulis*(S.G.Gmel.)Vobr.) - Н. многостебельная = I(М); II(ВП): (Понт.-Южносиб.); Db(НК); [Sp.]
2137. *J. multiflora*(L.)Bieb. - Н. многоцветковая = II(ВП); III(ТС): (Понт.-Южносиб.); Db,Dc,Dd(НК); [Pl.]
2138. *J. arachnoidea* Bunge - Н. паутинистая = Все районы: (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.]
2139. *J. ciscaucasica*(Sosn.)Iljin - Н. предкавказская = I(М); III(ЧО); IV(БН): (Предкавк.); Db(НК); [Sp.]
2140. *J. annae* Sosn. – Н. Анны = III(Ч – г. Хахалги): (Эукавк.); Da(НК); [R.] <Esub>
2141. *J. filicifolia* Boiss. – Н. папоротниколистная = III(BC): (Эукавк.); Рс,Do(НК); [Sp.] <Esub>
2142. *J. ingushetica* Galushko – Н. ингушская = III(Ч – хребет Цорей-лам): (Эукавк.); Da(НК); [Rs.] <Esub>
2143. *Jurinea moschus*(Habl.)Vobr. – Наголоваточка мускусная = III(BC): (Эукавк.); Рс,Do(НК); [Sp.]
2144. *J. subacaulis*(Fisch. et С.А.Мей.)Iljin – Н. бесстебельная = III(Тер): (Субкавк*.); Рс,Do(НК); [Pl.]
2145. *Carduus nutans* L. - Чертополох поникающий = Все районы: (Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm;Pmel>

2146. *C. acanthoides* L. - Ч. колючий = Все районы: (Евро-Кавк.); Rb(НК:pb); [Sp.] <Pmel>
2147. *C. crispus* L. - Ч. курчавый = Все районы: (Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Sp.] <Pmel>
2148. *C. hamulosus* Ehrh. - Ч. крючочковый = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Субпонт*.); ST(НК:pb); [Sp.] <Pmel>
2149. *C. uncinatus* Vieb. - Ч. крючковатый = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Субпонт*.); Rb(НК:pb); [Sp.] <Pmel>
2150. *C. pseudocollinus*(Schmalh.)Klok. - Ч. ложнохолмовой = III(ЧО); IV(БН): (Понтич.); ST(НК:pb); [R.] <Pmel>
2151. *C. seminudus* Vieb. - Ч. почтиголый = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Субкавк*.); ST(НК:pb); [Sp.] <Pmel>
2152. *C. laciniatus* Ledeb. (*C. multijugus* *C. Koch*) - Ч. рассечённый = III(Ч): (Кавк.); S,Pa(НК:pb); [Sp.] <Pmel>
2153. *C. albidus* Vieb. - Ч. беловатый = II(Кизл); IV(БН): (Ирано-Туран.); Rb(T); [R.] <Pmel>
2154. *C. cinereus* Vieb. - Ч. сероватый = II(Кизл); IV(БН): (Ирано-Туран.); Rb(T); [R.] <Pmel>
2155. *C. acanthocephalus* C.A.Meу. - Ч. колючеголовый = III(BC): (Кавк.); Pb,Рс(НК); [R.]
2156. *C. adpressus* C.A.Meу. - Ч. прижатый = III(BC): (Эукавк.); Pb,Рс(НК); [Sp.]
2157. *Cirsium vulgare*(Savi)Ten. - Бодяк обыкновенный = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm;Pmel>
2158. *C. ciliatum*(Murr.)Moench - Б. реснитчатый = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Понт.-Южносиб.); S,Pa(НК); [Sp.] <Pmel>
2159. *C. canum*(L.)All. (*C. biebersteinii* *Charadze*) - Б. серый = III(СКТ,Тер): (Европ.); S,Pa(НК); [Sp.] <Pmel>
2160. *C. incanum*(S.G.Gmel.)Fisch. - Б. седой = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Понт.-Южносиб.); Rb(НК); [Sp.] <Pmel>
2161. *C. arvense*(L.)Scop. - Б. полевой = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Евро-Сиб.); Rb(НК); [Sp.] <Pm;Pmel>
2162. *C. elodes* Vieb. - Б. болотолюбивый = I(М); II(ВП); III(ЧО): (Субкавк*.); Rb(НК); [R.] <Pmel>
2163. *C. arachnoideum*(Vieb.)Bess. - Б. паутинистый = III(Ч): (Эукавк.); Pa(НК); [Sp.] <Pmel>
2164. *C. rhizocephalum* C.A.Meу. - Б. корнеголовый = III(Тер): (Субкавк*.); Pb,Рс,Do(НК); [Pl.]
2165. *C. obvallatum*(Vieb.)Fisch. - Б. окутанный = III(Тер): (Кавк.); Pb(НК); [Pl.]
2166. *C. simplex* C.A.Meу. - Б. простой = III(Тер): (Кавк.); Pb,Рс,Аа(НК); [Pl.]
2167. *C. hydrophiloides* *Charadze* - Б. болотистый = III(Тер): (Эукавк.); Pb,Аа(НК); [Sp.] <Esub>
2168. *C. pugnaх* *Somm. et Levier* - Б. воинственный = III(BC): (Кавк.); Pb,Рс(НК); [Pl.]

2169. *C. osseticum*(Adams)Petrač – Б. осетинский = III(BC): (Кавк.); Pb(НК); [Sp.]
2170. *C. balkharicum* Charadze – Б. балкарский = III(BC): (Эукавк.); Pb(НК); [Sp.]
2171. *C. tomentosum* C.A.Mey. – Б. войлочный = III(BC): (Субкавк*.); Pc,Do(НК); [Sp.]
2172. *C. sinuatum*(Trautv.)Boiss. – III(BC): (Эукавк.); Pb,Do(НК); [Sp.]
2173. *C. echinus*(Bieb.)Hand.-Mazz. – Б. игольчатый = III(СКТ,Тер): (Кавк.); Pb,Rb(НК); [Sp.]
2174. *Picnomon acarna*(L.)Cass. - Пикномон колючий = III(СКТ); (БН: (Общедр.средиз.); Rb(НК:pb); [Sp.]
2175. *Silybum marianum*(L.)Gaertn. - Расторопша пятнистая = IV(БН): (Палеаркт.); Rb(НК:pb); [R.] <Pm>
2176. *Oporordum acanthium* L. - Татарник колючий = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm;Pmel>
2177. *Scrupina vulgaris* Cass. - Крушина обыкновенная = III(ТС); IV(БН): (Субтуран*.); ST,Da(Т); [R.]
2178. *Serratula coronata* L. - Серпуха венценосная = III(СКТ): (Палеаркт.); Pa(НК); [Sp.] <Pm>
2179. *S. erucifolia*(L.)Voriss. - С. эруколистная = I(М); II(ВП): (Субтуран*.); Dc(НК); [R.]
2180. *S. radiata*(Waldst.et Kit.)Bieb. (*S. bracteifolia*(Iljin ex Grossh.) Stank.) - С. лучистая = III(СКТ): (Евро-Кавк.); Pa(НК); [Sp.]
2181. *S. quinquefolia* Bieb.ex Willd. - С. пятилистная = III(СКТ,Тер): (Субкавк*.); S(НК); [Pl.]
2182. *Acroptilon repens*(L.)DC. - Горчак ползучий = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); ST,Ra,Rb(НК); [Sp.] <Pm>
2183. *Aetheopappus caucasicus* Sosn. – Этеопаппус кавказский = III(BC): (Кавк.); Pc,Do(НК); [Sp.]
2184. *Psephellus dealbatus*(Willd.)Boiss. (*Centaurea dealbata* Willd.) - Псефеллус беловатый = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Кавк.); Pa(НК); [Pl.] <Pmel;Po>
2185. *P. absinthifolius* Galushko – П. полыннолистный = III(BC - оз. Кезеной-ам) (Эукавк.); Da(НК): [Pl.] <Esub>
2186. *P. salviifolius* Boiss. (*C. salviifolia*(Boiss.)Sosn) – П. шалфеелистный = III(Тер): (Эукавк.); Da,Do(НК); [Sp.]
2187. *P. andinus* Galushko et Alieva (*C. andina*(Galushko et Alieva)Czer.) – П. андийский = III(BC - оз. Кезеной-ам): (Эукавк.); Pb,Da(НК); [Sp.] <Esub>
2188. *P. hymenolepis*(Trautv.)Boiss. (*C. hymenolepis* Trautv.) – П. плёнчаточешуйчатый = IV(BC): (Эукавк.); Pc,Do(НК); [R.]
2189. *P. prokhanovii* Galushko (*C. prokhanovii*(Galushko)Czer.) – П. Проханова = III(Ч): (Эукавк.); Da(НК); [Sp.] <Esub>
2190. *P. kemulariae* Charadze (*C. kemulariae*(Charadze)Czer.) – П. Кемулярии = III(Ч): (Эукавк.); Pb(НК): [R.] <Esub>

2191. *Centaurea ruthenica* Lam. - Василёк русский = I(M); III(TC):
(Субтуран*.); ST(HK); [R.] <Pmel>
2192. *C. pseudotanaitica* Galushko nomen nudum – В. ложнодонской = III(TC):
(Предкавказ.); Pa,ST(HK); [Sp.] <EsubE>
2193. *C. depressa* Vieb. - В. прижатый = III(ЧО,Ч): (Вост.др.средиз.); Ra,Rb(T);
[R.] <Pmel>
2194. *C. cyanus* L. - В. синий = I(M); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Голаркт.);
Ra,Rb(T); [Sp.] <Pm;Pmel>
2195. *C. abbreviata*(C.Koch)Hand.-Mazz. - В. укороченный = III(СКТ,Тер):
(Субкавказ*.); S,Pa(HK); [Sp.]
2196. *C. trinervia* Steph. - В. трёхжилковый = III(TC): (Понтич.); ST(HK); [Sp.]
2197. *C. orientalis* L. - В. восточный = Все районы: (Понтич.); ST(HK); [Pl.]
2198. *C. apiculata* Ledeb. - В. шипиконосный = III(СКТ): (Субсредиз*.);
Pa,ST(HK); [R.]
2199. *C. adpressa* Ledeb. - В. прижаточешуйчатый = III(СКТ): (Понт.-
Южносиб.); ST(HK); [R.]
2200. *C. diffusa* Lam. - В. раскидистый = I(M); II(ВП); III(СКТ); IV(БН):
(Понтич.); ST,Rb(HK:pb); [Pl.]
2201. *C. solstitialis* L. - В. солнечный = I(M); II(ВП); III(СКТ); IV(БН):
(Ирано-Туран.); ST(HK:pb); [Sp.]
2202. *C. iberica* Trev. ex Spreng. - В. грузинский = I(M); II(ВП); III(СКТ);
IV(БН): (Ирано-Туран.); Rb(HK:pb); [Pl.]
2203. *C. arenaria* Vieb. - В. песчаный = II(ВП): (Туранск.); Dc(HK:pb); [R.]
2204. *C. ovina* Pall. ex Willd. - В. овечий = II(Кизл): (Эукавказ.); Db(HK); [Rs.]
2205. *C. cheiranthifolia* Willd. - В. бледно-жёлтый = III(Тер): (Субкавказ*.);
Pb(HK); [Sp.]
2206. *C. salicifolia* Vieb. - В. иволистный = III(СКТ,Тер): (Субкавказ*.);
S,Pa(HK); [Sp.]
2207. *C. squarrosa* Willd. – В. оттопыренный = III(TC); IV(БН): (Субтуран.*);
ST,Rb(HK:pb); [Sp.]
2208. *C. willdenowii* Czer. – В. Вильденова = III(BC): (Эукавказ.); Pb,Pc(HK);
[R.]
2209. *Carthamus lanatus* L. - Софлор шерстистый = II(Кизл); III(СКТ); IV(БН):
(Общедр.средиз.); Rb(T); [Pl.]
2210. *Cichorium inthabus* L. - Цикорий обыкновенный = I(M); II(ВП);
III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); Pa,Rb(HK); [Pl.] <Pa;Pm;Pmel>
2211. *Lapsana communis* L. - Бородавник обыкновенный = III(СКТ,Тер);
IV(БН): (Палеаркт.); S,Rb(T); [Sp.] <Pm>
2212. *L. intermedia* Vieb. - Б. промежуточный = III(СКТ,Тер); IV(БН):
(Субкавказ*.); S,Rb(HK); [Sp.]
2213. *L. grandiflora* Vieb. - Б. крупноцветковый = III(Тер): (Субкавказ*.); S(HK);
[Pl.]
2214. *Нурочоерис radicata* L. (*Porcellites radicata*(L.)Cass.) - Пазник
стержнекорневой = III(Ч); IV(БН): (Субсредиз*.); Pa(HK); [R.]

2215. *Trommsdorffia maculata*(L.)Bernh. (*Achyrophorus maculatus*(L.)Scop.) - Троммсдорфия крапчатая = III(СКТ): (Евро-Сиб.); S(НК); [Pl.] <Pm>
2216. *Leontodon asperimus*(Willd.)Endl. - Кульбаба шероховатейшая = III(BC): (Армено-Иран.); Da(НК); [R.] <Pmel>
2217. *L. danubialis* Jacq. - К. дунайская = III(СКТ); IV(БН): (Евро-Кавк.); Pa(НК); [Sp.] <Pmel>
2218. *L. hispidus* L. - К. щетинисто-волосистая = III(СКТ); IV(БН): (Евро-Кавк.); Pa(НК); [Pl.] <Pmel;Pp>
2219. *L. caucasicus*(Bieb.)Fisch. – К. кавказская = III(Тер): (Субкавказ*.); Pb, Pc, Do(НК); [Sp.]
2220. *Picris hieracioides* L. - Горлюха ястребинковая = III(СКТ, Тер); IV(БН): (Палеаркт.); ST(НК:pb); [Pl.]
2221. *P. strigosa* Bieb. - Г. щетинистая = III(СКТ); IV(БН): (Зап.др.средиз.); ST(НК:pb); [Sp.]
2222. *P. canescens*(Stev.)V.Vassil. - Г. седоватая = III(ЧО, Ч); IV(БН): (Кавк.); Rb(НК:pb); [Sp.]
2223. *P. pauciflora* Willd. – Г. малоцветковая = III(BC): (Зап.др.средиз.); Pb(T); [R.]
2224. *Garhadiolus ramosus* Boiss. et Buhse - Гаррадиолус хохлатый = II(ВП); III(ТС); IV(БН): (Армено-Иран.); ST, Rb(T); [R.]
2225. *Podospermum canum* C.A.Mey. (*Scorzonera cana*(C.A.Mey.)O.Hoffm.) - Ножкосемянник седой = III(ТС); IV(БН): (Понт.-Южносиб.); Da(НК); [R.]
2226. *P. laciniatum*(L.)DC. (*S. laciniata* L.) - Н. разрезной = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Зап.др.средиз.); ST, Da(НК:pb); [Sp.]
2227. *P. calcitrapifolium*(Vahl)DC. (*S. calcitrapifolia* Vahl) - Н. кальцетраполистный = II(Кизл); IV(БН): (Зап.др.средиз.); Dd(НК:pb); [Sp.]
2228. *P. meyeri* C.Koch (*S. meyeri*(C.Koch)Lipsch.) – Н. Мейера = III(BC): (Палеаркт.); Pc, Do(НК) [Pl.]
2229. *Scorzonera parviflora* Jacq. - Козелец мелкоцветковый = I(М); II(Кизл): (Палеаркт.); Dc(НК:pb); [Sp.]
2230. *S. taurica* Bieb. - К. крымский = II(Кизл); III(СКТ): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Sp.]
2231. *S. stricta* Hornem. - К. торчащий = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Sp.]
2232. *S. mollis* Bieb. - К. мягкий = I(М); III(ТС); IV(БН): (Субпонт*.); ST(НК); [Sp.]
2233. *S. biebersteinii* Lipsch. - К. Биберштейна = II(КН); III(ТС): (Кавк.); Da, Db(НК); [Sp.]
2234. *S. ensifolia* Bieb. - К. мечелистный = II(КН): (Субтуран*.); ST, Db(НК); [R.]
2235. *S. filifolia* Boiss. – К. нителестный = III(BC): (Эукавказ.); ST, Da(НК); [R.]
2236. *Tragopogon dubius* Scop. - Козлобородник сомнительный = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Субсредиз*.); Pa(НК:pb); [Sp.]
2237. *T. brevirostris* DC. - К. коротконосый = IV(БН): (Кавк.); Pa, ST, Da(НК); [Sp.]

2238. *T. reticulatus* Boiss.et Huet - К. сетчатый = III(BC): (Кавк.); Pb(НК); [Sp.]
2239. *T. graminifolius* DC. - К. злаколистный = III(BC): (Субкавказ*.); Pb(НК); [Sp.]
2240. *T. ruthenicus* Bess.ex Krasch. et S.Nikit. - К. русский = II(КН): (Субтуран*.); Db(НК:pb); [R.]
2241. *T. daghestanicus*(Artemcz.)Kuth. - К. дагестанский = II(ВП); IV(БН): (Субтуран*.); Db(НК:pb); [Sp.]
2242. *T. tuberosus* C.Koch – К. клубненосный = IV(БН): (Ирано-Туран.); ST(НК); [R.]
2243. *T. filifolius* Rehm. ex Boiss. (*T. charadzeae* Kuth.) – К. нителистный = III(Тер): (Кавк.); Pb(НК); [Sp.]
2244. *Sonchus palustris* L. - Осот болотный = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.] <Pmel>
2245. *S. arvensis* L. - О. полевой = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Плурирег.); Ra,Rb(НК); [Pl.] <Pmel>
2246. *S. oleraceus* L. - О. овощной = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Плурирег.); Ra,Rb(Т); [Sp.] <Pm;Pmel>
2247. *S. asper*(L.)Hill - О. колючий = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Голаркт.); Ra,Rb(Т); [Sp.] <Pmel>
2248. *Reichardia glauca* Matthews (*R. dichotoma*(Vahl)Freyn) - Рейхардия сизая = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Армено-Иран.); ST,Da(НК); [Sp.]
2249. *Prenanthes purpurea* L. – Косогорник пурпуровый = III(СКТ,Тер): (Субсредиз*.); S(НК); [Sp.]
2250. *P. casaliifolia*(Bieb.)Beauverd – К. недоспелколистный = III(Тер): (Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]
2251. *Lactuca tatarica*(L.)C.A.Meу. - Молокан татарский = Все районы: (Палеаркт.); Ra,Rb(НК); [Pl.]
2252. *L. serriola* L. - М. компасный = I(М); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); Ra,Rb(Т); [Pl.] <Pm>
2253. *L. saligna* L. - М. солончаковый = I(М); II(ВП): (Субсредиз*.); Dc(НК:pb); [R.]
2254. *Scariola viminea*(L.)F.W.Schmidt - Скарпиола прутьевидная = Все районы: (Зап.др.средиз.); ST,Rb(НК:pb); [Sp.]
2255. *Mycelis muralis*(L.)Dumort. - Мицелис стенной = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Евро-Кавк.); Aa(НК); [Sp.]
2256. *Cicerbita macrophylla*(Willd.)Wallr. - Цицербита крупнолистная = III(Тер): (Евро-Кавк.); S,Pb(НК); [Sp.]
2257. *C. prenanthoides*(Bieb.)Beauverd - Ц. косогорниковая = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Кавк.); S,Pb(НК); [Pl.]
2258. *C. racemosa*(Willd.)Beauverd - Ц. кистистая = III(Тер): (Субкавказ*.); S,Pb(НК); [Sp.]
2259. *Taraxacum serotinum*(Waldst. et Kit)Poir. - Одуванчик поздний = I(М); II(Кизл); IV(БН): (Субпонт*.); Pa,Rb(НК); [Sp.] <Pmel>
2260. *T. confusum* Schischk. - О. смешиваемый = III(Тер): (Кавк.); Pb(НК); [Sp.]

2261. *T. officinale* Wigg. - О. лекарственный = Все районы: (Палеаркт.); Pa,Rb(НК); [Pl.] <Pm;Pmel;Pp>
2262. *T. mucronatum* Lindb. fil. - О. остроконечный = Все районы: (Палеаркт.); Pa,Rb(НК); [Pl.] <Pmel>
2263. *T. prilipkoi* Czer. (*T. praticola* Schischk.) - О. Прилипко = II(Кизл); III(СКТ): (Кавк.); ST(НК); [Sp.] <Pmel>
2264. *T. crepidiforme* DC. (*T. stevenii*(Spreng.)DC.) – О. скердоподобный = III(Тер): (Субкавк*.); Pb,Pc(НК); [Pl.]
2265. *T. porphyranthum* Boiss. – О. пурпурноцветковый = III(BC): (Кавк.); Pb,Pc(НК); [Pl.]
2266. *T. tenuisectum* Somm. et Levier – О. тонкорассечённый = III(BC): (Кавк.); Pc,Do(НК); [Sp.]
2267. *Chondrilla juncea* L. - Хондрилла ситниковидная = I(M); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Субсредиз*.); Da,Db(НК:pb); [Sp.] <Pm>
2268. *Ch. latifolia* Bieb. - X. широколистная = I(M); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Субпонт*.); Da,Db(НК:pb); [Sp.]
2269. *Crepis rannonica*(Jacq.)C.Koch - Скерда венгерская = IV(БН): (Понт.-Южносиб.); ST,Da(НК); [Sp.]
2270. *C. pulchra* L. - С. красивая = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Зап.др.средиз.); Da,Rb(T); [Pl.]
2271. *C. caucasica* C.A.Mey. – С. кавказская = III(BC): (Эукавк.); S,Pb(НК); [R.]
2272. *C. sonchifolia*(Bieb.)C.A.Mey. – С. осотolistная = III(BC): (Эукавк.); Pb(НК); [Sp.]
2273. *Barkhausia rhoeadifolia*(Bieb.)Reichenb. (*Crepis rhoeadifolia* Bieb.) - Баркгаузия маколистная = I(M); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Субпонт*.); ST,Rb(НК:pb); [Pl.]
2274. *B. marschallii* C.A.Mey. (*C. marschallii*(C.A.Mey.)F.Schultz) - Б. Маршалла = I(M); II(ВП): (Субкавк*.); ST,Rb(НК:pb); [R.]
2275. *Pterochaeta sancta*(L.)C.Koch (*Lagosotis sancta*(L.)K.Maly) - Птеротека палестинская = Все районы: (Вост.др.средиз.); ST,Rb(T); [Pl.]
2276. *Hieracium virosum* Pall. - Ястребинка ядовитая = I(M); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); S,Pa,ST(НК); [Sp.]
2277. *H. robustum* Fries - Я. могучая = I(M); II(ВП); III(СКТ); IV(БН): (Палеаркт.); S,Pa,ST(НК); [Sp.]
2278. *H. umbellatum* L. - Я. зонтичная = III(СКТ,Тер); IV(БН): (Голаркт.); Da,Db(НК); [Pl.]
2279. *H. bupleurifolioides*(Zahn)Juxip – Я. володушколистovidная = III(Тер): (Евро-Кавк.); Pb(НК); [Sp.]
2280. *H. macrolepis* Boiss. - Я. крупночешуйчатая = III(Тер): (Субкавк*.); S,Pb(НК); [Sp.]
2281. *H. simplicicaule*(Somm. et Levier)Peter - Я. простостебельная = III(Тер): (Кавк.); S,Pb(НК); [Sp.]
2282. *H. subsvaneticum*(Litv. et Zahn)Juxip – Я. почти-сванетская = III(Ч): (Эукавк.); Pb(НК); [Sp.]

2283. *H. gothicifrons*(Zahn)Juxip – Я. готическая = III(Ч – Шаро-Аргун):
(Эукавк.); Pa(НК); [R.]
2284. *H. gudergomiense* Juxip – Я. гудергомисская = III(BC): (Эукавк.);
Pb(НК); [Sp.] <EsubE>
2285. *H. laevigatum* Willd. – Я. сглаженная = III(BC): (Палеаркт.); S,Db(НК);
[R.]
2286. *H. hypoglaucum*(Litv. et Zahn)Juxip (*H. prenanthoides auct. fl. cauc.*) – Я.
почтисизая = III(Тер): (Эукавк.); S,Pb(НК); [Sp.]
2287. *H. pilosella* L. - Я. волосистая = III(СКТ): (Евро-Кавк.); Da,Db(НК); [Pl.]
<Pm>
2288. *H. bifurcum* Bieb. (*H. longipes*(C.Koch ex Naeg et Peter)Juxip) - Я.
длинностопая = III(Ч): (Субкавк*.); Pa(НК); [Sp.]
2289. *H. echioides* Lumn. - Я. румяноквая = III(ТС): (Палеаркт.); ST(НК);
[Sp.]
2290. *H. auriculoides* Lang. (*H. arvense*(Naeg. et Peter)Juxip, *H. mirum*(Naeg. et
Peter)Juxip, *H. tanythrix*(Naeg. et Peter)Juxip, *H. sarmentosum* Froel.) - Я.
полевая = III(Тер): (Европ.); Pa(НК); [Sp.]
2291. *H. lasiophorum*(Naeg. et Peter)Juxip – Я. густопушистая = III(Ч):
(Эукавк.); S(НК); [Sp.]
2292. *H. procerum* Fries - Я. рослая = III(Тер): (Вост.др.средиз.); Pa(НК); [Sp.]
2293. *H. longiscarpum* Boiss. et Kotschy ex Naeg. et Peter – Я. длиннострелковая
= III(Тер): (Эукавк.); Pb,Pc(НК); [Sp.]
2294. *H. scabrum*(Willd.)Froel. (*H. incanum* Bieb.) – Я. шершавая – III(Тер):
(Эукавк.); S,Pa(НК); [Sp.]
2295. *H. sosnowskyi*(Zahn)Kem.-Nath. – Я. Сосновского = III(Тер): (Эукавк.);
S(НК); [R.]