


ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

---

А.Л. ИВАНОВ

КОНСПЕКТ  
ФЛОРЫ  
СТАВРОПОЛЬЯ



---

СТАВРОПОЛЬ  
2005

УДК 582(470.63)+581.9(470.63)  
ББК 28.585(2Р-4Ст) И  
И 20

Иванов А.Л.

И 20 Конспект флоры Ставрополя. 3-е изд., испр. и доп. -Ставрополь: Изд-во СГУ, 2005. – 200 с. : 23 ил.

Конспект флоры Ставрополя содержит актуальные сведения по видовому составу растений с указанием приуроченности к флористическому району, географического типа, фитоценотической принадлежности, жизненной формы, хозяйственной ценности (отмечены лекарственные, ядовитые, пищевые, кормовые и декоративные растения). Даны основные синонимы. Указаны эндемики разного ранга, реликты, охраняемые и нуждающиеся в охране виды, а также виды, *locus classicus* (классическое место) которых находится в регионе.

Предназначен для студентов-биологов, магистрантов и аспирантов, научных сотрудников, специалистов сельского хозяйства, работников природоохранных органов, учителей средних школ.

Научный редактор  
докт. биол. наук, проф. Ю.А. Дударь

ISBN 5-88648-276-8

© Иванов А. Л., 2005

© Ставропольский государственный  
университет, 2005

## ОТ АВТОРА

Флористические исследования в Предкавказье, особенно в Центральном Предкавказье, в последние годы шли особенно интенсивно. Появились новые работы, касающиеся как ревизии флоры в целом, так и посвященные критической обработке отдельных семейств и родов. Большой труд проделан коллективом авторов Ботанического института (БИН) им. В.Л. Комарова РАН, который в 2003 году выпустил первый том "Конспекта флоры Кавказа", в котором содержится сводка таксонов кавказской флоры высших споровых и голосеменных растений. Ставропольские ботаники многие годы работают над проблемой инвентаризации региональной флоры и критическим пересмотром таксономических списков. Основой для этого являются труды А.А. Гроссгейма (1939-1967), А.И. Галушко (1978-1980), В.Г. Танфильева и В.Н. Кононова (1987), публикации БИНа, а также собственные исследования коллектива кафедры ботаники Ставропольского государственного университета, учёных Ставропольского ботанического сада и филиала БИНа в г. Пятигорске. Полученные сведения нашли отражение в первом и втором изданиях "Конспекта флоры Ставрополя" (1997, 2001), в который было включено 2204 и 2252 вида соответственно.


В связи с критическим пересмотром предкавказской флоры, результаты которого изложены в монографии "Флора Предкавказья и её генезис" (Иванов, 1998), возникла необходимость внесения дополнений и изменений в существующий конспект ставропольской флоры. Во-первых, разработана новая система геоэлементов, отражающая характер общего распространения видов. Во-вторых, проведено детальное флористическое районирование территории и выделены новые флористические районы, что позволяет более точно указывать распространение видов. Кроме того, описаны новые для науки виды и сделаны новые флористические находки. В список видов вошли также некоторые интродуцированные древесные растения (12 видов), одичавшие и ставшие компонентами естественных фитоценозов. Таким образом, список пополнился ещё 47 видами.

Основная номенклатура приведена в соответствие с последней сводкой С.К. Черепанова (1995), однако названия многих видов и номенклатура многих родов оставлены в таком виде, в каком они приняты во Флоре Скверного Кавказа (Галушко, 1978-1980). В необходимых случаях приведены основные синонимы, что облегчает обращение к различным литературным источникам.

Автор выражает благодарность профессору Дударю Ю.А., сделавшему ценные замечания при работе с рукописью.

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Информация о каждом виде даётся в следующем порядке: научное латинское и традиционное русское название вида и в необходимых случаях синоним или синонимы (в скобках, курсивом). После знака = приводятся: распространение, географический тип (геоэлемент), флорценоэлемент, жизненная форма по Раункиеру, встречаемость и для отдельных видов дополнительные сведения. Распространение видов на территории Ставропольского края приводится согласно схеме флористических районов Предкавказья, разработанной автором (Иванов, 1998, 1999). Границы этих районов и их условные обозначения изображены на прилагаемой картосхеме.



На территории края пересекаются границы трёх флористических провинций: Понтической, Кавказской и Туранской. Первые две относятся к Евросибирской области Бореального подцарства, третья - к Сахаро-Гобийской области Древнесредиземноморского подцарства. Положение Ставропольского края в системе фитогеографического районирования оценивается следующим образом:

## ГОЛАРКТИЧЕСКОЕ ЦАРСТВО

### БОРЕАЛЬНОЕ ПОДЦАРСТВО

Евросибирская область

Европейская подобласть

#### **I. Понтическая провинция**

I.1. Западнопредкавказский округ

КЕ - Кубано-Егорлыкский район

I.2. Центральнопредкавказский округ

МД - Маныческо-Дадынский район

АИ - Арзгирско-Ипатовский район

НК - Нижне-Кумский район

Прик - Прикалаусский район

ТБ - Томузловско-Буйволинский район

М - Моздокский район

#### **II. Кавказская провинция**

II.1. Ставропольский округ

Ст - Ставропольский район

II.2. Кубанский округ

ЛН - Лабинско-Невинномысский район

II.3. Терский округ

СК - Средне-Кумский район

II.4. Эльбрусский округ

П - Пятигорский район

Кисл - Кисловодский район

### ДРЕВНЕСРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ПОДЦАРСТВО

Сахаро-Гобийская область

Центрально-Азиатская подобласть

#### **III. Туранская провинция**

III.1. Восточнопредкавказский округ

КН - Кара-Ногайский район

Исходя из этого положения строится последовательность перечисления районов распространения каждого вида.

После перечня районов в скобках даётся общее распространение вида (геоэлемент). Система геоэлементов приведена в таблице I.

**1. Плюрирегиональный.** Включает виды, ареалы которых выходят за пределы Голарктического царства.

**2. Голарктический.** Относимые к этому географическому элементу виды встречаются во всех (или почти во всех) областях Голарктического царства.

3. **Палеарктический.** Представлен видами, ареалы которых охватывают умеренные и субтропические области Голарктического царства Старого Света без определённой приуроченности к одному из подцарств.
4. **Панбореальный.** Относимые сюда виды распространены во всех или почти во всех областях Бореального подцарства, включая Западное полушарие,
5. **Евро-Сибирский.** К нему относятся виды, распространённые в евразийской части Циркумбореальной области А.Л.Тахтаджяна (1978).
6. **Евро-Кавказский.** Относимые сюда виды распространены в Кавказской, Эвксинской и европейских провинциях Евро-Сибирской области, т.е. тяготеют к Европейской широколиственной области Е.М.Лавренко (1950) или Среднеевропейской области А.И.Толмачёва (1974).
7. **Европейский.** Объединяемые в этот элемент виды распространены в основном в умеренных частях европейских провинций А.Л.Тахтаджяна (1978) - Атлантическо-Европейской, Северо-Европейской, Центрально-Европейской и Восточно-Европейской, проникая в Кавказскую провинцию.
8. **Кавказский.** К этому элементу относятся виды, характерные для Кавказской провинции. Они имеют различный характер распространения. Кроме собственно кавказских, ареал которых охватывает весь Кавказ (включая и Малый Кавказ), выделены виды, ограниченные распространением на Большом Кавказе (**Эукавказские**), и в Предкавказье (**Предкавказские**).
9. **Эвксинский.** Объединяет виды, основной ареал которых ограничен Эвксинской провинцией Циркумбореальной области (Тахтаджян, 1978).
10. **Понтическо-Южносибирский.** Включает в себя виды, распространённые в Понтической провинции А.Л.Тахтаджяна (1978), или южных частях Восточно-Европейской и Западно-Сибирской провинциях А.Л. Тахтаджяна (1978), или Евразийской степной области Е.М.Лавренко (1950, 1970).
11. **Понтический.** Объединяет виды, приуроченные к степным и лесостепным районам Восточноевропейской провинции, их восточные границы ареалов ограничены Поволжьем, реже доходят до Урала. Небольшая часть видов ограничена в своём распространении Крымом и Предкавказьем.
12. **Общедревнесредиземноморский.** Объединяет виды, широко распространённые в Средиземноморской и Ирано-Туранской областях Древнесредиземноморского подцарства (Тахтаджян, 1978).
13. **Западнодревнесредиземноморский.** К нему относятся виды, ареалы которых охватывают всю Средиземноморскую область или её большую часть, и заходят на востоке в западную часть Ирано-Туранской области.
14. **Средиземноморский.** Объединяет виды, ареалы которых охватывают две и более провинций Средиземноморской области.

- 15. Крымско-Новороссийский.** Объединяет виды, распространённые в Крымско-Новороссийской провинции, иррадиирующие на территорию Предкавказья.
- 16. Восточнодревнесредиземноморский.** Объединяет виды, распространённые в Переднеазиатской и Центральноазиатской подобластях Ирано-Туранской области и широко иррадиирующие.
- 17. Ирано-Туранский.** Включает виды, характерные для Переднеазиатской подобласти Ирано-Туранской области.
- 18. Армено-Иранский.** Ареалы видов этого элемента приурочены к Армено-Иранской провинции Переднеазиатской подобласти Ирано-Туранской области, одному из основных центров Ирано-Туранской флоры.
- 19. Туранский.** Центр тяжести относимых к этому геоэлементу видов находится в Туранской провинции.
- 20. Субсредиземноморский\*.** Относимые к этому геоэлементу виды более или менее равномерно распространены в северных и северо-восточных районах Средиземноморской области и в юго-западных районах Евро-Сибирской области.
- 21. Субкавказский\*.** Объединяет связующие виды, основная часть ареалов которых охватывает Кавказскую провинцию, а также часто Эвксинскую провинцию Евро-Сибирской области и Армено-Иранскую провинцию Ирано-Туранской области.
- 22. Субпонтический\*.** Объединяет виды, основная часть ареалов которых находится в степных и лесостепных районах Восточно-Европейской и преимущественно западных районах Эвксинской провинции Евро-Сибирской области и в восточных районах Иллирийской, в Центрально-Анатолийской и Восточно-Средиземноморской провинциях Средиземноморской области.
- 23. Субтуранский\*.** Объединяет связующие виды, ареалы которых охватывают лесостепную и степную часть Восточно-Европейской и Западно-Сибирской провинций Евро-Сибирской области и Туранскую провинцию Ирано-Туранской области (преимущественно северную часть).
- 24. Адвентивный.** Объединяет заносные виды.

После точки с запятой указываются флороценоэлемент и жизненная форма (биоморфа) вида. Выделяются следующие флороценоэлементы:

S (Silvaticus) - лесной

P (Pratensis) - луговой


Pa - равнинный

Pb – субальпийский

Pc – альпийский

- ST (Stepposus) – степной  
SD (Semidesertus) - полупустынный  
D (Desertus) - пустынный  
Da - кальцепетрофильный  
Db - псаммофильный  
Dc - галофильный  
Dd - аргиллофильный  
A (Aquaticus) - водный  
Aa - гигрофильный  
Ab - гидрофильный  
Ac- гидатофильный  
R (Ruderalis) - сорный  
Ra - сеgetальный  
Rb - рудеральный

Основные типы растительности на территории Ставропольского края приведены на картосхеме.





В скобках приводятся жизненные формы по Раункиеру:

Ph (Phanerophyton) – фанерофит: почки возобновления находятся от уровня снежного покрова до 30 м и более. Подразделяется на следующие группы:

Phmg (Megaphanerophyton) – мегафанерофит: почки возобновления находятся на высоте более 30 м;

Phms (Mesophanerophyton) – мезофанерофит: почки возобновления находятся на высоте от 8 до 30 м;

Phm (Microphanerophyton) – микрофанерофит: почки возобновления находятся на высоте от 2 до 8 м;

Phn (Nanophanerophyton) – нанофанерофит: почки возобновления находятся на высоте от 0,15 до 2 м.

Ch (Chamaephyton) - почки возобновления расположены выше уровня почвы и обычно зимой находятся ниже уровня снежного покрова. К ним относятся кустарнички и полукустарники, растения-подушки.

НК (Hemicryptophyton) – гемикриптофит: травянистые растения, почки возобновления которых находятся на уровне почвы. К ним относятся розеткообразующие травы, двулетники, озимые однолетники, дерновинообразующие и короткокорневищные травы.

К (Cryptophyton) – криптофит: травянистые растения, почки возобновления которых лежат глубоко в почве (геофиты) или под водой (гидрофиты). Это луковичные, корневищные, клубневые или корнеотпрысковые растения.

Т (Therophyton) – терофит: однолетние растения, не имеющие почек возобновления и переносящие неблагоприятные условия в виде семян.

Дополнительные сведения о жизненных формах указываются через двоеточие:

fl (fruticulus) - кустарничек

sf (suffrutex) - полукустарник и полукустарничек

ll (liana lignosa) - одревесневающая лиана

lh (liana herbacea) - травянистая лиана

eph (ephemera) - эфемер

ephd (ephemeroidum) - эфемероид

ep (epiphyton) - эпифит

par (parasitus) - паразит

hpar (hemiparasitus) - полупаразит

sap (saprophyton) - сапрофит

sv (sempervirens) - вечнозелёное растение

hv (hiemevirens) - зимнезелёное растение

pb (planta biennis) - двулетнее растение

pi (planta insectivora) - насекомоядное растение

ps (planta succulenta) - суккулентное растение

ТАБЛИЦА I

## СИСТЕМА ГЕОЭЛЕМЕНТОВ ФЛОРЫ СТАВРОПОЛЬЯ

| №                                | Сокращение      | ГЕОЭЛЕМЕНТ                      |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| ПЛЮРИРЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ       |                 |                                 |
| 1                                | Плюрирег.       | Плюрирегиональный               |
| ОБЩЕГОЛАРКТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ      |                 |                                 |
| 2                                | Голаркт.        | Голарктический                  |
| 3                                | Палеаркт.       | Палеарктический                 |
| БОРЕАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ              |                 |                                 |
| 4                                | Панбор.         | Панбореальный                   |
| 5                                | Евро-Сиб.       | Евро-Сибирский                  |
| 6                                | Евро-Кавк.      | Евро-Кавказский                 |
| 7                                | Европ.          | Европейский                     |
| 8                                | Кавк.           | Кавказский                      |
| 8.1                              | Эукавк.         | Эукавказский                    |
| 8.2                              | Предкавк.       | Предкавказский                  |
| 9                                | Эвксин.         | Эвксинский                      |
| 10                               | Понт.-Южносиб.  | Понтическо-Южносибирский        |
| 11                               | Понтич.         | Понтический                     |
| ДРЕВНЕСРЕДИЗЕМНОМОРСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ |                 |                                 |
| 12                               | Общедр.средиз.  | Общедревнесредиземноморский     |
| 13                               | Зап.др.средиз.  | Западнодревнесредиземноморский  |
| 14                               | Средиземн.      | Средиземноморский               |
| 15                               | Кр.-Новоросс.   | Крымско-Новороссийский          |
| 16                               | Вост.др.средиз. | Восточнодревнесредиземноморский |
| 17                               | Ирано-Туран.    | Ирано-Туранский                 |
| 18                               | Армено-Иран.    | Армено-Иранский                 |
| 19                               | Туранск.        | Туранский                       |
| СВЯЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ               |                 |                                 |
| 20                               | Субсредиз.*     | Субсредиземноморский*           |
| 21                               | Субкавк.*       | Субкавказский*                  |
| 22                               | Субпонт.*       | Субпонтический*                 |
| 23                               | Субтуран.*      | Субтуранский*                   |
| АДВЕНТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ             |                 |                                 |
| 24                               | Адвент.         | Адвентивный                     |

Встречаемость (в квадратных скобках):

[Soc.] (Sociales) - доминирует

[Pl.] (Plerumque) - обычно

[Sp.] (Sparse) - рассеянно

[R.] (Raro) - редко

[Rs.] (Rarissimo) - очень редко

Дополнительные сведения о видах:

<Es> (Planta stenoendemica) - стеноэндемик

<Ee> (Planta euriendemica) - эвриэндемик

<Esub> (Planta subendemica) - субэндемик

<Rg> (Relictum glacialum) - гляциальный реликт

<Rx> (Relictum xerothermicum) - ксеротермический реликт

<Rt> (Relictum tertiarium) - третичный реликт

<Pt> (Planta toxica) - ядовитое растение

<Pm> (Planta medicinalis) - лекарственное растение

<Pp> (Planta pabularis) - кормовое растение

<Po> (Planta ornamentalis) - декоративное растение

<Pa> (Planta alimentaria) - пищевое растение

★ - виды, занесённые в Красную книгу Ставропольского края (2002)

★★ - виды, занесённые в Красную книгу РСФСР (1988)

l.c. (locus classicus) - классическое место

## CONSPECTUS FLORAE STAUIROPOLENSIS КОНСПЕКТ ФЛОРЫ СТАВРОПОЛЯ

### ОТДЕЛ LYCOPODIOPHYTA - ПЛАУНООБРАЗНЫЕ

#### Класс LYCOPODIOPSIDA - ПЛАУНОВИДНЫЕ

##### Сем. 1. HUPERZIACEAE Rothm. - БАРАНЦОВЫЕ

1. ★ *Huperzia selago*(L.) Bernh. ex Schrank et C. Mart. - Баранец обыкновенный = П, Кисл (Плюрирег.); S(Ch:sv); [Rs.] <Rg;Rt;Pm>

#### Класс ISOËTOPSIDA - ПОЛУШНИКОВИДНЫЕ

##### Сем. 2. SELAGINELLACEAE Willk. - ПЛАУНКОВЫЕ

2. *Selaginella helvetica*(L.) Spring - Плаунок швейцарский = Кисл (Палеаркт.); S(Ch:sv); [Sp.] <Rt>

### ОТДЕЛ EQUISETOPHYTA - ХВОЩЕОБРАЗНЫЕ

#### Класс EQUISETOPSIDA - ХВОЩЕВИДНЫЕ

##### Сем. 3. EQUISETACEAE Rich. ex DC. - ХВОЩЕВЫЕ

3. *Equisetum telmateia* Ehrh. - Хвощ Тельматея = Прик, М, Ст, ЛН, П, Кисл (Субсредиз\*); S(НК); [Pl.]
4. *E. arvense* L. - Х. полевой = Прик, Ст, ЛН, СК, Кисл (Голаркт.); Ра, Аа(НК); [Pl.] <Pm>
5. *E. pratense* Ehrh. - Х. луговой = П, Кисл (Голаркт.); S, Аа(НК); [R.]
6. *E. palustre* L. - Х. болотный = Кисл (Голаркт.); Аа(К); [Sp.]
7. *E. hyemale* L. - Х. зимующий = Ст, Прик (Палеаркт.); S, Аа(НК:hv); [Sp.] <Rt>
8. *E. ramosissimum* Desf. - Х. ветвистый = Все р-ны (Голаркт.); Ра, Аа(НК); [Pl.]
9. *E. variegatum* Schleich. - Х. пёстрый = Кисл (Голаркт.); Db, Аа(К); [Sp.]

### ОТДЕЛ POLYPODIOPHYTA - ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ

#### Класс ORHIOGLOSSOPSIDA - УЖОВНИКОВИДНЫЕ

##### Сем. 4. ORHIOGLOSSACEAE (R.Br.) Agardh. - УЖОВНИКОВЫЕ

10. ★ *Ophioglossum vulgatum* L. - Ужовник обыкновенный = Ст (Евро-Кавк.); S(НК); [Rs.] <Rg;Rt>
11. ★ *Botrychium lunaria*(L.) Sw. - Гроздовник полулунный = П, Кисл (Плюрирег.); Pb(НК); [R.] <Rt>

#### Класс POLYPODIOPSIDA - ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ

##### Сем. 5. ONOCLEACEAE Pichi Sermolli (ASPIDIACEAE) - ОНОКЛЕЕВЫЕ

12. ★ *Matteuccia struthiopteris*(L.) Tod. - Страусник обыкновенный = СТ, П, Кисл (Голаркт.); S(НК); [Sp.]

Сем. 6. ATHYRIACEAE Alst.(ASPIDIACEAE) - КОЧЕДЫЖНИКОВЫЕ

13. *Athyrium filix-femina*(L.)Roth - Кочедыжник женский = Ст,П,Кисл (Плюрирег.); S(НК); [Sp.]
14. *Cystopteris fragilis*(L.)Bernh. (*C. filix-fragilis*(L.)Borb.) - Пузырник ломкий = Ст,П,Кисл(Палеаркт.); S(НК); [Pl.]
15. ★ *Rhizomatopteris sudetica*(A.Br.et Milde)A.Khokhr. (*Cystopteris sudetica* A.Br.et Milde) - Ризоматоптерис судетский = Кисл(Европ.); S(НК); [R.] <Rg>
16. *Gymnocarpium dryopteris*(L.)Newm. (*Dryopteris pumila* V.Krecz., *D. linneana* C.Chr.) - Гимнокарпиум кочедыжник = П,Кисл(Голаркт.); S(НК); [R.]

Сем. 7. WOODSIACEAE(Diels)Herter(ASPIDIACEAE) - ВУДСИЕВЫЕ

17. ★ *Woodsia fragilis*(Trev.)Moore - Вудсия ломкая = Кисл(Кавк.); S(НК); [Sp.]
18. ★ *W. glabella* R.Br. - В. гладковатая = Кисл(Голаркт.); S, Da(НК); [Sp.]
19. ★ *W. ilvensis*(L.)R.Br. - В. эльбская = Кисл(Голаркт.); S, Da(НК); [R.]

Сем. 8. DRYOPTERIDACEAE Ching(ASPIDIACEAE) - ЩИТОВНИКОВЫЕ

20. *Dryopteris filix-mas*(L.)Schott - Щитовник мужской = Ст,П,Кисл(Голаркт.); S(НК); [Pl.] <Pm>
21. *D. caucasica*(A.Br.)Fraser-Jenkins et Corley - Щ. кавказский = Ст,П,Кисл (Кавк.); S(НК); [Sp.]
22. *D. carthusiana*(Vill.)H.P.Fusch (*D. lanceolato-cristata* (Hoffm.)Alst., *D. spinulosa* (O.F.Muell.) O.Kuntze) - Щ. картузианский = П,Кисл(Голаркт.); S(НК); [Sp.] <Pm>
23. *D. assimilis* S.Walker (*D. austriaca*(Jacq.)Woynar) - Щ. схожий = П,Кисл (Голаркт.); S(НК); [Sp.] <Pm>
24. ★ *Polystichum aculeatum*(L.)Roth (*P. lobatum*(Huds.)Alst.) - Многорядник мелкошиповатый = Ст,П(Субсредиз\*); S(НК:hv); [R.] <Rt;Rg>
25. ★ *P. setiferum*(Forssk.)Moore ex Woynar (*P. angulare*(Kit.et Willd.)C.Presl.) - М. щетинконосный = Ст(Темнолесская) (Субсредиз\*); S(НК:hv); [Rs.] <Rg;Rt>
26. ★ *P. braunii*(Spenn.)Fee - М. Брауна = Ст,П,Кисл(Панбор.); S(НК:hv); [Pl.] <Rt>

Сем. 9. THELIPTERIDACEAE Pichi Sermolli(ASPIDIACEAE) - ТЕЛИПТЕРИСОВЫЕ

27. ★ *Thelypteris palustris* Schott (*Dryopteris thelypteris*(L.)A.Gray) - Телиптерис болотный = НК(Кума),Ст(Кравцово оз.),П(Голаркт.); Ab(К); [R.] <Rg>

Сем. 10. ASPLENIACEAE Newm. - КОСТЕНЦОВЫЕ

28. *Asplenium ruta-muraria* L. - Костенец рута постенная = Ст,П,Кисл(Голаркт.); S, Da(НК:hv); [Pl.] <Rt>

29. *A. septemtrionale*(L.)Hoffm. - К. северный = Ст,П,Кисл(Голаркт.); S, Da(НК:hv); [Pl.] <Rt>
30. *A. trichomanes* L. - К. волосовидный = Ст,П,Кисл(Плюрирег.); S, Da(НК:hv); [Pl.] <Rt;Pm>
31. ★ *Ceterach officinarum* Willd. - Скребница аптечная = Ст,П,Кисл (Общедр. средиз.); Da(НК); [R.] <Rt>
32. ★ *Phyllitis scolopendrium*(L.)Newm. - Листовник многоножковый = Ст,П,Кисл (Евро-Кавк.); S(НК:hv); [Sp.] <Rt;Pm>

Сем. 11. NYPOLEPIDACEAE Pichi Sermolli(PTERIDACEAE) - ГИПОЛЕПИСОВЫЕ

33. *Pteridium aquilinum*(L.)Kuhn - Орляк обыкновенный = П(Плюрирег.); S(K); [R.]
34. *P. tauricum* V.Krecz. - О. крымский = П,Кисл(Кр.-Новоросс.); S(K); [R.] <Rg>

Сем. 12. POLYPODIACEAE Bercht.et J.Presl. - МНОГОНОЖКОВЫЕ

35. ★ *Polypodium vulgare* L. - Многоножка обыкновенная = Ст,П,Кисл (Плюрирег.); S(НК:hv:ep); [Sp.] <Rt>

**Класс SALVINIOPSIDA - САЛЬВИНИЕВИДНЫЕ**

Сем. 13. SALVINIACEAE T.Lest. - САЛЬВИНИЕВЫЕ

36. ★ *Salvinia natans*(L.)All. - Сальвиния плавающая = НК(Кума), ТБ(Томузловка), М(Терек)(Плюрирег.); Ас(Т); [Sp.]

**ОТДЕЛ PINOPHYTA - СОСНООБРАЗНЫЕ (ГОЛОСЕМЕННЫЕ)**

**Класс PINOPSIDA - СОСНОВИДНЫЕ (ХВОЙНЫЕ)**

Сем. 14. TAXACEAE S.F.Gray - ТИСОВЫЕ

37. ★ ★ *Taxus baccata* L. - Тис ягодный = П,Кисл(Евро-Кавк.); S(Phm); [R.] <Rt;Rg;Pt>

Сем. 15. CUPRESSACEAE Rich.ex Bartl. - КИПАРИСОВЫЕ

38. *Juniperus oblonga* Vieb. - Можжевельник продолговатый = М,П,Кисл,КН (Кавк.); Da,Db(Phn); <Pa;Pm>
39. *J. sabina* L. - М. казацкий = П,Кисл(Понт.-Южносиб.); Da(Phn); [R.] <Pt;Pm>

**ОТДЕЛ EPHEDROPHYTA - ЭФЕДРООБРАЗНЫЕ (ОБОЛОЧКОСЕМЕННЫЕ)**

**Класс EPHEDROPSIDA - ЭФЕДРОВИДНЫЕ**

Сем. 16. EPHEDRACEAE Dumort. - ЭФЕДРОВЫЕ

40. *Ephedra distachia* L. - Эфедра двухколосковая = АИ,Прик,Ст,ЛН,СК,П(Понт.-Южносиб.); Da,Db(Ch:fl); [Sp.] <Pm>

41. *E. procera* Fisch. et C.A. Mey. - Э. рослая = П, Кисл (Ирано-Туран.); Da(Ch); [Sp.]  
<Pm>

## **ОТДЕЛ MAGNOLIOPHYTES - МАГНОЛИЕОБРАЗНЫЕ (ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ)**

### **Класс LILIOPSIDA - ЛИЛИЕВИДНЫЕ (ОДНОДОЛЬНЫЕ)**

#### Сем. 17. TYPHACEAE Juss. - РОГОЗОВЫЕ

42. *Typha latifolia* L. - Рогоз широколистный = Все р-ны (Голаркт.); Ab(K); [Pl.]  
43. *T. laxmannii* Lerch. - Р. Лаксмана = КЕ, МД, АИ, НК, Ст, П (Палеаркт.); Ab(K); [Sp.]  
44. *T. angustifolia* L. - Р. узколистный = Все р-ны (Плюрирег.); Ab(K); [Pl.]  
45. *T. domingensis* Pers (*T. australis* Schum. et Thonn., *T. angustata* Bory et Chaub) - Р. доминирующий = Ст, Кисл (Общедр. средиз.); Ab(K); [R.]  
46. *T. minima* Funck - Р. малый = КЕ (Кубань), МД, АИ, НК, ЛН, СК, П (Общедр. средиз.); Ab(K); [R.]

#### Сем. 18. SPARGANIACEAE Rudolphi - ЕЖЕГОЛОВНИКОВЫЕ

47. *Sparganium angustifolium* Michx. - Ежеголовник узколистный = Кисл (Голаркт.); Ab(K); [R.]  
48. *S. erectum* L. - Е. прямой = КЕ, МД, АИ, НК, Прик, ТБ, Ст, ЛН, П (Палеаркт.); Ab(K); [Sp.]  
49. *S. neglectum* Beeby - Е. незамеченный = КЕ, МД, АИ, НК, Ст, ЛН, СК, П (Палеаркт.); Ab(K); [Sp.]  
50. *S. microcarpum* (Neum.) Raunk. - Е. мелкоплодный = ЛН, СК, П (Евро-Сиб.); Ab(K); [R.]

#### Сем. 19. POTAMOGETONACEAE Dumort. - РДЕСТОВЫЕ

51. *Potamogeton pectinatus* L. - Рдест гребенчатый = МД, АИ, НК, Прик, ТБ, Ст (Плюрирег.); Ac(K); [R.]  
52. *P. filiformis* Pers. - Р. нитевидный = НК (Кума) (Плюрирег.); Ac(K); [R.]  
53. *P. berchtoldii* Fieb. - Р. Берхтольда = НК (Кума), Ст, ЛН, П, Кисл (Плюрирег.); Ac(K); [Sp.]  
54. *P. crispus* L. - Р. курчавый = КЕ, МД, АИ, НК, Ст, СК, П (Плюрирег.); Ac(K); [Sp.]  
55. *P. lucens* L. - Р. блестящий = НК (Кума), М, Ст, СК (Голаркт.); Ac(K); [sp.]  
56. *P. perfoliatus* L. - Р. стеблеобъемлющий = Все р-ны (Плюрирег.); Ac(K); [Sp.]  
57. *P. natans* L. - Р. плавающий = Все р-ны (Плюрирег.); Ac(K); [Sp.]  
58. *P. nodosus* Poir. - Р. узловатый = П (Плюрирег.); Ac(K); [Sp.]

#### Сем. 20. RUPPIACEAE Hutch. - РУППИЕВЫЕ

59. *Ruppia maritima* L. - Руппия приморская = МД,АИ,НК,Прик,ТБ,СК (Плюрирег.); Ас(К); [Sp.]

60. *R. spiralis* L. - Р. спиральная = ТБ,НК(Плюрирег.); Ас(К); [R.]

Сем. 21. ZANNICHELLIACEAE Dumort. - ЗАННИКЕЛИЕВЫЕ

61. *Zannichellia palustris* L.- Занникелия болотная = НК,ТБ,М,Ст,СК (Плюрирег.); Ас(К); [Sp.]

62. *Z. pedunculata* Reichenb. - З. стебельчатая = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ, Ст,СК,П(Палеаркт.); Ас(К); [Sp.]

63. *Z. major* Voenn. - З. большая = МД,АИ,НК,СТ,П(Евро-Кавк.); Ас(К); [R.]

Сем. 22. NAJADACEAE Juss. - НАЯДОВЫЕ

64. ★ *Najas major* All. - Наяда большая = КЕ(Новотроицкое вдхр., Правоегорлыкский канал) [авт.](Голаркт.); Ас(Т); [R.]

65. ★ *Caulinia minor*(All.)Coss.et Germ (*Najas minor* All.) - Каулиния малая = КЕ (Новотроицкое вдхр., Правоегорлыкский канал)[авт.] (Палеаркт.); Ас(Т); [R.]

Сем. 23. JUNCAGINACEAE Rich. - СИТНИЧКОВЫЕ

66. *Triglochin palustre* L. - Триостенник болотный = Кисл(Палеаркт.); Аа(НК); [Sp.]

Сем. 24. ALISMATACEAE Vent. - ЧАСТУХОВЫЕ

67. *Alisma plantago-aquatica* L. - Частуха подорожниковая = Все р-ны (Палеаркт.); Аа(К); [Pl.]

68. *A. lanceolatum* With. - Ч. ланцетная = ТБ,НК,Ст,ЛН,П(Европ.); Аа(К); [Pl.]

69. *A. gramineum* Lej. - Ч. злаковая = КЕ,Ст,ЛН,СК,П(Палеаркт.); Аа(К); [R.]

70. *Sagittaria sagittifolia* L. - Стрелолист стрелолистный = НК(Палеаркт.); Аа,Аб(К); [R.]

Сем. 25. BUTOMACEAE Rich. - СУСАКОВЫЕ

71. ★ *Butomus umbellatus* L. - Сусак зонтичный = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст, ЛН,СК,П(Палеаркт.); Аб(К); [R.]

Сем. 26. HYDROCHARITACEAE Juss. - ВОДОКРАСОВЫЕ

72. *Hydrocharis morsus-ranae* L. - Водокрас лягушачий = НК(Палеаркт.); Ас(Т); [Sp.]

73. *Vallisneria spiralis* L. - Валлиснерия спиральная = КЕ(Новотроицкое вдхр)[авт.]; Ас(НК); [Sp.]

Сем. 27. POACEAE Barnhart - МЯТЛИКОВЫЕ(ЗЛАКОВЫЕ)



74. ★ *Imperata cylindrica*(L.)Raeusch. - Императа цилиндрическая = М,КН (Общедр.средиз.); Db(НК); [Sp.] <Po>
75. ★ *Erianthus ravennae*(L.)Beauv. - Эриантус Равенны = М,П,Кисл,КН (Вост.др.средиз.); Аа(К); [R.]
76. *Botriochloa ischaemum*(L.)Keng (*Andropogon ischaemum* L.) - Бородач кровеостанавливающий = Все р-ны(Общедр.средиз.); ST(НК); [Soc.] <Pp>
77. *Sorghum halepense* (L.)Pers. - Сорго гумай = М,ЛН,СК,П(Общедр.средиз.); Rb(НК); [Pl.] <Pp>
78. *Chrysopogon gryllus*(L.)Trin. - Золотобородник цикадовый = ЛН (Зап.др.средиз.); ST(НК); [R.]
79. *Tragus racemosus*(L.)All. - Трагус кистевидный = Все р-ны(Зап.др.средиз.); Db,Ra(T); [Pl.]
80. *Eriochloa villosa*(Thunb.)Kunth - Шерстняк волосистый = ЛН,СК(Адвент. [Япония,Китай]); Rb(T); [R.]
81. *Digitaria ischaemum*(Schreb.)Muehl (*D. linearis*(L.)Crep.) - Росичка кровеостанавливающая = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.); Db,Rb(НК); [Sp.]
82. *D. aegyptiaca*(Retz.)Willd. - Р. египетская = М,СК,П(Субсредиз\*.); Db,Rb(T); [Sp.]
83. *D. sanguinalis*(L.)Scop. - Р. кровавая = Все р-ны(Плюрирег.); Ra,Rb(T); [Pl.]
84. *D. rectiniformis*(Henrard)Tzvel. - Р. гребенчатая = КЕ,Ст,СК,П,КН (Субсредиз\*.); Db(T); [R.]
85. *Brachiaria eruciformis*(Smith.)Griseb. - Брахиария гусеницевидная = Ст (Вост.др.средиз.); Ra,Rb(T); [R.]
86. *Echinochloa crusgalli*(L.)Beauv. - Куриное просо обыкновенное = Все р-ны (Плюрирег.); Ra,Rb(T); [Pl.]
87. *E. oryzoides*(Ard.)Fritsch - К.п. рисовидное = СК(Адвент.[Япония, Китай]); Ab,Ra(T); [R.]
88. *E. phyllogogon*(Stapf)Kossenko - К.п. волосистолистное = ЛН,СК(Адвент. [Япония,Китай]); Ab,Ra(T); [R.]
89. *E. occidentalis*(Wiegand)Rydb. (*E. spiralis* Vasing.) - К.п. спиральное = ЛН, СК(Адвент.[Япония, Китай]); Ab,Ra(T); [R.]
90. *Panicum miliaceum* L. - Просо посевное = Все р-ны(Адвент.[космополитный]); Ra,Rb(T); [Sp.]
91. *Setaria verticillata*(L.)Beauv. - Щетинник мутовчатый = Все р-ны (Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.]
92. *S. pumila*(Poir.)Schult. (*S. glauca*(L.)Beauv.) - Щ. сизый = Все р-ны (Адвент. [космополитный]); Ra,Rb(T); [Pl.]
93. *S. viridis*(L.)Beauv. - Щ. зелёный = Все р-ны(Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.]
94. *Leersia oryzoides*(L.)Sw. - Леерсия рисовидная = ЛН,П(Палеаркт.); Ab(НК); [R.]

95. *Phalaroides arundinacea*(L.)Rauschert - Двуклосточник тростниковый = КЕ,М, Ст,ЛН,СК,П(Голаркт.); Аа(К); [R.]
96. *Phalaris canariensis* L. - Канареечник канарский = Кисл(Адвент.[Зап. Средиземноморье]); Rb(T); [R.]
97. *Anthoxanthum alpinum* A.et D.Love - Душистый колосок альпийский = [Ст: Колмаков, 1928],П(Евро-Сиб.); Pb(НК); [Sp.] <Pa>
98. *Hierochloe odorata*(L.)Beauv. - Зубровка душистая = Ст,СК(Голаркт.); Pa,ST(НК); [R.] <Pa>
99. *Stipa capillata* L. - Ковыль волосатик = Все р-ны(Палеаркт.); ST(НК); [Sp.]
100. ★ *S. sareptana* A.Beck. - К. сарептский = НК,КН(Субтуран\*.); ST,Db(НК); [R.]
101. ★ *S. caucasica* Schmalh. - К. кавказский = П,Кисл(Ирано-Туран.); Da(НК); [R.]
102. ★ *S. caspia* C.Koch - К. каспийский = НК,КН(Туранск.); Db(НК); [Sp.]
103. *S. lessingiana* Trin.et Rupr. - К. Лессинга = Все р-ны(Субтуран\*.); ST(НК); [Pl.]
104. ★ ★ *S. dasphylla*(Lindem.)Trautv. - К. опушеннолистный = Ст(Понт.- Южносиб.); ST(НК); [R.]
105. ★ ★ *S. pulcherrima* C.Koch - К. красивейший = Все р-ны(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.]
106. *S. tirsia* Stev. (*S. longifolia* Borb.; *S. stenophylla*(Lindem.)Trautv.) - К. пирамидальный = Ст,П,КН(Субсредиз\*.); ST(НК); [Sp.]
107. ★ ★ *S. ucrainica* P.Smirn. - К. украинский = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,СК (Понтич.); ST(НК); [Sp.]
108. ★ ★ *S. pennata* L. (*S. joannis Celac.*) - К. перистый = Все р-ны(Субтуран\*.); ST,Db(НК); [Pl.] <Pm>
109. *S. pontica* P.Smirn. - К. понтийский = Ст,П(Зап.др.средиз.); Da(НК); [R.]
110. *Achnatherum saragana*(Trin.)Nevski - Чий карагана = Кисл(Туранск.); Da(НК); [R.]
111. *Piptatherum virescens*(Trin.)Boiss. (*Oryzopsis virescens*(Trin.) G.Beck) - Пиптатерум зеленоватый = ЛН,Ст,П,Кисл,КН(Вост.др.средиз.); S(НК); [Sp.]
112. *P. holciformis*(Bieb.)Roem.et Schult. (*O. holciforme*(Bieb.)Hack.) - П. бухарниковый =ЛН,П(Вост.др.средиз.); Da(НК); [R.]
113. *Milium vernale* Vieb. - Бор весенний = Прик,ТБ,[НК:Кононов, Танфильев, 1987],ЛН,Ст(Субсредиз\*.); Pa(T); [Sp.]
114. *M. effusum* L. - Б. развесистый = [Ст: Кононов, Танфильев, 1987],П,Кисл (Голаркт.); S(НК); [Sp.]
115. *Crypsis aculeata*(L.)Ait. - Скрытница колючая = Все р-ны(Зап.др.средиз.); Dd(T); [Sp.]
116. *C. schoenoides*(L.)Lam. (*Heleochoa schoenoides*(L.)Host.ex Roem.) - С. камы-шевидная = Все р-ны(Зап.др.средиз.); Dc,Dd,Aa(T); [Sp.]
117. *C. alopecuroides*(Pill.et Mitt.)Schrad. (*H. alopecuroides*(Pill.et Mitt.)Host ex Roem.) - С. лисохвостная = КЕ,М,ЛН,СК,П(Зап.др.средиз.); Dc,Dd,Aa(T); [Sp.]

118. *Phleum pratense* L. - Тимофеевка луговая = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Pb (НК); [Pl.]
119. *Ph. paniculatum* Huds. - Т. метельчатая = Все р-ны(Зап.др.средиз.); ST(T); [Sp.]
120. *Ph. phleoides*(L.)Karst. - Т. степная = Все р-ны(Палеаркт.); ST(НК); [Pl.]
121. *Ph. montanum* C.Koch - Т. горная = П,Кисл(Кавк.); Pa(НК); [Sp.]
122. *Ph. nodosum* L. - Т. узловатая = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,ST,Db(НК); [Sp.]
123. *Alopecurus myosuroides* Huds. - Лисохвост мышехвостниковый = KE,М,ЛН, Ст,П(Зап.др.средиз.); Aa(T); [R.]
124. *A. aequalis* Sobol. - Л. равный = Все р-ны(Палеаркт.); Aa(T); [Sp.]
125. *A. pratensis* L. - Л. луговой = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Евро-Сиб.); Pa(НК); [Sp.] <Pp>
126. *A. arundinaceus* Poir. - Л. тростниковый = Все р-ны(Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.]
127. *A. vaginatus*(Willd.)Pall.ex Kunth - Л. влагалищный = ЛН,СК,П,Кисл (Общедр.средиз.); Pb(НК); [Sp.]
128. *A. glacialis* C.Koch - Л. ледниковый = П,Кисл(Кавк.); Pb(НК); [Pl.]
129. *Polypogon monspeliensis*(L.)Desf.-Многобородник монспелиенский = М (Терек),П(Общедр.средиз.); Aa(T); [R.]
130. ★★ *Zingeria biebersteiniana*(Claus)P.Smirn. - Цингерия Биберштейна = Кисл (Понтич.); Pa,Aa(T); [Rs.] <Rg>
131. *Agrostis planifolia* C.Koch - Полевица плосколистная = П,Кисл(Ирано-Туран.); S,Pb(НК); [Sp.]
132. *A. vinealis* Schreb. (*A. tenuifolia* Bieb.; *A. marschalliana* Seregin) - П. виногради́ковая = Ст,П,Кисл(Понтич.); Pb(НК); [Pl.] I.c. Бештау
133. *A. stolonifera* L. - П. корневищная = Все р-ны(Голаркт.); Aa(НК); [Sp.]
134. *A. tenuis* Sibth. - П. тонкая = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Евро-Сиб.); Pa(НК); [Pl.]
135. *A. gigantea* Roth - П. гигантская = Все р-ны(Голаркт.); Aa(НК); [Sp.]
136. *Calamagrostis arundinacea*(L.)Roth - Вейник тростниковый = ЛН,П,Кисл (Палеаркт.); Pb(НК); [Sp.]
137. ★ *C. canescens*(Web.)Roth (*C. lanceolata* Roth) - В. седующий = Ст[оз. Кравцово: Колмаков, 1928](Европ.); Aa(НК); [Rs.] <Rg>
138. *C. teberdensis* Litv. - В. тебердинский = Кисл(Джинал)(Кавк.); S(НК); [R.]
139. *C. epigeios*(L.)Roth - В. наземный = Все р-ны(Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.]
140. *C. pseudophragmites*(Hall fil.)Koel. - В. ложнотростниковый = KE,Ст,ЛН, СК,П,Кисл(Палеаркт.); Aa(НК); [Pl.]
141. *Аpera spica-venti*(L.)Beauv. - Метелица обыкновенная = НК(Палеаркт.); Ra,Rb(T); [R.]
142. *A. interrupta*(L.)Beauv. - М. прерывистая = НК,ТБ,М,КН(Общедр.средиз.); Ra(T); [R.]

143. *Holcus lanatus* L. - Бухарник шерстистый = ЛН(Невинномысск, Надзорное), Ст,Кисл(Европ.); Pa(НК); [Sp.]
144. *Trisetum rigidum*(Bieb.)Roem.et Schult. - Трищетинник жёсткий = ЛН(Невинномысск),Кисл(Армено-Иран.); Pa(НК); [Sp.] <Rg>
145. *T. turcicum* Chrtek (*T. sibiricum* Rupr.) - Т. турецкий = П,Кисл(Голаркт.); Pa(НК); [Sp.]
146. *T. flavescens*(L.)Beauv. (*T. pratense* Pers.) - Т. желтоватый = [Ст(Ставрополь): Колмаков, 1928],П,Кисл(Субсредиз\*.); Pa(НК); [Sp.]
147. *Trisetaria cavanillesii*(Trin.)Maire (*Trisetum cavanillesii* Trin.) - Трисетария Каванилля = М(Терские пески),КН(Общедр.средиз.); Db(Т); [Sp.]
148. *Ventenata dubia*(Leers)Coss. - Вентената сомнительная = М,Ст,ЛН,СК,П(Зап.др.средиз.); S(Т); [Sp.]
149. *Avena fatua* L. - Овсяг пустой = Все р-ны(Голаркт.); Ra,Rb(Т); [Sp.]
150. *A. persica* Steud. (*A. ludoviciana* Durieu) - О. персидская = Все р-ны(Общедр.средиз.); Ra,Rb(Т); [Sp.]
151. *A. eriantha* Durieu - О. мохнатоцветковый = М,КН[Цвелёв, 1976](Общедр.средиз.); Da,Db(Т); [Sp.]
152. *Helictotrichon pubescens*(Huds.)Pilg. - Овсец опушённый = Ст,ЛН,П,Кисл(Евро-Сиб.); Pa(НК); [Pl.]
153. *H. adzharicum*(Albov)Grossh. - О. аджарский = ЛН,П,Кисл(Кавк.); Pb,Pc(НК); [Sp.]
154. *Arrhenantherum elatius*(L.)J.et C.Presl - Французский райграс высокий = Ст,ЛН,П,Кисл(Европ.); Pa(НК); [Sp.] <Pp>
155. *Cynodon dactylon*(L.)Pers. - Свиной пальчатый = Все р-ны(Общедр.средиз.); ST,Ra,Rb(НК); [Pl.] <Pp;Pm>
156. *Beckmannia eruciformis*(L.)Host - Бекманья гусеницевидная = Ке,М,Ст,ЛН,СК(Субсредиз\*.); Aa(К); [Sp.]
157. *Sesleria alba* Smith (*S. anatolica* Deyl.) - Сеслерия белая = Кисл(Средиз.); Da(НК); [R.]
158. *S. phleoides* Stev.ex Roem.et Schult. - С. тимофеевковидная = Кисл(Зап.др.средиз.); Da(НК); [R.]
159. *S. heufleriana* Schur - С. Гейфлера = Кисл(Понтич); Da(НК); [R.]
160. *Phragmites australis*(Cav.)Trin.ex Steud. - Тростник южный = Все р-ны(Плюрирег.); Aa(НК); [Pl.] <Pm>
161. *Cleistogenes bulgarica*(Bornm.)Keng (*Diplachne bulgarica*(Bornm.)Bornm.; *Cleistogenes maotica* Klok.et Zoz) - Змеёвка болгарская = Ке,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл,КН(Понт.-Южносиб.); ST,Db(НК); [Sp.]
162. *C. serotina*(L.)Keng. (*Diplachne serotina*(L.)Link) - З. поздняя = М(Средиземн.); ST,Pa(НК); [R.]

163. *Molinia coerulea*(L.) Moench - Молиния голубая = Кисл(Палеаркт.); Pa(НК); [Sp.]
164. *M. litoralis* Host - М. прибрежная = Кисл(Европ.); Aa(НК); [R.]
165. *Eragrostis minor* Host. - Полевичка малая = Все р-ны(Голаркт.); ST,Ra(T); [Sp.]
166. *E. collina* Trin. (*E. arundinacea*(L.) Roshev.) - П. холмовая = ТБ,М,П,КН (Субтуран\*.); ST,Dc(НК); [Sp.]
167. *E. pilosa*(L.) Beauv. - П. волосистая = Ст,ЛН(Голаркт.); Rb(T); [R.]
168. *Koeleria caucasica*(Domin) V.Fedtsch. - Тонконог кавказский = Ст,П,Кисл (Вост.др.средиз.); Pb(НК); [Sp.]
169. *K. luersennii*(Domin) Domin - Т. Люерсена = Прик,ТБ,Ст,ЛН,П,Кисл (Эукавк.); ST(НК); [Sp.]
170. *K. cristata*(L.) Pers. - Т. гребенчатый = Все р-ны(Голаркт.); ST(НК); [Pl.] <Pp>
171. *Melica transsilvanica* Schur - Перловник трансильванский = Все р-ны (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.]
172. *M. taurica* C.Koch - П. крымский = Все р-ны(Вост.др.средиз.); ST(НК); [Sp.]
173. *M. altissima* L. - П. высокий = Прик,ТБ,М,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Субтуран\*.); Pa(НК); [Sp.]
174. *M. uniflora* Retz. - П. одноцветковый = ЛН(Европ.); S(НК); [Sp.]
175. *M. nutans* L. - П. поникающий = Ст,ЛН,П,Кисл(Евро-Сиб.); S(НК); [Sp.]
176. *M. picta* C.Koch - П. пёстрый = Прик,М,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]
177. *Briza australis* Procul. - Трясунка южная = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Европ.); Pa(НК); [Sp.]
178. *B. elatior* Sibth. et Smith - Т. высокая = П,Кисл(Вост.др.средиз.); Pb(НК); [Sp.] <Po>
179. *Aeluropus littoralis*(Gouan) Parl. - Прибрежница обыкновенная = МД,АИ,НК, Прик,М,Ст,КН(Общедр.средиз.); Dc(НК); [Sp.]
180. *Ae. pungens*(Vieb.) C.Koch - П. колючая = КН(Субтуран\*.); Dc(НК); [R.]
181. *Dactylis glomerata* L. - Ежа сборная = Все р-ны(Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pp>
182. *D. polygama* Horvat. - Е. многобрачная = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Европ.); S(НК); [Pl.] <Pp>
183. *Cynosurus cristatus* L. - Гребневик обыкновенный = Ст[Колмаков, 1928] (Субсредиз\*.); S,Pa(НК); [R.]
184. *Sclerochloa dura*(L.) Beauv. - Жесткоколосница твёрдая = Все р-ны (Общедр.средиз.); Rb(T); [Pl.]
185. *Poa compressa* L. - Мятлик сплюснутый = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,П,Кисл (Европ.); Pa(НК); [Sp.]
186. *P. annua* L. - М. однолетний = Все р-ны(Плурирег.); Rb(T); [Pl.]
187. *P. bulbosa* L. - М. луковичный = Все р-ны(Палеаркт.); ST,Rb(НК:ephd); [Pl.]

188. *P. crispa* Thuill. - М. живородящий = Все р-ны(Палеаркт.); ST,Rb (НК:ephd); [Pl.]
189. *P. sylvicola* Guss. - М. лесной = Все р-ны(Зап.др.средиз.); S(НК); [Sp.]
190. *P. trivialis* L. - М. обыкновенный = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Aa(НК); [Pl.]
191. *P. pratensis* L. - М. луговой = Все р-ны(Голаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pp>
192. *P. angustifolia* L. - М. узколистый = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,ST(НК); [Sp.] <Pp>
193. *P. iberica* Fisch.et C.A.Mey. - М. грузинский = П,Кисл(Кавк.); Pb(НК); [Pl.] <Pp>
194. *P. badensis* Haenke (*P. alpina auct.*) - М. баденский = Ст,ЛН,П,Кисл (Голаркт.); Pa(НК); [Pl.]
195. *P. sterilis* Bieb. - М. бесплодный = Ст,ЛН,СК,П(Понтич.); Da(НК); [R.]
196. *P. nemoralis* L. - М. боровой = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Панбор.); S(НК); [Pl.]
197. *P. palustris* L. - М. болотный = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П(Голаркт.); Aa(НК); [Sp.]
198. *Catabrosella humilis*(Bieb.)Tzvel. (*Colpodium humile*(Bieb.)Griseb.) - Катаброзелла низкая = Ст,СК,П(Субтуран\*.); Db(НК); [R.] l.c. Бештау
199. *Colpodium versicolor*(Stev.)Schmalh. - Кольподиум разноцветный = П,Кисл (Кавк.); Pb(НК); [Sp.]
200. *Catabrosa aquatica*(L.)Beauv. - Поручейница водная = Все р-ны(Голаркт.); Aa(НК); [Pl.]
201. *Glyceria fluitans*(L.)R.Br. - Манник наплывающий = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,П, Кисл(Панбор.); Aa(НК); [Sp.]
202. *G. notata* Chevall. (*G. plicata*(Fries)Fries) - М. складчатый = МД,Ст,ЛН, П,Кисл(Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.]
203. *G. nemoralis*(Uechtr.)Uechtr.et Koern. - М. дубравный = ЛН,СК,П(Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]
204. *G. arundinacea* Kunth - М. тростниковый = КЕ,Прик,ТБ,НК(Палеаркт.); Aa(НК); [R.]
205. *G. maxima*(C.Hartm.)Holub (*G. aquatica*(L.)Wachlenb.) - М. большой = КЕ, Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П(Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.]
206. *Ruccinellia distans*(Jacq.)Parl. (*Atropis distans*(Jacq.)Griseb.) - Бескильница расставленная = Все р-ны(Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.]
207. *P. gigantea*(Grossh.)Grossh. - Б. крупная = СК,П(Туранск.); Aa,Dc(НК); [R.]
208. *P. roscilantha*(C.Koch)Grossh. - Б. пестроцветковая = МД(Туранск.); Aa,Dc(НК); [Sp.]
209. *P. dolicholepis* V.Krecz. - Б. длинночешуйчатая = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,СК (Субтуран\*.); Aa,Dc(НК); [Sp.]

210. *P. fominii* Bilyk - Б. Фомина = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,Ст,СК(Понтич.); Db,Дс(НК); [R.]
211. *Leucopoa sclerophylla*(Boiss.et Hohen.)V.Krecz.et Vobr. (*Festuca sclerophylla* Boiss et Bischoff.) - Беломятлик жестколистный = СК,П,Кисл(Армено-Иран.); Da(НК); [R.] <Po>
212. *Festuca gigantea*(L.)Vill. - Овсяница исполинская = Ст,СК,ЛН,П,Кисл (Палеаркт.); S(НК); [Pl.]
213. *F. pratensis* Huds. - О. луговая = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,ST(НК); [Pl.] <Pr>
214. *F. regeliana* Pavl. (*F. orientalis*(Hack.)V.Krecz.et Vobr.) - О. Регеля = Все р-ны (Палеаркт.); Pa(НК); [Sp.]
215. *F. drymeia* Mert.et Koch (*F. montana* Bieb.) - О. горная = ЛН,СК,П,Кисл (Кавк.-Эвкс.); S(НК); [Pl.]
216. *F. altissima* All. (*F. sylvatica*(Poll.)Holub) - О. высокая = Ст,СК,П,Кисл (Палеаркт.); S(НК); [Sp.]
217. *F. rubra* L. - О. красная = Ст(Ставрополь),П,Кисл(Палеаркт.); Pb,Рс(НК); [Sp.]
218. *F. woronowii* Hack. - О. Воронова = Кисл(Кавк.); Pb(НК); [Pl.]
219. *F. heterophylla* Lam. - О. разнолистная = П(Машук),Кисл(Европ.); S(НК); [R.]
220. *F. ovina* L. - О. овечья = Все р-ны(Европ.); ST(НК); [Sp.] <Pr>
221. *F. beckeri*(Hack.)Trautv. - О. Беккера = Прик(Бешпагир)(Понт.-Южносиб.); Dd(НК); [R.]
222. *F. valesiaca* Gaudin - О. валезская = Все р-ны(Палеаркт.); ST(НК); [Pl.] <Pr>
223. *F. saxatilis* Schur - О. скальная = Кисл(Зап.др.средиз.); Da(НК); [Sp.]
224. *Vulpia myuros*(L.)C.C.Gmel. - Вульпия мышехвостниковая = П(Общедр. средиз.); SD(НК); [R.]
225. *Bromopsis inermis*(Leys.)Holub - Кострец безостый = Все р-ны (Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pr>
226. *V. biebersteinii*(Roem.et Schult)Holub - К. Биберштейна = П[Бештау: Кононов, Танфильев, 1987],Кисл(Кавк.); Da(НК); [Sp]
227. *V. benekenii*(Lange)Holub - К. Бенекена = Ст,ЛН,П(Палеаркт.); S(НК); [Sp.]
228. *V. riparia*(Rehm.)Holub - К. береговой = Все р-ны(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.] <Pr>
229. *V. variegata*(Bieb.)Holub - К. пёстрый = П,Кисл(Ирано-Туран.); Pb,Рс(НК); [Sp.] <Pr>
230. ★*V. gordjaginii*(Tzvel.)Galushko - К. Гордягина = Ст,СК,П,Кисл(Предкавк.); Da(НК); [Sp.] <Ее> l.c. ст. Подкумок (рис. 1)
231. *Anisanta sterilis*(L.)Nevski - Анизанта стерильная = Все р-ны(Общедр. средиз.); ST,Ra,Rb(Т:eph); [Sp.]
232. *A. tectorum*(L.)Nevski - А. кровельная = Все р-ны(Голаркт.); ST,Ra,Rb (Т:eph); [Sp.]

233. *Bromus arvensis* L. - Костёр полевой = КЕ,МД,АИ,Прик,НК,Ст,ЛН,П  
(Палеаркт.); Pa,ST(T); [Sp.]
234. *B. secalinus* L. - К. ржаной = Ст,ЛН,СК,П(Палеаркт.); Ra(T); [R.]
235. *B. mollis* L. - К. мягкий = Все р-ны(Голаркт.); Pa,Ra(T); [Sp.]
236. *B. scorpius* L. - К. метельчатый = Все р-ны(Вост.др.средиз.); Aa,Rb(T); [Pl.]
237. *B. commutatus* Schrad. - К. переменчивый = Все р-ны(Европ.); Pa(T); [Sp.]
238. *B. squarrosus* L. - К. растопыренный = Все р-ны(Средиземн.); ST,Rb(T); [Sp.]
239. *B. japonicus* Thunb. - К. японский = Все р-ны(Палеаркт.); ST,Ra(T); [Sp.]
240. *Brachypodium sylvaticum*(Huds.)Beauv. - Коротконожка лесная = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,П,Кисл(Палеаркт.); S(НК); [Pl.]
241. *B. pinnatum*(L.)Beauv. - К. перистая = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,П,Кисл(Палеаркт.); S(НК); [Sp.]
242. *B. rupestre*(Host.)Roem.et Schult - К. скальная = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,П,Кисл(Евро-Кавк.); S(НК); [R.]
243. *Lolium temulentum* L. - Плевел опьяняющий = Ст,ЛН(Палеаркт.); Rb(T); [R.]
244. *L. persicum* Boiss.et Hohen. - П. персидский = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,П(Ирано-Туран.); Db,Rb(T); [Sp.]
245. *L. perenne* L. (*L. marschallii* Stev.) - П. многолетний = Все р-ны(Голаркт.); Pa,Rb(НК); [Sp.] <Pp>
246. *L. rigidum* Gaudin - П. жёсткий = Ст(Зап.др.средиз.); ST,Db(T); [Sp.]
247. *L. marschallii* Stev. - П. Маршалла = Кисл(Кавк.); Pa(НК); [R.]
248. *Pholiurus pannonicus*(Host)Trin. - Чешуехвостник венгерский = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,СК(Субтуран\*.); Dc(T); [R.]
249. *Elymus caninus*(L.)L. (*Roegneria canina*(L.)Nevski; *Elytrigia canina*(L.)Drob.) - Элимус собачий = Ст,П,Кисл(Палеаркт.); Aa(НК); [R.]
250. *Elytrigia gracillima*(Nevski)Nevski - Пырей стройный = ЛН,СК,П,Кисл(Эукавк.); Da(НК); [R.]
251. ★*E. dshinalica* Sablina - П. джинальский = Кисл(Кавк.); Da(НК); [R.] <Es> l.c. Кисловодск (рис. 2)
252. ★★*E. stipifolia*(Czern.ex Nevski)Nevski - П. ковылелистный = КЕ,АИ,НК,Прик,ТБ,Ст,СК,Кисл(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [R.]
253. *E. elongata*(Host)Nevski - П. удлинённый = Все р-ны(Средиземн.); Dc(НК); [Sp.] <Pp>
254. *E. repens*(L.)Nevski - П. ползучий = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,ST,Ra,Rb (НК); [Pl.] <Pm;Pp>
255. *E. pseudocesia*(Pacz.)Prokud. - П. ложносивоватый = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,СК(Понт.-Южносиб.); ST,Db(НК); [Sp.] <Pp>
256. *E. intermedia*(Host)Nevski - П. средний = Все р-ны(Общедр.средиз.); ST(НК); [Sp.] <Pp>



257. *E. trichophora*(Link)Nevski - П. волосоносный = ЛН,Ст,СК,П,Кисл  
(Вост.др.средиз.); Pa,ST(НК); [Sp.] <Pp>
258. *E. pulcherrima*(Grossh.)Nevski - П. красивейший = П,Кисл(Армено-Иран.);  
ST(НК); [R.]
259. *E. maeotica*(Prokud.)Prokud. - П. азовский = КЕ,МД,НК,Прик,ТБ,СК,КН  
(Туранск.); Dc(НК); [Sp.] <Pp>
260. *Agropyron fragile*(Roth)P.Gandardy - Житняк ломкий = НК,Прик,ТБ,Ст,СК  
(Понтич.); Db,Dd(НК); [Pl.] <Pp>
261. *A. desertorum*(Fisch.ex Link)Schult. - Ж. пустынный = НК,Прик,ТБ,М,Ст,СК  
(Понтич.); Da,Dd(НК); [Sp.] <Pp>
262. *A. pectinatum*(Vieb.)Beauv. (*A. imbricatum Roem.et Schult.*) - Ж. гребенчатый =  
Все р-ны(Палеаркт.); ST(НК) [Pl.] <Pp>
263. *Eremopyrum triticeum*(Gaertn.)Nevski - Мортук пшеничный = КЕ,МД,АИ,НК,  
Прик,ТБ,М,Ст,ЛН,СК(Субтуран\*.); Dc(T); [Sp.]
264. *E. orientale*(L.)Jaub.et Spach - М. восточный = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,  
Ст,СК(Общедр.средиз.); Db,Dc(T); [Sp.]
265. *Secale sylvestre* Host - Рожь лесная = Все р-ны(Субтуран\*.); Db(T); [Sp.]  
<Pp>
266. *S. cereale* L. - Р. посевная = Все р-ны(Туранск.); Ra,Rb(T); [Sp.] <Pp>
267. *Aegilops cylindrica* Host - Эгилопс цилиндрический = Все р-ны (Субтуран\*.);  
Pa,ST,Rb(T); [Pl.]
268. *Ae. tauschii* Coss. - Э. Тауша = НК,М(совхоз Роцинский)(Ирано-Туран.);  
ST,Rb(T); [Sp.]
269. ★ ★ *Hordelymus europaeus*(L.)Harz - Горделимус европейский = Ст,П,Кисл  
(Европ.); S(НК); [R.]
270. *Hordeum violaceum* Boiss.et Huet - Ячмень фиолетовый = П,Кисл(Армено-  
Иран.); Pb(НК); [Sp.]
271. *H. leporinum* Link - Я. заячий = Все р-ны(Вост.др.средиз.); Rb(T); [Pl.]
272. *H. glaucum* Steud. - Я. сизый = КЕ,МД, АИ,НК,КН(Вост.др.средиз.); Dc(T);  
[Sp.]
273. *H. geniculatum* All. - Я. коленчатостебельный = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,  
Ст,СК,П(Субсредиз\*.); Db,Dc,Dd(T); [Sp.]
274. *Psathyrostachys juncea*(Fisch.)Nevski - Ломкоостенник ситниковый = КН  
(северная часть)(Вост.др.средиз.); Dc(T); [R.]
275. *Aneurolepidium ramosum*(Trin.)Nevski (*Leymus ramosus*(Trin.)Tzvel.) - Вострец  
ветвистый = НК,КН(Субтуран\*.); Dc(НК); [R.]
276. *Leymus racemosus*(Lam.)Tzvel. - Колосняк ветвистый = МД,КН (Субтуран\*.);  
Db(НК); [Pl.]

Сем. 28. CYPERACEAE Juss. - СОКОКОВЫЕ

277. *Cyperus fuscus* L. - Сыть чёрно-бурая = Все р-ны(Палеаркт.); Аа(Т); [Sp.]
278. *C. glomeratus* L. - С. скученная = Ст,СК,П(Палеаркт.); Аа(Т); [R.]
279. *Juncellus pannonicus*(Jacq.)Clarke (*Acorellus pannonicus*(Jacq.)Palla) - Аирник венгерский = КН(Субтуран\*.); Аа(Т); [R.]
280. *Ruscus flavescens*(L.)Beauv.ex Reichenb. - Ситовник желтеющий  
КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П(Голаркт.); Аа(Т); [Sp.]
281. *Vaeothrion pumilum*(Vahl)A.et D.Love - Беотрион маленький = Кисл (Палеаркт.); Аа(К); [R.]
282. *Scirpoides holoschoenus*(L.)Sojak (*Holoschoenus vulgaris* Link, *H. romanus*(L.)Fritsch) - Камышник (Голосхенус)обыкновенный = КЕ,Ст,ЛН,СК,П (Общедр. средиз.); Аа(НК); [Sp.]
283. *Scirpus sylvaticus* L. - Камыш лесной = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Евро-Сиб.); С,Аа(НК); [Sp.]
284. *Schoenoplectus mucronatus*(L.)Palla. (*Scyrpus mucronatus* L.) - Шеноплектус остроконечный = ЛН(Кочубеевское)[Кононов, Танфильев, 1987](Палеаркт.); Аа(НК); [R.]
285. *Sch. setaceus* (L.)Palla (*S. setaceus* L.) - Ш. щетинковидный = П,Кисл (Палеаркт.); Аа(Т); [Sp.]
286. *Sch. lacustris*(L.)Palla (*S. lacustris* L.) - Ш. озёрный = Все р-ны(Панбор.); Ab(К); [Pl.]
287. *Sch. tabernemontanii*(C.C.Gmel.)Palla (*S. tabernemontanii* C.C.Gmel.) - Ш. Табернемонтана = Все р-ны(Палеаркт.); Ab(К); [Sp.]
288. *Sch. triqueter*(L.)Palla (*S. triqueter* L.) - Ш. трёхгранный = МД,НК,ТБ,КН (Голаркт.); Аа(НК); [Sp.]
289. *Sch. litoralis*(Schrاد.)Palla (*S. litoralis* Schrad.) - Ш. приморский = МД,НК, ЛН,КН(Туранск.); Аа(НК); [R.]
290. *Sch. hippolyti* (V.Krecz.)V.Krecz. (*S. hippolyti* V.Krecz.) - Ш. гиполитный = ЛН(Невинномысск),П(Ессентуки)[Егорова, 1991](Палеаркт.); Ab(К); [Rs.]
291. *Bolboschoenus maritimus*(L.)Palla (*B. compactus*(Hoffm.)Drob.) - Клубнекамыш морской = Все р-ны(Голаркт.); Аа,Ab(К); [Pl.]
292. *Blumis compressus*(L.)Panz.ex Link - Блимус сжатый = Кисл(Европ.); Аа(К); [Sp.]
293. *Eleocharis austriaca* Hayek (*E. leptostylopodiata* Zinserl.) - Болотница австрийская = Ст,СК,П,Кисл(Палеаркт.); Аа,Ab(К); [Sp.]
294. *E. intersita* Zinserl. - Б. промежуточная = МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,СК (Голаркт.); Аа(НК); [R.]
295. *E. palustris*(L.)Roem.et Schult. (*E. crassa* Fisch.et C.A.Mey. ex Zinserl.) - Б. болотная = Все р-ны(Субтуран\*.); Аа,Ab(К); [Sp.]

296. *E. mitracarpa* Steud. (*E. argyrolepidoidea* Zinserl., *E. equisetiformis* (Meinsh.) B. Fedtsch.) - Б. ложносеребристочешуйчатая = НК, КН (Понтич.); Аа, Ab (К); [R.]
297. *E. acicularis* (L.) Roem. et Schult. - Б. игольчатая = МД (Голаркт.); Аа, Ab (К); [Sp.]
298. *E. uniglumis* (Link) Schult. (*E. multiseta* Zinserl.) - Б. одночешуйчатая = КЕ, МД, НК, ТБ, Ст, КН (Субтуран\*.); Аа, Dc (НК); [R.]
299. ★ ★ *Cladium mariscus* (L.) Pohl - Меч-трава обыкновенная = Ст, П (Зап. др. средиз.); Ab (К); [Rs.]
300. *Carex hirta* L. - Осока волосистая = Все р-ны (Европ.); Аа (К); [Sp.]
301. ★ *C. lasiocarpa* Ehrh. - О. волосистоплодная = Ст [Галушко, 1979] (Палеаркт.); Ab (К); [R.] <Rg>
302. *C. vesicaria* L. - О. пузырчатая = Все р-ны [Егорова, 1991] (Палеаркт.); Ab (К); [Sp.]
303. *C. acutiformis* Ehrh. - О. островатая = Все р-ны (Палеаркт.); Ab (К); [Pl.]
304. *C. riparia* Curt. - О. береговая = Все р-ны (Палеаркт.); Ab (К); [Pl.]
305. *C. melanostachya* Vieb. ex Willd. - О. черноколосая = Все р-ны (Палеаркт.); Аа (НК); [Pl.]
306. *C. pseudocyperus* L. - О. ложносыть = Все р-ны [Егорова, 1991] (Голаркт.); Ab (К); [R.] <Rg>
307. *C. hordeistichos* Vill. - О. ячменорядная = Все р-ны [Егорова, 1991] (Субсредиз\*.); Ab (К); [Sp.]
308. *C. secalina* Willd. ex Wachlenb. - О. ржаная = Ст, П (Евро-Сиб.); Аа (НК); [R.]
309. *C. sylvatica* Huds. - О. лесная = КЕ, Прик, ТБ, НК, ЛН, Ст, П, СК (Европ.); S (НК); [Pl.]
310. *C. pendula* Huds. - О. пониклая = Ст, ЛН, П (Субсредиз\*.); S (НК); [Sp.]
311. *C. cuspidata* Host - О. заострённая = Ст, ЛН (Зап. др. средиз.); S (НК); [Sp.]
312. ★ *C. depauperata* Curt. ex With. - О. обеднённая = Ст (Европ.); S (НК); [R.] <Rg>
313. *C. michelii* Host. - О. Микели = Все р-ны (Европ.); Pa (НК); [Pl.]
314. *C. vaginata* Tausch. - О. влагищная = [Ст: Ставрополь, Егорова, 1991] (Голаркт.); Ab (НК); [R.]
315. ★ *C. panicea* L. - О. просяная = Ст [Ставрополь: Егорова, 1991] (Палеаркт.); Аа (НК); [R.] <Rg>
316. *C. depressa* Link (*C. transsilvanica* Schur) - О. отжатая = Ст, ЛН (Субсредиз\*.); S, Pa (НК); [R.]
317. *C. caryophyllea* Latourr. - О. гвоздичная = Ст, П (Палеаркт.); Pa, ST (НК); [Pl.]
318. *C. diluta* Vieb. - О. светлая = Все р-ны (Туранск.); Ab (К); [Pl.]
319. *C. hallerana* Asso - О. Галлира = Ст (Средиземн.); Da (НК); [R.]
320. *C. humilis* Leyss. - О. низкая = Ст, СК, П (Евро-Сиб.); Pa (НК); [Sp.] <Pp>
321. *C. digitata* L. - О. пальчатая = Все р-ны [Егорова, 1991] (Европ.); S (НК); [Pl.]

322. *C. alba* Scop. - О. белая = Кисл(Евро-Сиб.); Да(НК); [Sp.]
323. *C. pallescens* L. - О. бледноватая = Ст,ЛН,П(Голаркт.); Ра(НК); [Pl.]
324. *C. tomentosa* L. - О. шерстистая = Все р-ны(Евро-Сиб.); Ра,СТ(НК); [Pl.]
325. ★*C. ericetorum* Poll. - О. верещатниковая = Ст(Евро-Сиб.); Ра(НК); [Rs.]  
<Rg>
326. *C. schkuhrii* Willd. (*C. bordzilowskii* V.Krecz., *C. liparocarpos* Gaudin) - О. Шкура = Ст,СК,П,КН(Кавк.); СТ(НК); [Sp.]
327. *C. supina* Willd.ex Wahlenb. - О. приземистая = Ке,МД,АИ,НК,Прик,ТБ, М,Ст(Евро-Сиб.); СТ(НК); [Sp.]
328. *C. acuta* L. - О. острая = Ст,ЛН(Евро-Сиб.); Аб(К); [R.]
329. *C. paniculata* L. - О. метельчатая = П(Европ.); Аб(К); [R.]
330. *C. vulpina* L. - О. лисья = Ст,ЛН,П,КН(Евро-Сиб.); Аб(К); [Pl.]
331. *C. otrubae* Podp. - О. Отрубы = Все р-ны(Субсредиз\*.); Аб(К); [Pl.]
332. *C. divulsa* Stokes - О. прерванная = Все р-ны[Егорова, 1991(Голаркт.); S(НК); [Sp.]
333. *C. polyphylla* Kar.et Kir. - О. многолистная = Все р-ны[Егорова, 1991] (Палеаркт.); S(НК); [Sp.]
334. *C. muricata* L. - О. муриката = Прик[с. Спицевка: Егорова, 1991](Панбор.); S(НК); [R.]
335. *C. contigua* Норре - О. соседняя = Ст,ЛН,П(Палеаркт.); S,Ра(НК); [Sp.]
336. ★*C. disticha* Huds. - О. двурядная = Ст[Ставрополь: Егорова, 1991] (Палеаркт.); Аа(НК); [R.] <Rg>
337. *C. colchica* J.Gay - О. колхидская = Все р-ны(Понт.-Южносиб.); Db(НК); [Sp.]
338. *C. praesox* Schreb. - О. ранняя = Ке,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,П,КН(Палеаркт.); СТ,Db(НК); [Pl.]
339. *C. divisa* Huds. - О. раздельная = МД,АИ,НК,М,КН(Палеаркт.); Dc(НК); [Sp.]
340. *C. stenophylla* Wahlenb. - О. узколистная = МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,СК, П(Субтуран\*.); СТ,SD(НК); [R.]
341. *C. physodes* Bieb. - О. вздутая = НК,КН[р.Кума: Егорова, 1991](Туранск.); Db(НК); [R.]
342. *C. remota* L. - О. раздвинутая = Ст[Ставрополь: Егорова, 1991], П(Палеаркт.); S,Аа(НК); [Sp.]

#### Сем. 29. ARACEAE Juss. - АРОИДНЫЕ

343. *Arum elongatum* Stev. - Аронник удлинённый = Ст,ЛН,П(Зап.др.средиз.); S(К); [Sp.] <Pm>
344. *A. orientale* Bieb. - А. восточный = Ст,ЛН,П,Кисл(Субкавказ\*.); S(К); [Sp.] <Pm>

345. *A. albispalum* Stev. ex Ledeb. - А. белокрылый = Ст,ЛН,П,Кисл (Субкавк\*.); S(К); [Pl.]

Сем. 30. LEMNACEAE S.F.Gray - РЯСКОВЫЕ

346. *Lemna trisulca* L. - Ряска тройчатая = МД,НК,Ст,ЛН(Голаркт.); Ac(T); [R.]

347. *L. minor* L. - Р. маленькая = Все р-ны(Голаркт.); Ac(T); [Pl.] <Pm>

348. *L. turionifera* Landolt - Р. туриононосная = Ст[Ставрополь: Цвелёв, 1990] (Панбор.); Ac(T); [Rs.] <Rg>

349. *Telmatophace gibba*(L.)Schleid. (*L. gibba* L.) - Тельматофака горбатая = Ст,ЛН (Голаркт.); Ac(T); [R.] <Rg>

Сем. 31. COMMELINACEAE R.Br. - КОММЕЛИНОВЫЕ

350. *Commelina communis* L. - Коммелина синеглазка = Ст,ЛН,Кисл(Адвент. [Вост.Азия]); Ra,Rb(T); [R.]

Сем. 32. JUNCACEAE Juss. - СИТНИКОВЫЕ

351. *Luzula pilosa*(L.)Willd. - Ожика волосистая = Ст,П,Кисл(Панбор.); S(НК); [Pl.]

352. *L. multiflora*(Ehrh.)Lej. - О. многоцветковая = Ст,П,Кисл(Евро-Сиб.); Pa(НК); [Sp.]

353. *L. campestris*(L.)DC. (*L. subpilosa* Gilib.) - О. полевая = КЕ,Ст,ЛН,СК,П, Кисл(Европ.); S,Pa(НК); [Sp.]

354. *Juncus inflexus* L. - Ситник отклоняющийся = Все р-ны(Субкавк\*.); Aa(НК); [Pl.]

355. *J. effusus* L. - С. расходящийся = Все р-ны(Европ.); Aa(НК); [Pl.]

356. *J. bufonius* L. - С. лягушечий = Все р-ны(Голаркт.); Aa(T); [Pl.]

357. *J. tenageia* Ehrh. ex L.fil. - С. мелководный = Кисл(Европ.); Aa,Ab(К); [R.]

358. *J. sphaerocarpos* Nees - С. шароплодный = Кисл(Евро-Сиб.); Aa(T); [R.]

359. *J. compressus* Jacq. - С. сплюснутый = Все р-ны(Евро-Сиб.); Aa(НК); [Pl.]

360. *J. gerardii* Loisel. - С. Жерара = Все р-ны(Палеаркт.); Aa(НК); [Pl.]

361. *J. soranthus* Schrenk - С. кучкоцветный = МД,АИ,Прик,ТБ,НК(Субтуран\*.); Aa,Dc(НК); [R.]

362. *J. atratus* Krock. - С. темноцветный = Ст(Палеаркт.); Aa(НК); [R.]

363. *J. articulatus* L. - С. членистый = Все р-ны(Палеаркт.); Aa(НК); [Pl.]

Сем. 33. MELANTHIACEAE Batsch. (LILIACEAE) - МЕЛАНТИЕВЫЕ

364. *Veratrum lobelianum* Bernh. - Чемерица Лобеля = Кисл(Кавк); Pb(НК); [Pl.] <Pt;Pm>

Сем. 34. COLCHICACEAE DC.(LILIACEAE) - БЕЗВРЕМЕННИКОВЫЕ

365. ★ *Merendera trigyna* (Stev. ex Adams) Stapf - Мерендера трёхстолбиковая = М,ЛН, СК,П,Кисл(Ирано-Туран.); Pa,ST(K:ephd); [Sp.] <Po>
366. ★ *M. eichleri* (Regel) Boiss. - М. Эйхлера = Прик,ТБ,НК,М,КН(Эукавк.); Pa,ST (K:ephd); [R.] <Po>
367. ★ ★ *Colchicum laetum* Stev. - Безвременник яркий = Все р-ны, кроме Кисл (Предкавк.); Pa,ST(K:ephd); [Sp.] <Esub;Pmel;Po>
368. ★ ★ *C. umbrosum* Stev. - Б. теневой = Ст,ЛН,СК,П(Георгиевск)(Субкавк\*.); S,Pa(K:ephd); [R.] <Pt;Pm;Po;Pmel>

Сем. 35. ASPHODELACEAE Juss. (LILIACEAE) - АСФОДЕЛОВЫЕ

369. ★ *Asphodeline lutea* (L.) Reichenb. - Асфоделина жёлтая = Кисл(Средиз.); Da(K); [Rs.] <Rx;Po>
370. ★ ★ *A. tenuior* (Vieb.) Ledeb. - А. тонкая = П,Кисл (Предкавк.); Pa,ST, Da(НК); [Rs.] l.c. Бештау <Esub>
371. ★ ★ *A. taurica* (Pall. ex Vieb.) Endl. - А. крымская = П,Кисл(Кр.-Новоросс.); Pa,ST(НК); [Sp.] <Rx>
372. ★ ★ *Eremurus spectabilis* Vieb. - Череш (Эремурус) представительный = Прик,ТБ,Ст,СК,П (Субкавк\*.); ST(НК); [R.] l.c. pp. Кума и Сабля

Сем. 36. ANTHERICACEAE J.G. Agardh (LILIACEAE) - ВЕНЕЧНИКОВЫЕ

373. ★ *Anthericum ramosum* L. - Венечник ветвистый = П[Танфильев, Кононов, 1987],Кисл(Европ.); Pa,ST(K); <Po>

Сем. 37. LILIACEAE Juss. - ЛИЛЕЙНЫЕ

374. *Gagea minima* (L.) Ker-Gawl. - Гусиный лук малый = Прик,ТБ,Ст,СК,П (Европ.); S(K:ephd); [R.]
375. *G. lutea* (L.) Ker.-Gawl. - Г.л. жёлтый = КЕ,Ст,ЛН,СК,П(Панбор.); S(K:ephd); [Sp.] <Pm>
376. *G. helenae* Grossh. - Г.л. Елены = П,Кисл(Эукавк.); S(K:ephd); [R.]
377. *G. pusilla* (F.W.Schmidt) Schult. et Schult. fil. - Г.л. маленький = КЕ,МД,АИ, НК,Прик,ТБ,М,Ст,ЛН,СК,П(Понт.-Южносиб.); ST(K:ephd); [Sp.]
378. *G. chanae* Grossh. - Г.л. Ханы = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,ЛН,СК,П (Эукавк.); ST(K:ephd); [Sp.]
379. *G. germanae* Grossh. - Г.л. Жермены = П,Кисл(Эукавк.); ST(K:ephd); [R.]
380. *G. dubia* Terr. - Г.л. сомнительный = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст(Субпонт\*.); ST(K:ephd); [R.]
381. *G. taurica* Stev. - Г.л. крымский = Ст,ЛН,СК,П(Предкавк.); ST(K:ephd); [R.]
382. ★ *G. alexeenkoana* Miscz. - Г.л. Алексеенко = П(Эукавк.); Pc(K:ephd); [R.]
383. *G. reticulata* (Pall.) Schult. et Schult. fil. - Г.л. сетчатый = Ст,СК,П(Туранск.); Da,Db(K:ephd); [R.]

384. *G. bulbifera*(Pall.)Salisb. - Г.л. луковичный = Все р-ны(Вост.др.средиз.); ST,Dd(K:ephd); [Sp.]
385. *G. villosa*(Bieb.)Duby (*G. arvensis Dumort.*) - Г.л. мохнатый = КЕ,Ст,СК,П (Субпонт\*.); ST(K:ephd); [R.]
386. ★ *G. artemczukii* A.Krasnova - Г.л. Артемчука = МД[Данилевич, 1995] (Понтич.); Dd(K:ephd); [R.] <Rx>
387. ★ *G. fibrosa*(Desf.)Schult.et Schult.fil. (*G. commutata C.Koch*) - Г.л. фиброзный = ТБ[Данилевич, 1996](Субкавказ\*); ST(K:ephd); [R.]
388. ★ *G. tenuifolia*(Boiss.)Fomin) – Г.л. тонколистный = КН [Данилевич, 2000] (Субкавказ\*); Da,Db,Dd(K:ephd); [Rs.]
389. ★ ★ *Erythronium caucasicum* Woronow - Кандык кавказский = Ст(Ставрополь) (Эвксин.); S(K:ephd); [Rs.] <Rg;Po>
390. ★ ★ *Tulipa gesneriana* L. (*Tulipa schrenkii Regel*) - Тюльпан Геснера = КЕ,МД,АИ, НК,Прик,ТБ,М,Ст,СК,П,КН(Субтуран\*.); ST(K:ephd); [Sp.] <Po>
391. ★ *T. biebersteiniana* Schult.et Schult.fil. - Т. Биберштейна = Все р-ны(Субтуран\*.); ST(K:ephd); [Sp.] l.c. м-ду Моздоком и Кизляром <Po>
392. ★ *T. biflora* Pall. - Т. двуцветковый = МД(Туранск.); ST(K:ephd); [Rs.] <Po>
393. ★ *T. quercetorum* Klok.et Zoz. - Т. дубравный = НК,ТБ,Ст,СК,П(Понтич.); S(K:ephd); [Sp.] <Po>
394. ★ *Fritillaria ophioglossifolia* Freyn et Sint. (*F. lutea Bieb.*) - Рябчик узовниколистный = Кисл (Кавк.); Pb(K:ephd); [Sp.] <Po>
395. ★ ★ *F. caucasica* Adams - Р. кавказский = П,Кисл(Эукавказ.); Da(K:ephd); [Rs.] l.c. Пятигорск <Po>
396. ★ *F. meleagriodes* Partin ex Schult.et Schult.fil. - Р. шахматовидный = Ст(х.Калюжный) (Субтуран\*.); ST,Аа(K:ephd); [R.]<Rg>
397. ★ *Lilium monadelphum* Vieb. - Лилия однобратственная = Ст(?),П,Кисл (Эукавказ.); Pb(K); [Sp.]

#### Сем. 38. NYACINTHACEAE Batsch (LILIACEAE)- ГИАЦИНТОВЫЕ

398. *Scilla sibirica* Haw. - Пролеска сибирская = Все лесные р-ны(Евро-Кавк.); S(K:ephd); [Pl.] <Po>
399. *Ornithogalum ponticum* Zahar. (*O. pyrenaicum auct.*) - Птицемлечник понтийский = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,П(Эукавказ.); Pa(K:ephd); [Pl.]
400. *O. fischerianum* Krasch. - П. Фишера = МД(Субтуран\*.); ST,Dd(K:ephd); [R.]
401. ★ *O. magnum* Krasch.et Schischk. - П. большой = П(Бештау)(Кавк.); S(K:ephd); [R.] <Rg>
402. ★ ★ *O. arcuatum* Stev. - П. дугообразный = Ст,ЛН,СК,П(Предкавказ.); S(K:ephd); [Sp.] l.c. Бештау <Esub>
403. *O. woronowii* Krasch. - П. Воронова = Ст,ЛН,П,Кисл(Эвксин.); Pa(K:ephd); [R.]

404. *O. schmalhauseni* Albov - П. Шмальгаузена = Кисл(Армено-Иран.); Pb(К:ephd); [R.]
405. *O. kochii* Parl. (*O. gussonii* Ten; *O. tenuifolium* auct.) - П. Коха = КЕ,МД, АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Субпонт\*.); ST(К:ephd); [Pl.]
406. ★ *Pusckinia scilloides* Adams - Пушкиния пролесковая = П,Кисл(Субкавказ\*.); Pb(К:ephd); [Sp.] <Po>
407. ★ ★ *Bellevalia sarmatica*(Georgi)Woronow - Беллевалия сарматская = Прик,ТБ, НК,М,Ст,ЛН,СК,П(Понтич.); ST(К:ephd); [R.]
408. ★ *Leopoldia tenuiflora*(Tausch)Heldr. - Леопольдия тонкоцветная = П (Субпонт\*.); ST(К:ephd); [Rs.] <Rx> <Po>
409. *Pseudomuscari pallens*(Bieb.)Garbari (*Muscari pallens*(Bieb.)Fisch.) - Псевдомускари бледный = П,Кисл(Кавк.); ST(К:ephd); [Sp.] <Po>
410. *Muscari muscarimi* Medik. (*M. racemosum*(L.)Mill.) - Мышиный гиацинт кистевидный = Все р-ны(Субсредиз\*.); Pa,ST(К:ephd); [Pl.] <Po>
411. ★ *M. szovitsianum* Baker - М.г. Шовица = П(Бештау)[Танфильев, Кононов, 1987](Кавк.); Dd(К:ephd); [Rs.] <Rx>

#### Сем. 39. ALLIACEAE J.Agardh (LILIACEAE) - ЛУКОВЫЕ

412. ★ *Allium scorodoprasum* L. var. *brachyspatum* Nemirova et Trotzkaja – Лук причесочный форма короткочехольная = Ст(Стрижамент, Ставропольское плато) [Немирова, Троцкая, 2004] (Предкавказ.); Pa(К:ephd); [Rs.]
413. *A. rotundum* L. – Л. круглый = Все р-ны(Субпонт\*.); Pa(К); [Sp.]
414. *A. waldsteinii* G.Don fil. - Л. Вальдштейна = Все р-ны(Понтич.); Pa(К); [Sp.]
415. *A. jajlajae* Vved. - Л. яйлинский = СК,П,Кисл(Субкавказ\*.); Pb(К); [Sp.]
416. *A. erubescens* С.Koch - Л. краснеющий = СК,П,Кисл(Субкавказ\*.); Pa(К); [Sp.]
417. *A. atrovioleaceum* Boiss. - Л. тёмнофиолетовый = Все р-ны(Туранск.); Dd(К); [Sp.]
418. *A. leucanthum* С.Koch - Л. бледноцветный = МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,КН (Эукавказ.); ST,Db(К); [Sp.]
419. *A. fuscovioleaceum* Fomin - Л. тёмнофиолетовый = СК,П(Ирано-Туран.); ST(К); [Sp.]
420. *A. sphaerocephalon* L. - Л. шароголовый = Ст,СК,П,Кисл(Европ.); ST(К); [Sp.]
421. *A. rubellum* Bieb. - Л. красивейший = П(Субкавказ\*.); ST(К); [R.]
422. ★ *A. inaequale* Janka - Л. неравный = Ст,СК,П(Субтуран\*.); ST,Da(К); [Sp.]
423. *A. moschatum* L. - Л. мохнатый = Кисл(Общедр.средиз.); Pb(К); [Sp.]
424. *A. saxatile* Bieb. - Л. каменный = П,Кисл(Субтуран\*.); Da(К); [Sp.]
425. *A. globosum* Bieb.ex Redoute - Л. шаровидный = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Понт.- Южносиб.); Da(К); [Sp.]
426. *A. albidum* Fisch.ex Bieb. - Л. беловатый = Все р-ны(Ирано-Туран.); ST(К); [Pl.]
427. *A. victorialis* L. - Л. победный = Кисл(Голаркт.); Pb(К); [Sp.] <Pa;Pm>



428. *A. pseudoflavum* Vved. - Л. ложножёлтый = П(Ирано-Туран.); ST(K); [R.]
429. *A. raczorskianum* Tuzs. (*A. pulchellum* G.Don fil.) - Л. Пачоского = Все р-ны (Понтич.); ST(K); [Sp.]
430. *A. paniculatum* L. - Л. метельчатый = Все р-ны(Понт.-Южносиб.); ST(K); [Pl.]
431. ★*A. lenkoranicum* Miscz.ex Grossh. - Л. ленкоранский = П(Бештау) [Немирова, Троцкая, 2003] (Субкавк\*); S(K:ephd); [Rs.]
432. *A. rupestre* Stev. - Л. скальный = П,Кисл(Субкавк\*.); Pa(HK); [Sp.]
433. *A. kunthianum* Vved. - Л. Кунта = П,Кисл(Кавк.); ST, Da(K); [Pl.]
434. ★*A. ursinum* L. - Л. медвежий (Черемша) = Ст,П,Кисл(Европ.); S(K); [Pl.] <Pa;Pm>
435. *A. decipiens* Fisch.et Schult.et Schult.fil. - Л. обманывающийся = Ст,ЛН,СК, П,Кисл(Субтуран\*.); ST(K); [Sp;]
436. *A. oleraceum* L. - Л. огородный = Ст(Европ.); Pa,ST(K); [Sp.]

Сем. 40. ASPARAGACEAE Juss. (LILIACEAE) - СПАРЖЕВЫЕ

437. *Asparagus verticillatus* L. - Спаржа мутовчатая = НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Ирано-Туран.); S,Pa(HK); [Sp.]
438. *A. officinalis* L. - С. лекарственная = Все р-ны(Евро-Сиб.); Pa(HK); [Pl.] <Pm;Po>
439. *A. caspius* Schult.et Schult.fil. - С. каспийская = МД,АИ,Прик,ТБ,НК,М (Туранск.); ST(K); [R.]
440. *A. polyphyllus* Stev. - С. многолистная = Все р-ны(Общедр.средиз.); ST(K); [Pl.]
441. *A. persicus* Baker - С. персидская = КН(Туранск.); Pa(HK); [R.]

Сем. 41. CONVALLARIACEAE Horan. (LILIACEAE) - ЛАНДЫШЕВЫЕ

442. ★*Convallaria transcaucasica* Utkin ex Grossh. - Ландыш закавказский = М(Терек), Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Кавк.); S(HK); [Pl.] <Pm;Po>
443. ★*Majanthemum bifolium*(L.)F.W.Schmidt - Майник двулистный = П (окр.Железноводска)[Галушко, 1979](Панбор.); S(K); [Rs.] <Rg;Pm>
444. *Polygonatum verticillatum*(L.)All. - Купена мутовчатая = Кисл(Голаркт.); S(K); [Sp.]
445. *P. orientale* Desf. (*P. polyanthemum*(Bieb.)A.Dietr.) - К. восточная = Ст,ЛН, СК,П,Кисл(Субкавк\*.); S(K); [Sp.]
446. *P. multiflorum*(L.)All. - К. многоцветковая = П,Кисл(Голаркт.); S(K); [Sp.]
447. *P. glaberrimum* C.Koch - К. гладкая = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Кавк.); S(K); [Pl.]
448. *P. ovatum* Miscz.ex Knorr. - К. яйцевидная = Ст,П(Эукавк.); S(K); [Sp.] l.c.  
Минеральные Воды

Сем. 42. TRILLIACEAE Lindl. (LILIACEAE) - ТРИЛЛИЕВЫЕ

449. *Paris quadrifolia* L. - Вороний глаз четырёхлистный = Кисл(Дарьинские высоты)(Евро-Сиб.); S(K); [R.]
450. ★ *P. incompleta* Vieb. - В.г. неполный = Кисл(Дарьинские высоты)(Кавк.); S(K); [Sp.]

Сем. 43 AMARYLLIDACEAE J.St.-Hil. - АМАРИЛЛИСОВЫЕ

451. ★ ★ *Galanthus caucasicus* (Baker) Grossh. - Подснежник кавказский = Ст,ЛН,СК, П,Кисл(Кавк.); S(K:ephd); [Sp.] <Pm;Po>
452. ★ ★ *G. woronowii* Losinsk. - П. Воронова = Кисл[Кравцун, 1989](Эвксин.); S(K:ephd); <Rg;Po>
453. ★ ★ *G. angustifolius* G.Koss. - П. узколистный = П(Предкавк.); S(K:ephd); [Rs.] <Esub> <Pm>
454. ★ ★ *Sternbergia colchiciflora* Waldst.et Kit. - Штернбергия безвременниковая = Ст,П(Средиземн.); ST(K:ephd); [Rs.] <Rx>

Сем. 44. DIOSCOREACEAE R.Br. - ДИОСКОРЕЙНЫЕ

455. *Tamus communis* L. - Тамус обыкновенный (Адамов корень) = Ст,ЛН,СК,П, Кисл(Средиземн.); S(K:lh); [Pl.] <Pm>

Сем. 45. IRIDACEAE Juss. - ИРИСОВЫЕ(КАСАТИКОВЫЕ)

456. ★ *Crocus reticulatus* Stev.ex Adams - Шафран сетчатый = КЕ,МД,АИ,НК, Прик,ТБ,М,Ст,СК,П,Кисл(Понт.-Южносиб.); Pa,ST,S(K:ephd); [Pl.] <Po>
457. ★ ★ *C. speciosus* Vieb. - Ш. видный = Ст(Армено-Иран.); ST(K:ephd); [Rs.] <Rx;Po>
458. ★ *Iris marschalliana* Bobr. (*I. pontica Zapal* ; *I. humilis* Vieb.) - Ирис Маршалла = СК,П,Кисл(Понтич.); Pa(K:ephd); [R.] <Po>
459. ★ *I. pseudacorus* L. - И. жёлтый = МД,НК,М(Палеаркт.); Ab(K); [R.] <Po;Pm>
460. ★ *I. sibirica* L. - И. сибирский = П,Кисл(Евро-Сиб.); Pa,Аа(НК); [Sp.] <Po>
461. ★ *I. colchica* Kem.-Nath. - И. колхидский = П,Кисл(Эвксин.); Pa(K); [Sp.] <Po>
462. ★ ★ *I. notha* Vieb. - И. ненастоящий = КЕ(Егорлык),Ст,СК,П(Предкавк.); Pa(K); [R.] <Esub> л.с. г. Бештау
463. ★ *I. pseudonotha* Galushko - И. ложноненастоящий = НК,М,КН(Кура) (Субтуран\*.); ST,Аа(K); [Sp.] л.с. Величаевское
464. ★ *I. halophila* Pall. - И. солелюбивый = КЕ,Ст,ЛН,СК,П(Понт.-Южносиб.); ST,Dc(K); [Sp.] <Po>
465. ★ *I. furcata* Vieb. (*I. aphylla* L.) - И. вильчатый = Ст,П,Кисл(Евро-Кавк.); Pa(K:ephd); [Sp.] <Po>
466. ★ ★ *I. taurica* Lodd. (*I. pumila* L.) - И. крымский = Все р-ны(Субсредиз\*.); Pa,ST(K:ephd); [Sp.] <Po>

467. ★ ★ *I. scariosa* Willd. ex Link (*I. astrachanica* Rodionenko) - И. кожистый = МД, АИ, НК, М(Туранск.); ST, Db, Dd(К:ephd); [Sp.] <Po>
468. ★ *Gladiolus communis* Bieb. - Шпажник обыкновенный = Ст, П, Кисл (Субкавказ\*.); Pa(К); [Sp.] <Po; Pm>
469. ★ *G. tenuis* Bieb. - Ш. тонкий = КЕ, ЛН, Прик, ТБ, Ст, СК, П, Кисл(Евро-Кавк.); Pa(К); [Sp.] <Po>
470. ★ *G. apterus* Kick. - Ш. бескрылый = Ст(Субпонт.\*); Pa(К); [R.] <Rg; Po>

Сем. 46. ORCHIDACEAE Juss. - ОРХИДНЫЕ

471. ★ *Listera ovata*(L.)R.Br. - Тайник овальный = Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Евро-Сиб.); S(НК); [Sp.]
472. ★ *Neottia nidus-avis*(L.)Rich. - Гнездовка обыкновенная = Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Панбор.); S(К:sap); [Sp.] <Pm>
473. ★ ★ *Cephalanthera rubra*(L.)Rich. - Пыльцеголовник красный = Ст, ЛН, П, Кисл (Панбор.); S(НК); [R.]
474. ★ ★ *C. longifolia*(L.)Fritsch - П. длиннолистный = Кисл(Панбор.); S(НК); [R.]
475. ★ ★ *C. damasonium*(Mill.)Druce - П. дамасонский(крупноцветковый) = КЕ, Прик, ТБ, Ст, СК, П, Кисл(Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]
476. ★ *Epipactis atrorubens*(Hoffm. ex Bernh.)Bess. - Дремлик ржавый = ЛН, П, Кисл (Субсредиз\*.); S(К); [R.]
477. ★ *E. palustris*(L.)Crantz - Д. болотный = Ст, ЛН, П, Кисл(Палеаркт.); S(К); [R.]
478. ★ *E. helleborinae*(L.)Crantz - Д. морозниковый = МД, НК, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Палеаркт.); S(К); [R.]
479. ★ ★ *Limodorum abortivum*(L.)Sw. - Лимодорум недоразвитый = П(Евро-Кавк.); S(К:sap); [Rs.] <Rg>
480. ★ *Herminium monorchis*(L.)R.Br. - Бровник одноклубневой = П, Кисл (Палеаркт.); Pb(К); [R.]
481. ★ *Coeloglossum viride*(L.)C.Hartm. - Пололепестник зелёный = Ст, ЛН, П, Кисл (Панбор.); Pa, Pb(К); [Sp.] <Pm>
482. ★ *Gymnadenia conopsea*(L.)R.Br. - Кокушник комарниковый = Ст, ЛН, П, Кисл (Палеаркт.); Pb(К); [Sp.] <Pm>
483. ★ *Platanthera bifolia*(L.)Rich. - Любка двулистная = ЛН, П(Палеаркт.); S(К); [R.] <Pm>
484. ★ *P. chlorantha*(Cust.)Reichenb. - Л. зеленоцветная = Прик, ТБ, Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Евро-Кавк.); S(К); [Pl.] <Pm>
485. ★ ★ *Traunsteinera globosa*(L.)Reichenb. - Траунштейнера шаровидная = П, Кисл (Субкавказ\*.); Pb(К); [Rs.] <Pm>
486. ★ *Traunsteinera sphaerica*(Bieb.)Schlechter - Т. сферическая = П, Кисл(Кавк.); Pb(К); [R.] <Pm>

487. ★ ★ *Orchis ustulata* L. - Ятрышник обожжённый = П,Кисл(Европ.); Pb(K); [R.] <Pm>
488. ★ ★ *O. purpurea* Huds. - Я. пурпурный = Ст,П,Кисл(Европ.); S,Pa(K); [Rs.] <Pm>
489. ★ ★ *O. simia* Lam. - Я. обезьяний = П(Субсредиз\*.); Pb(K); [Rs.] <Pm>
490. ★ ★ *O. militaris* L. - Я. вооружённый = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.); S,Pa(K); [R.] <Pm>
491. ★ ★ *O. tridentata* Scop. - Я. трёхзубчатый = КЕ,Прик,ТБ,ЛН,Ст,СК,П,Кисл(Субсредиз\*.); Pa(K); [Pl.] <Pm>
492. ★ ★ *O. mascula*(L.)L. - Я. мужской = Ст,ЛН,П,Кисл(Палеаркт.); Pa,Pb(K); [R.] <Pm>
493. ★ ★ *O. coriophora* L. - Я. клопоносный = П,Кисл(Общедр.средиз.); Pb(K); [R.] <Pm>
494. ★ ★ *O. picta* Loisel. - Я. разукрашенный = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П(Субсредиз\*.); Pa(K); [Sp.] <Pm>
495. ★ *Dactylorhiza incarnata*(L.)Soo - Пальчатокоренник мясокрасный = Ст,ЛН,П,Кисл(Палеаркт.); Aa(K); [R.] <Pm>
496. ★ *D. salina*(Turcz.ex Lindl.)Soo (*D. sanasunitensis*(*Fleischm.*)Soo) - П. салина = П,Кисл(Субкавказ\*.); Pb(K); [Sp.] <Pm>
497. ★ *D. flavescens* C.Koch - П. желтоватый = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Субкавказ\*.); Pb(K); [R.] <Pm>
498. ★ *D. iberica*(Bieb.ex Willd.)Soo - П. грузинский = Ст[Колмаков, 1928](Субкавказ\*.); Aa(K); [Rs.]
499. ★ ★ *D. urvilleana*(Steudel)Baumann et Kuenkele (*D. amblyoloba*(*Nevski*)Aver.; *D. triphylla*(C.Koch)Czer.) - П. Урвиля = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Субкавказ\*.); Pb(K); [Sp.] <Pm>
500. ★ ★ *Anacamptis pyramidalis*(L.)Rich. - Анакамптис пирамидальный = П,Кисл(Субсредиз\*.); Pb(K); [R.] <Pm>
501. ★ ★ *Ophris oestifera* Bieb. - Офрис оводоносный = Кисл [Иванов, 1993](Эвксин.); Pa(НК); [Rs.] <Pm>

## **Класс MAGNOLIOPSIDA - МАГНОЛИЕВИДНЫЕ (ДВУДОЛЬНЫЕ)**

### **Сем. 47. SALICACEAE Mirb. - ИВОВЫЕ**

502. *Salix caprea* L. - Ива козья = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.); S(Phm); [Pl.] <Pm;Pmel>
503. *S. aegyptiaca* L.(*S. phlomoides* Bieb.) - И. египетская = ЛН,П(Субпонт\*.); S(Phn); [R.] <Pmel>
504. *S. cinerea* L. - И. серая = Все р-ны(Палеаркт.); Aa,S(Phm); [Sp.] <Pmel>
505. *S. viminalis* L. - И. корзиночная = Ст,П(Палеаркт.); Aa(Phn); [R.] <Pm;Pmel>

506. *S. purpurea* L. - И. пурпурная = Ст,ЛН,П,Кисл(Палеаркт.); Аа(Phn); [Pl.] <Pmel>
507. *S. caspica* Pall. - И. каспийская = М,П(Субтуран\*.); Аа(Phn); [Sp.] <Pmel>
508. *S. triandra* L. - И. трёхтычинковая = МД,НК,М,Ст,СК,П,Кисл (Палеаркт.); Аа(Phn); [Sp.] Pmel
509. *S. alba* L. - И. белая = Все р-ны(Палеаркт.); Аа(Phn); [Pl.] <Pm;Pmel>
510. *S. excelsa* S.G.Gmel. (*S. australoir Anders.*) - И. возвышенная = Все р-ны (Туранск.); Аа(Phms); [Sp.] <Pmel>
511. *S. fragilis* L. - И. ломкая = Ст,ЛН,П,Кисл(Палеаркт.); Аа(Phns); [Sp.] <Pmel>
512. *Populus alba* L. - Тополь белый(Белолистка) = М,Ст,ЛН,П(Палеаркт.); Аа(Phms); [Pl.]
513. *P. canescens*(Ait.)Smith - Т. сереющий = НК[Проханов, 1950](Субкавказ\*.); Аа(Phms); [Sp.]
514. *P. tremula* L. - Т. дрожащий (Осина) = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.); S(Phms); [Pl.] <Pm>
515. *P. nigra* L. - Т. чёрный (Осокорь) = НК,М(Терек),ЛН,П (Палеаркт.); Аа(Phms); [Sp.] <Pm>
516. *P. sosnovskyi* Grossh. - Т. Сосновского = П,КН(Евро-Сиб.); S(Phms); [R.]

Сем. 48. JUGLANDACEAE A.Rich.ex Kunth - ОРЕХОВЫЕ

517. *Juglans regia* L. - Орех грецкий = Все р-ны(Адвент.[Балканы, Малая, Центральная и Восточная Азия]; S(Phms); <Pa>

Сем. 49. CORYLACEAE Mirb.(BETULACEAE) - ЛЕЩИНОВЫЕ

518. ★ ★ *Ostrya carpinifolia* Scop - Хмелеграб обыкновенный = Кисл(Эвксин.); S(Phms); [R.] <Rt>
519. *Carpinus caucasica* Grossh. (*Carpinus betulus* L.) - Граб кавказский = КЕ,Прик, ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Кавк.); S(Phms); [Soc.]
520. *Corylus avellana* L. - Лещина обыкновенная = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН, П,Кисл(Палеаркт.); S(Phn); [Pl.] <Pa;Pm>

Сем. 50. BETULACEAE S.F.Gray - БЕРЁЗОВЫЕ

521. *Betula pendula* Roth - Берёза плакучая = Ст,П,Кисл(Палеаркт.); S(Phms); [Sp.] <Pm>
522. *B. pubescens* Ehrh. - Б. пушистая = Ст,П,Кисл[Танфильев, Кононов, 1987] (Евро-Сиб.); S(Phms); [Sp.] <Pm>
523. *B. litwinowii* Doluch. - Б. Литвинова = П,Кисл(Кавк.); S(Phms); [Pl.] <Pm>
524. *Alnus glutinosa*(L.)Moench - Ольха клейкая = Кисл(Евро-Сиб.); S(Phms); [Pl.] <Pm>

525. *A. incana*(L.)Moench - О. серая = ЛН,П,Кисл(Панбор.); S(Phms); [Pl.]  
<Pm;Pmel>

Сем. 51. FAGACEAE Dumort. - БУКОВЫЕ

526. *Quercus robur* L. - Дуб черешчатый(сильный) = КЕ,НК,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,  
П,Кисл(Европ.); S(Phms); [Pl.] <Pm>

527. *Q. petraea* L.ex Liebl. - Д. скальный = Ст,ЛН,П,Кисл(Евро-Кавк.); S(Phms);  
[Pl.] <Pm>

528. *Q. dalechampii* Ten. (*Q. calcarea* Troitz.) - Д. меловой = П,Кисл(Субкавк\*.);  
S(Phms); [Sp.]

529. *Fagus orientalis* Lipsky - Бук восточный = Ст,ЛН,П,Кисл(Субкавк\*.);  
S(Phmg); [Sp.]

Сем. 52. ULMACEAE Mirb. - ИЛЬМОВЫЕ

530. *Ulmus laevis* Pall. - Ильм гладкий = Ст,П(Европ.); S(Phms); [R.]

531. *U. minor* Mill. (*U. suberosa* Moench;) - И. пробковый = Все р-ны(Палеаркт.);  
S,Аа(Phm); [Sp.] <Pm>

532. *U. glabra* Huds. (*U. elliptica* C.Koch) - И. шершавый = Ст,ЛН,П,Кисл  
(Субкавк\*.); S(Phms); [R.]

533. *U. sukaczovii* Andron. - И. Сукачева = Ст,П,Кисл(Эвксин.); S(Phms); [Pl.]

534. *U. carpiniifolia* Rupr.ex Suckow - И. граболистный = Все р-ны(Евро-Сиб.);  
S(Phms); [Pl.]

Сем. 53. CELTIDACEAE Link.(ULMACEAE) - КАРКАСОВЫЕ

535. ★ *Celtis glabrata* Stev.ex Planch. - Каркас оголённый = Ст,П,Кисл (Субкавк\*.);  
Da(Phn); [R.]

Сем. 54. MORACEAE Link - ТУТОВЫЕ

536. *Morus alba* L. - Шелковица белая = Все р-ны(Адвент.[Япония, Китай]);  
S,Pa(Phms); [Sp.] <Pm;Pa;Pmel>

537. *M. nigra* L. - Ш. чёрная = Все р-ны(Адвент.[Передняя Азия, Афганистан]);  
S,Pa(Phms); [Sp.] <Pm;Pa;Pmel>

538. *Maclura pomifera*(Rafin.)Schneid. (*M. aurantiaca* Nutt.) - Маклюра яблочная =  
КЕ,АИ,Прик,ТБ,НК,М,Ст,СК,ЛН,П(Адвент.[Сев.Америка]); S,Pa(Phms); [Sp.]  
<Pm>

Сем. 55. CANNABACEAE Endl. - КОНОПЛЕВЫЕ

539. *Humulus lupulus* L. - Хмель обыкновенный = Все р-ны(Голаркт.);  
S,Аа(НК:lh); [Pl.] <Pa;Pm>

540. *Cannabis ruderalis* Janisch. - Конопля сорная = Все р-ны(Понт.-Южносиб.); Rb(НК); [Sp.]

Сем. 56. URTICACEAE Juss. - КРАПИВНЫЕ

541. *Urtica urens* L. - Крапива жгучая = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Палеаркт.); Rb(НК); [Sp.] <Pm>

542. *U. dioica* L. - К. двудомная = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(НК); [Pl.] <Pm;Pa>

543. *Parietaria judaica* L. - Постенница иудейская = П,Кисл(Общедр.средиз.); Da(НК); [Pl.]

Сем. 57. VISCACEAE Batsch(LORANTHACEAE) - ОМЁЛОВЫЕ

544. *Viscum album* L. - Омёла белая = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Палеаркт.); S(Phn:hpar:ep); [Sp.] <Pm>

Сем. 58. SANTALACEAE R.Br. - САНТАЛОВЫЕ

545. *Thesium procumbens* C.A.Mey. - Ленец простёртый = КЕ(ст.Рождественская) (Евро-Кавк.); Pa(НК:hpar); [Sp.]

546. *Th. arvense* Horvatovszky (*Th. ramosum* Hayne) - Л. полевой = Все р-ны (Субтуран\*.); Pa(НК:hpar); [Pl.]

Сем. 59. ARISTOLOCHIACEAE Juss. - КИРКАЗОНОВЫЕ

547. ★ *Asarum intermedium*(C.A.Mey.)Grossh. (*Asarum ibericum* Stev.ex Ledeb.) - Копытень промежуточный = П,Кисл(Эвксин.); S(НК); [R.] <Pt;Pm>

548. *Aristolochia clematitis* L. - Кирказон ломоносовидный = КЕ,Прик,ТБ, НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Евро-Кавк.); S(НК); [Pl.] <Pt;Pm>

Сем. 60. POLYGONACEAE Juss. - ГРЕЧИШНЫЕ

549. *Rumex acetosella* L. - Щавель малый = Все р-ны(Евро-Сиб.); Pa,Rb(НК); [Pl.]

550. *R. acetoselloides* Bal. - Щ. кисловатый = П,Кисл(Эвксин.); Pb(НК); [Pl.] <Pm>

551. *R. acetosa* L. - Щ. кислый = Все р-ны(Голаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pa;Pm>

552. *R. thyrsoflorus* Fingerh. - Щ. пирамидальный = Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Палеаркт.); Pa(НК); [Sp.]

553. *R. euxinus* Klok. (*R. tuberosus* L.) - Щ. клубневой = Ст,СК,П (Общедр.средиз.); Pa(НК); [Pl.]

554. *R. hastifolius* Bieb. (*R. scutatus* L.) - Щ. копьелистный = П,Кисл (Общедр.средиз.); Da(НК); [Sp.]

555. *R. crispus* L. - Щ. курчавый = Все р-ны(Голаркт.); Rb(НК); [Pl.] <Pm>

556. *R. hydrolapathum* Huds. - Щ. водощавелевый = НК(Европ.); Aa(НК); [R.]

557. *R. confertus* Willd. - Щ. конский = П,Кисл(Палеаркт.); Pa,Pb(НК); [R.] <Pm>

558. *R. patientia* L. - Щ. шпинатный = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.]

559. *R. aquaticus* L. - Щ. водяной = НК,КН(Палеаркт.); Аа(НК); [R.] <Pm>
560. *R. sanguineus* L. - Щ. кровавой = Ст,П(Палеаркт.); S,Аа(НК); [Sp.]
561. *R. stenophyllus* Ledeb. - Щ. узколистный = КЕ,МД,НК,Ст,КН(Субтуран\*.); Аа(НК); [R.]
562. *R. reticulatus* Bess. - Щ. сетчатый = МД,НК,М,СК,КН(Армено-Иран.); Аа(Т); [R.]
563. *R. halaczii* Rech. - Щ. Галачи = МД,НК,КН(Ирано-Туран.); Аа(Т); [R.]
564. *R. pulcher* L. - Щ. красивый = МД,НК,КН(Субсредиз\*.); Аа(НК); [R.]
565. *R. obtusifolius* L. - Щ. туполистный = Все р-ны(Палеаркт.); S,Ра(НК); [Sp.] <Pm>
566. *R. marschallianus* Reichenb. - Щ. Маршалла = КН(Камыш-Бурун (Субтуран\*.); Дс(НК); [R.]
567. *R. maritimus* L. - Щ. морской = МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,СК,КН(Палеаркт.); Аа(НК); [R.]
568. *R. longifolius* DC. (*R. domesticus* C.Hartm.) - Щ. длиннолистный = ЛН (Голаркт.); Db(НК); [R.]
569. *R. conglomeratus* Murr. - Щ. клубковатый = ЛН(Палеаркт.); Ра,Аа(НК); [R.]
570. *Calligonum aphyllum*(Pall.)Guerke - Джужгун безлистный = КН(Туранск.); Db(Ch); [R.]
571. *Fallopia convolvulus*(L.)A.Love (*Polygonum convolvulus* L.; *Bilderdikia convolvulus*(L.)Dumort.) - Фаллопия вьюнковая = Все р-ны(Палеаркт.); Ра,Rb(Т); [Sp.] <Pm>
572. *F. dumetorum*(L.)Holub (*Polygonum dumetorum* L.; *B. dumetorum*(L.) Dumort.) - Ф. кустарниковая = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.); Ра,Rb(Т); [Sp.]
573. *Polygonum ammanoides* Jaub.et Spach - Гречишка амманиевидная = Кисл(Кавк.); Да,Rb(НК); [Rs.]
574. *P. alpestre* C.A.Mey. - Г. предальпийская = Кисл(Ирано-Туран.); Да,Rb(Т); [Sp.]
575. *P. aviculare* L. - Г. птичья = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(Т); [Pl.] <Pm>
576. *P. arenastrum* Boreau - Г. песчаная = Все р-ны(Голаркт.); Rb(Т); [Pl.]
577. *P. argyrocoleon* Steud.ex G.Kunze - Г. серебристая = М,КН(Туранск.); Rb(Т); [R.]
578. *P. salsugineum* Vieb. - Г. солонцеватая = СК,П(Туранск.); Дс(Т); [Sp.]
579. *P. patulum* Vieb. - Г. раскидистая = МД,АИ,НК,Ст,ЛН,П,Кисл(Палеаркт.); Аа,Rb(Т); [Sp.]
580. *P. novoascanicum* Клок. - Г. новоасканийская = НК,М(Терек),КН(Понтич.); Аа,Дс(Т); [Sp.]
581. *P. pseudoarenarium* Клок. - Г. ложнопесчаная = МД,НК,КН(Туранск.); Db(Т); [Pl.]
582. *Persicaria amphibia*(L.)S.F.Gray (*Polygonum amphybium* L.) - Персикария (Гречишка) земноводная = КЕ,МД,АИ,НК,Ст,СК,П(Голаркт.); Аа,Ab(К); [R.]



583. *P. maculata*(Rafin.)A.et D.Love (*Polygonum maculatum Rafin.*; *P. persicaria L.*)  
- П.(Г.) почечуйная = Все р-ны(Палеаркт.); Аа,Ра,Rb(T); [Pl.] <Pm>
584. *P. hydropiper*(L.)Spach (*Polygonum hydropiper L.*) - П.(Г.) водяной перец =  
КЕ,Прик, ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Голаркт.); Аа(T); [Sp.]
585. *P. lapathifolia*(L.)S.F.Gray (*Polygonum lapatifolium L.*) - П.(Г.) щавелелистная  
= Все р-ны (Палеаркт.); Аа(T); [Sp.]
586. *P. minor*(Huds.)Oriz (*Polygonum minus Huds.*) - П.(Г.) малая =  
Ст,П(Палеаркт.); Аа,Дс(T); [R.]
587. *Bistorta carnea*(C.Koch)Ком. (*Polygonum carneum C.Koch*) - Бисторта  
(Гречишка) мясокрасная = Кисл(Субкавказ\*.); Рb(НК); [Pl.] <Pm>
588. *Fagopyrum tataricum*(L.)Gaertn. - Гречиха татарская = П,Кисл(Палеаркт.);  
Ра(T); [Sp.]

#### Сем. 61. CHENOPODIACEAE Vent. - МАРЕВЫЕ

589. *Polycnemum arvense* L. - Хрущевник полевой = Все р-ны(Палеаркт.);  
Db,Rb(T); [R.]
590. *P. majus* A.Br. - Х. большой = Ст,СК,П(Субсредиз\*.); ST,Rb(T); [R.]
591. ★ *Nablitzia tamnoides* Vieb. - Габлиция тамусовидная = Ст,П,Кисл  
(Субкавказ\*.); Da(НК); [Sp.] l.c. окр. Пятигорска
592. *Blitum virgatum* L. (*Chenopodium foliosum Aschers.*) - Блитум прутьевидный =  
П,Кисл(Палеаркт.); Da,Rb(T); [Pl.] <Pa>
593. *Chenopodium chenopodioides*(L.)Aell. - Марь толстолистная = МД,АИ,НК,  
Прик,ТБ,КН(Голаркт.); Аа,Дс(T); [R.]
594. *Ch. glaucum* L. - М. сизая = Все р-ны(Плюрирег.); ST,Rb(T); [Sp.]
595. *Ch. rubrum* L. - М. красная = МД,АИ,НК,Ст,СК(Голаркт.); Rb(T); [Sp.]
596. *Ch. polyspermum* L. - М. многосеменная = КЕ,М,Ст,ЛН,СК(Евро-Сиб.);  
Дс(T); [R.]
597. *Ch. hybridum* L. - М. гибридная = Все р-ны(Голаркт.); Ра,Rb(T); [Sp.]
598. *Ch. urbicum* L. - М. городская = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(T); [Sp.]
599. *Ch. album* L. - М. белая = Все р-ны(Плюрирег.); Rb(T); [Pl.] <Pm>
600. *Ch. opulifolium* Schrad. - М. калинолистная = МД,АИ,НК,Ст,П  
(Общедр.средиз.); Rb(T); [R.]
601. *Ch. vulvaria* L. - М. вонючая = Ст,СК,П,КН(Палеаркт.); Rb(T); [Sp.] <Pm>
602. *Atriplex sagittata* Borkh. (*A. nitens Schkuhr*) - Лебеда стреловидная = МД,АИ,  
НК,Прик,ТБ,М,Ст,СК,П(Палеаркт.); Rb(T); [Sp.]
603. *A. aucheri* Moq. (*A. amblyostegia Turcz.*) - Л. Оше = МД,НК,М,КН(Ирано-  
Туран.); Дс(T); [R.]
604. *A. littoralis* L. - Л. прибрежная = КЕ,М,Ст,СК,П(Палеаркт.); Дс(T); [R.]
605. *A. patula* L. - Л. раскидистая = Все р-ны(Палеаркт.); ST,Da(T); [Pl.]

606. *A. oblongifolia* Waldst.et Kit. - Л. удлинённолистная = МД,АИ,НК,М,Ст, СК,П(Палеаркт.); Rb(T); [R.]
607. *A. calotheca*(Rafin)Fries (*A. hastata* L.) - Л. калотека = Все р-ны (Палеаркт.); ST,Дс(T); [Pl.]
608. *A. patens* (Litv.)Илjin - Л. поникшая = МД,АИ,НК,Прик,ТБ,Ст,П (Субтуран\*.); Дс(T); [Sp.]
609. *A. micrantha* С.А.Мey. (*A. heterosperma* Bunge) - Л. мелкоцветная = МД,АИ, НК,Ст(Туранск.); Rb(T); [R.]
610. *A. rosea* L. - Л. розовая = МД,АИ,НК,М,СК,КН(Европ.); Rb(T); [R.] <Pm>
611. *A. sphaeromorpha* Илjin - Л. шаровидная = МД,АИ,НК,М(Субпонт\*.); Db(T); [R.]
612. *A. tatarica* L. - Л. татарская = Все р-ны(Палеаркт.); ST,Да(T); [Pl.]
613. *Halimione verrucifera*(Bieb.)Aell. (*Atriplex verrucifera* Bieb.) - Галимионе бородавчатый = КЕ,МД,АИ,НК,М,Ст,СК,П(Вост.др.средиз.); Дс(Ch:sf); [Sp.]
614. *H. pedunculata*(L.)Aell. (*A. pedunculata* L.) - Г. черешчатый = КЕ,МД,АИ,НК, Прик,ТБ,М,КН (Палеаркт.); Дс(T); [R.]
615. *Krascheninnikovia ceratoides*(L.)Gueldenst. (*Ceratoides papposa* Botsch.et Ikonn.) - Терескен хохлатый = Прик(г.Брык),НК(Общедр.средиз.); SD(Ch:sf); [R.]
616. *Ceratocarpus arenarius* L. - Рогоплодник песчаный = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ, М,Ст,СК,П,КН(Общедр.средиз.); SD(T); [Pl.]
617. *C. utriculosus* Bluk (*C. turkestanicus* Sav.-Rycz.ex Илjin) - Р. мешочковый = МД, АИ,НК,СК,КН(Туранск.); ST,SD(T); [R.]
618. *Camphorosma monspeliaca* L. - Камфоросма марсельская = МД,АИ,НК,Прик, ТБ,М,Ст,СК(Общедр.средиз.); Дс(Ch:sf); [R.] <Pp>
619. *C. lessingii* Litv. - К. Лессинга = МД,АИ,НК,М,КН(Туранск.); SD(Ch:sf); [R.]
620. *Bassia hyssopifolia*(Pall.)О.Кuntze (*Echinopsilon hyssopifolium*(Pall.)Moq.) - Бассия иссополистная = МД,АИ,НК,М,СК,КН(Общедр.средиз.); Дс(T); [R.]
621. *B. sedoides*(Pall.)Aschers. (*E. sedoides*(Pall.)Moq.) - Б. очитковая = КЕ,МД, АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,СК,П,КН(Вост.др.средиз.); Дс(T); [Sp.]
622. *B. hirsuta*(L.)Aschers. (*E. hirsutum*(L.)Moq.) - Б. волосистая = Прик(г.Брык) (Общедр.средиз.); Дс(T); [R.]
623. *Kochia prostrata*(L.)Schrad. - Прутняк простёртый = Все р-ны (Общедр.средиз.); ST,Да(Ch:sf); [Pl.] <Pp>
624. *K. laniflora*(S.G.Gmel.)Vorb. - П. шерстистоцветковый = Прик,ТБ,НК,М,СК, КН(Палеаркт.); Db(T); [R.]
625. *K. scoraria*(L.)Schrad. - П. веничный = Все р-ны(Общедр.средиз.); Rb(T); [Sp.] <Pm>
626. *Corispermum caucasicum*(Илjin)Илjin (*C. aralo-caspicum* Илjin) - Верблюдка кавказская = М,КН(Туранск.); Db(T); [Sp.]
627. *C. orientale* Lam. - В. восточная = КН(Субпонт\*.); Db(T); [R.]

628. *S. nitidum* Schult. - В. лоснящаяся = КН[Танфильев, Кононов, 1987] (Понтич.); Db(T); [R.]
629. *Agriophyllum squarrosum*(L.)Моq. (*A. arenarium* Bieb.ex C.A.Mey.) - Кумарчик оттопыренный = МД,АИ,НК,М,КН(Субтуран\*.); Db(T); [Sp.]
630. *Kalidium foliatum*(Pall.)Моq. - Поташник олиственный = КН(Туранск.); Дс(НК); [R,]
631. *K. caspicum*(L.)Ung.-Sternb. - П. каспийский = КН(Ирано-Туран.); Дс(Phn); [R.]
632. *Haloreplis rugmaea*(Pall.)Bunge ex Ung.-Sternb. - Сорovníк низкий = КН (Туранск.); Дс(T); [R.] l.c. низовья Кумы
633. *Halostachis belangeriana*(Моq.)Botsch. (*Halostachys caspia* C.A.Mey.) - Соляноколосник Белангера = МД,АИ,НК,КН(Ирано-Туран.); Дс(Ch); [R.]
634. *Halocnemum strobilaceum*(Pall.)Bieb. - Сарсазан шишковатый = МД,АИ,НК, Прик,ТБ,М,КН(Общедр.средиз.); Дс(Ch:sf); [Sp.]
635. *Salicornia europaea* L. (*S. herbaceae*(L.)L.) - Солерос европейский = Все р-ны (Голаркт.); Дс(T:ps); [Sp.]
636. ★ *Suaeda microphylla* Pall. - Сведа мелколистная = МД,АИ,НК,М,Ст,КН (Ирано-Туран.); Дс(Ch:fl); [Sp.]
637. *S. altissima*(L.)Pall. - С. высокая = МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,СК,КН(Ирано-Туран.); Дс(T); [Sp.]
638. *S. confusa* Iljin - С. запутанная = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,СК,КН (Субтуран\*.); Дс(T); [Pl.]
639. *S. salsa*(L.)Pall. - С. солончаковая = КЕ,МД,АИ,НК,М,Ст(Туранск.); Дс(T); [R.]
640. *S. prostrata* Pall. - С. простёртая = МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,СК,КН (Палеаркт.); Дс(T); [Sp.] <Pm>
641. *Salsola soda* L. - Солянка содоносная = КЕ,МД,АИ,НК(Общедр.средиз.); Дс(T); [Sp.]
642. *S. laricina* Pall. - С. лиственничная = МД,АИ,НК,М,КН(Субпонт\*.); Дс(Ch:fl); [Sp.]
643. *S. dendroides* Pall. - С. древовидная = МД,АИ,НК,М,КН(Ирано-Туран.); Дс(Ch); [Sp.] <Pp>
644. *S. australis* R.Br. (*S. iberica*(Sennen et Pau)Botsch.; *S. pestifer* Nels.) - С. южная = Все р-ны(Общедр.средиз.); ST,SD,Rb(T); [Pl.]
645. *S. ericoides* Bieb. - С. вересковидная = КН(Субкавк\*.); Дс(Phn); [R.] l.c. между р.р. Кура и Кума <Pp>
646. *S. orientale*(S.G.Gmel.)Tzvel. - С. восточная = КН[Танфильев, Кононов, 1987](Туранск.); Дс(T); [R.]
647. *Caspia foliosa*(L.)Galushko (*Salsola foliosa*(L.)Schrad.) - Каспия. олиственная = НК,КН(Субтуран\*.); Дс(T); [R.]
648. *Climacoptera crassa*(Bieb.)Botsch. (*Salsola crassa* Bieb.) - Климакоптера мясистая = М,КН(Туранск.); Дс(T); [Sp.]

649. *C. brachiata*(Pall.)Botsch. (*S. brachiata* Pall.) - К. супротиволистная = КН (Вост.др.средиз.); Dc(T); [Sp.]
650. *Anabasis aphylla* L. - Анабазис безлистный = КН(Ирано-Туран.); SD(Ch:sf); [Sp.] <Pt;Pm>
651. *Petrosimonia brachiata*(Pall.)Bunge - Петросимония раскидистая = МД,АИ, НК,М,КН(Ирано-Туран.); Dc(T); [Rs.] <Pp>
652. *P. glaucescens*(Bunge)Иjin - П. сизоватая = Прик[Танфильев, Кононов, 1987] (Туранск.); Dc(T); [R.]
653. *P. oppositifolia*(Pall.)Litv. (*P. crassifolia*(Pall.)Bumge) - П. супротиволистная = Все р-ны(Субтуран\*.); Dc(T); [Sp.]
654. *P. triandra*(Pall.)Simonk. - П. трёхтычинковая = КЕ,М,Ст,СК,[П: Танфильев, Кононов, 1987]КН(Субтуран\*.); Dc(T); [Sp.] <Pp>

Сем. 62. AMARANTHACEAE Juss. - ЩИРИЦИЕВЫЕ

655. *Amaranthus cruentus* L. (*A. paniculatus* L.) - Щирица кровавая = Все р-ны (Плюрирег.); Rb(T); [Pl.]
656. *A. retroflexus* L. - Щ. запрокинутая = Все р-ны(Плюрирег.); Rb(T); [Pl.]
657. *A. blitoides* S.Wats. - Щ. жминдовидная = Все р-ны(Адвент.[Сев.Америка]); Rb(T); [Sp.]
658. *A. albus* L. - Щ. белая = Все р-ны(Адвент.[Сев. Америка]); Rb(T); [R.]
659. *A. blitum* L. (*A. lividus* L.) - Щ. синеватая = КЕ,Ст,СК,П,Кисл(Плюрирег.); Rb(T); [Pl.]
660. *A. graecizans* L. - Щ. маскированная = М,СК,П,КН(Адвент.[Сев. Америка]); Rb(T); [R.]

Сем. 63. PHYTOLACCACEAE R.Br. - ЛАКОНОСОВЫЕ

661. *Phytolacca americana* L. - Лаконос американский = Ст,П(Пятигорск) (Адвент. [Сев.Америка]); Rb(НК); [R.] <Pm>

Сем. 64. PORTULACACEAE Juss. - ПОРТУЛАКОВЫЕ

662. *Portulaca oleracea* L. - Портулак овощной = Все р-ны(Общедр.средиз.); Ra,Rb(T); [Pl.] <Pa;Pm>

Сем. 65. ILLECEBRACEAE R.Br. (CARYOPHYLLACEAE) - ДИВАЛОВЫЕ

663. *Herniaria besserii* Fisch.ex Hornem (*H. incana* Lam.) - Грыжник Бессера = Все р-ны(Общедр.средиз.); ST,Db(Ch:sf); [Pl.]
664. *H. glabra* L. (*H. suavis* Klok.) - Г. голый = Ст[Лазьков, 1996] (Общедр. средиз.); Db,Rb(T); [R.]
665. *H. hirsuta* L. (*H. cinerea* DC.)- Г. волосистый = Ст(Общедр.средиз.); Db,Dd(T); [R.] <Pm>

666. *H. polygama* J.Gay - Г. многобрачный = Ст,СК(Понт.-Южносиб.);  
Da,Db(Ch:sf); [R.]
667. *Scleranthus annuus* L. - Дивала однолетняя = Все р-ны(Палеаркт.); ST,Rb(T);  
[Pl.]
668. *S. polycarpus* L. - Д. многоплодная = СК,П,Кисл(Субсредиз\*.); Pa(T); [Sp.]
669. *S. uncinatus* Schur - Д. крючковатая = Ст,ЛН,П,Кисл(Общедр.средиз.);  
Da,Rb(T); [Pl.]

Сем. 66. CARYOPHYLLACEAE Juss. - ГВОЗДИЧНЫЕ

670. *Stellaria media*(L.)Vill. - Звездчатка средняя = Все р-ны(Голаркт.); Rb(T); [Pl.]  
<Pa;Pm>
671. *S. neglecta* Weihe - З. незамеченная = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(T); [Sp.]
672. *S. holostea* L. - З. ланцетолистная = М,ЛН(Палеаркт.); S(НК); [Sp.] <Pm>
673. *S. graminea* L. - З. злачная = М,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.); S,Pa(НК); [Pl.]  
<Pm>
674. *Myosoton aquaticum*(L.)Moench (*Malachium aquaticum* Fries) -  
Мягковолосник водный = М,Ст,ЛН,СК,П,Кисл,КН(Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.]
675. *Cerastium nemorale* Vieb. - Ясколка лесная = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,  
П,Кисл(Субкавказ\*.); S(T); [Pl.]
676. *C. holosteam* Fisch.ex Hornem. - Я. костенцовая = П,Кисл(Эукавказ.); S(НК); [Pl.]
677. *C. davuricum* Fisch.ex Spreng. - Я. даурская = П,Кисл(Субтуран\*.); S,Pa(НК);  
[Sp.]
678. *C. perfoliatum* L. - Я. пронзённолистная = МД,АИ,НК,Ст(Зап.др.средиз);  
Pa(T); [R.]
679. *C. ruderales* Vieb. - Я. сорная = КЕ,М,П,КН(Эукавказ.); Pa(T); [Sp.] l.c. Кизляра
680. *C. brachypetalum* Desp.ex Pers. (*C. tauricum* Spreng.) - Я. коротколепестная =  
СК,П(Евро-Кавк.); Rb(T); [Sp.]
681. *C. glomeratum* Thuill. - Я. скупенноцветковая = СК,П,Кисл(Плюрирег.);  
Db(T); [Sp.]
682. *C. semidecandrum* L. - Я. пятитычиночная = СК,П(Евро-Кавк.); Pa(T); [R.]
683. *C. balericum* F.Herm. (*C. dentatum* Moschl.) - Я. зубчатая = КЕ,МД,АИ,НК,  
Прик,ТБ,М,СК(Субтуран\*.); ST(T); [Sp.]
684. *C. glutinosum* Fries - Я. липкая = Ст(Евро-Кавк.); Db,Dc(T); [R.]
685. *C. meyerianum* Rupr. - Я. Мейера = П(Предкавказ.); S(T); [R.] l.c. г. Бештау <Rg>
686. *C. purpurascens* Adams - Я. пурпурная = Кисл(Кавк.); Pb(НК); [Pl.] <Pr>
687. *C. holosteoides* Fries (*C. caespitosum* Gilib) - Я. дернистая = Все р-ны  
(Плюрирег.); Pa,Aa(НК); [Pl.]
688. *C. arvense* L. - Я. полевая = Все р-ны(Голаркт.); Pa(НК); [Pl.]

689. *Dichodon viscidum*(Bieb.)Holub (*Cerastium dubium*(Bast.)Guepin; *C. anomalum* Waldst.et Kit.) - Диходон (Ясколка) уклоняющийся = МД,М(Терек),Ст,КН (Субсредиз\*.); Аа(Т); [R.]
690. *Holosteum umbellatum* L. - Костенец зонтичный = Все р-ны(Палеаркт.); ST,SD(Т:eph); [Pl.]
691. *H. glutinosum*(Bieb.)Fisch.et C.A.Mey. - К. липкий = М,Ст,СК(Ирано-Туран.); ST,SD(Т:eph); [R.]
692. *H. marginatum* Fisch.et C.A.Mey. - К. окаймлённый = П(Машук) (Субкавказ\*.); ST,SD(Т:eph); [R.]
693. ★ *Bufonia parviflora* Griseb. (*Bufonia tenuifolia* L.) - Бюфония тонколистная = КЕ(ст. Рождественская)(Субпонт\*.); ST(Т); [Rs.] <Rx>
694. *Queria hispanica* L. - Кверия испанская = Ст,СК,П(Зап.др.средиз); ST,SD(Т:eph); [R.]
695. *Minuartia hybrida*(Vill.)Schischk. - Минуарция гибридная = Ст,СК,П (Субсредиз\*.); ST,SD(Т); [R.]
696. *M. biebersteinii*(Rupr.)Schischk. - М. Биберштейна = Кисл(Эукавказ.); Да(НК); [Pl.]
697. *M. circassica*(Albov)Woronow (*M. caucasica*(Adams ex Rupr.)Mattf.) - М. черкесская = П(Бештау),Кисл[Танфильев, Кононов, 1987](Кавк.); Да(НК); [Pl.]
698. *Eremogene saxatilis*(L.)Ikonn. (*Arenaria stenophylla* Ledeb.; *A. graminifolia* Schrad.) - Эремогене узколистная = Прик,ТБ,СК,П(Евро-Сиб.); ST(НК); [R.]
699. *E. longifolia*(Bieb.)Fenzl (*A. longifolia* Bieb.) - Э. длиннолистная = КЕ,Ст,СК (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Sp.]
700. *Arenaria serpyllifolia* L. - Песчанка чебрецелистная = Все р-ны(Голаркт.); Db,Rb(Т); [Pl.]
701. *Moehringia trinervia*(L.)Clairv. - Мерингия трёхжилковая = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.); S(Т); [Sp.]
702. *Spergula arvensis* L. (*S. vulgaris* Boenn.) - Торица обыкновенная = Ст,СК (Голаркт.); Db,Rb(Т); [R.]
703. *Spergularia maritima*(All.)Chiov. (*S. media*(L.)C.Presl., *S. marginata*(DC) Kitr.) - Торичник морской = Все р-ны(Субтуран\*.); Дс,Аа(Т); [Pl.]
704. *S. rubra*(L.)J.et C.Presl (*S. campestris*(L.)Aschers.) - Т. красный = СК(Евро-Сиб.); Дс(Т); [R.]
705. *S. salina* J.et C.Presl (*S. marina*(L.)Griseb.) - Т. солончаковый = Все р-ны (Плюрирег.); Дс(Т); [Sp.]
706. *Agrostemma githago* L. - Куколь обыкновенный = Все р-ны(Палеаркт.); Ра(Т); [Sp.] <Pt;Pm>
707. *Steris viscaria*(L.)Rafin. (*Viscaria viscosa*(Scop.)Aschers.; *V. vulgaris* Bernh.) - Стерис смолковый (Смолка обыкновенная) = Ст,П(Европ.); Ра(НК); [R.] <Pm>

708. ★ *Oberna procumbens*(Murr.)Ikonn. (*Silene procumbens Murr.*) - Оберна (Смолёвка) лежачая = МД,АИ,Ст(Понт.-Южносиб.); S,Аа(НК); [Rs.] <Rg>
709. *O. scerei*(Baumg.)Ikonn. (*S. scerei Baumg.*) - О.(С.) Сцера = СК,П(Понтич.); Ра(НК); [R.]
710. *O. multifida*(Adams)Ikonn. (*S. multifida(Adams)Rohrh.*) - О.(С.) многокасечённая = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Кавк.); S(НК); [Pl.] <Rt>
711. *O. behen*(L.)Ikonn. (*S. vulgaris(Moench)Garcke; S. latifolia(Mill.)Britt et Rendle*) - О.(С.) обыкновенная = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Плюрирег.); Ра(НК); [Pl.]
712. *Silene dichotoma* Ehrh. - Смолёвка вильчатая = [Ст, Лазьков, 1996],СК (Европ.); Ра(НК); [R.]
713. *S. pendula* L. - С. повислая = Ст(Субсредиз\*.); S,Ра,Rb(НК); [R.] <Rg>
714. *S. compacta* Fisch.ex Hornem. - С. скученноцветковая = [ТБ,СК, Лазьков, 1996],П,Кисл(Субкавк\*.); SD(НК); [Sp.]
715. *S. chlorantha*(Willd.)Ehrh. - С. зеленоцветковая = Ст,СК,П(Евро-Сиб.); ST(НК); [R.]
716. *S. ruprechtii* Schischk.(*S. saxatilis Bieb.*) - С. Рупрехта = П,Кисл(Субкавк\*.); Pb,Pc(НК); [Pl.]
717. *S. supina* Vieb. - С. приземистая = Ст,СК,П(Понтич.); Da(НК); [Sp.] 1.с. Пятигорск
718. *S. linearifolia* Otth - С. линейнолистная = [Прик,ТБ,Ст: Лазьков,1996],П (Эукавк.); Da(НК); [Sp.]
719. ★ *S. nutans* L. - С. поникающая = Ст,П(Евро-Сиб.); Ра(НК); [Rs.] <Rg;Pm>
720. *S. italica*(L.)Pers. - С. итальянская = KE,[Прик,ТБ: Лазьков, 1996],Ст,ЛН, П,Кисл (Средиземн.); S,Ра(НК); [Sp.]
721. *Otites wolgensis* (Hornem.) Grossh. (*Silene. wolgensis(Hornem.)Bess.ex Spreng.*) - Отитес волжский = Все р-ны(Палеаркт.); ST,Da(T); [Pl.]
722. *O. densiflora*(D'Urv.)Grossh. (*S. densiflora D'Urv.*) - О. густоцветковый = KE,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Понтич.); ST(T); [Sp.]
723. *O. media*(Litv.)Klok. (*S. media(Litv.)Kleop.*) - О. средний = КН(Ачикулак) (Понт.-Южносиб.); Db(T); [R.]
724. *O. cyri*(Schischk.)Grossh. (*S. cyri Schischk.*) - О. куринский = М,КН (Туранск.); ST(T); [Sp.]
725. *O. parviflora*(Ehrh.)Grossh. (*S. borystenica (Grun.)Walters S. parviflora (Ehrh.) Pers.*) - О. мелкоцветковый = М,[Ст,П:Лазьков, 1996],СК(Евро-Сиб.); Db(T); [R.]
726. *Plesonax subconica*(Friv.)Sourcova (*Silene subconica Friv.*) - Плеконакс почтиконический = Все р-ны(Общедр.средиз.); ST,Rb(T); [Sp.]
727. ★ *Coscyganthe flos-cuculi*(L.)Fourr. (*Coronaria flos-cuculi(L.)R.Br.*) - Кукушник обыкновенный = Ст(Евро-Сиб.); Ра(НК); [R.] <Rg> <Pm>

728. *Elisanthe viscosa*(L.)Rupr. (*Silene viscosa* L.) - Элизанте клейкая = Все р-ны (Палеаркт.); ST(НК); [Pl.]
729. *E. noctiflora*(L.)Rupr. (*Silene noctiflora* L.) - Э. ночная = КЕ,Прик,ТБ,НК, Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Евро-Сиб.); Ра(НК); [Sp.]
730. *Melandrium album*(Mill.)Garcke - Дрёма белая = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm>
731. ★★ *Petrocoma hoefftiana*(Fisch.)Rupr. - Петрокома Гёффта = Кисл(Эукавк.); Da(НК); [Rs.] <Esub> l.c. Кисловодск (Берёзовка)
732. *Cucubalis baccifer* L. - Волдырник ягодный = М,Ст,ЛН(Палеаркт.); Аа(НК); [R.]
733. ★ *Gypsophila globulosa* Stev.ex Boiss. - Гипсолюбка шаровидная = Ст,СК,П, Кисл(Предкавк.); Da(НК); [Sp.] <Ee>
734. ★ *G. glomerata* Pall.ex Adams - Г. скученная = Прик,ТБ,НК,Ст,СК(Кр.-Новоросс.); Da(НК); [R.]
735. *G. altissima* L. - Г. высокая = НК,КН(Евро-Сиб.); Db(НК); [Sp.]
736. *G. paniculata* L. - Г. метельчатая = Все р-ны(Субтуран\*.); ST(НК); [Sp.] <Pm;Pmel;Po>
737. ★ *G. acutifolia* Fisch.ex Spreng. - Г. остролистная = СК,П(Предкавк.); Da(НК); [Sp.] l.c. Пятигорск
738. *G. trichotoma* Wend. - Г. триждывильчатая = МД,АИ,НК,КН(Понт.-Южносиб.); Dc(НК); [Sp.]
739. *G. scorzonerifolia* Ser. - Г. козелецелистная = Прик,ТБ,НК,М,КН (Предкавк.); Db(НК); [R.] l.c. Кизляр
740. *G. elegans* Vieb. - Г. изящная = П,Кисл(Субкавк\*.); Rb(Т); [Pl.]
741. *Psammophiliella muralis*(L.)Konn. (*Gypsophila muralis* L.) - Псаммофилиелла постенная = Все р-ны(Евро-Сиб.); Rb(Т); [R.]
742. *Kohlrauschia prolifera*(L.)Kunth - Кольраушия побегоносная = Все р-ны (Понтич.); ST,Rb(Т); [Sp.] <Pm>
743. *Vaccaria hispanica*(Mill.)Rauschert (*V. segetalis* Garcke) - Тысячеголов испанский = Все р-ны(Плюрирег.); Ra(Т); [Sp.]
744. *Dianthus armeria* L. - Гвоздика армериевидная = Все р-ны(Евро-Кавк.); Ра(НК:pb); [Sp.] <Pm>
745. *D. pseudoarmeria* Vieb. - Г. ложноармериевидная = Ст,СК,П,Кисл (Понтич.); ST,Da(НК:pb); [Sp.] <Po>
746. *D. capitatus* Balb.ex DC. - Г. головчатая = КЕ,Прик,ТБ,НК,М,Ст,СК,П,Кисл (Понтич.); Ра(НК); [Sp.] <Po>
747. *D. ruprechtii* Schischk. - Г. Рупрехта = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Эукавк.); Ра(НК); [Pl.] <Po>
748. *D. polymorphus* Vieb. - Г. изменчивая = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст(Понтич.); ST(НК); [R.] <Po>



749. *D. borbasii* Vandas - Г. Борбаша = КЕ,МД,АИ,НК,Ст(Понт.-Южносиб.); ST,Db(НК); [R.] <Po>
750. *D. imereticus*(Rupr.)Schischk. - Г. имеретинская = П(Эвксин.); Da(НК); [Sp.] <Rg;Po>
751. ★*D. bicolor* Adams - Г. двуцветная = Ст,СК,П(Эукавк.); Pa,ST(НК); [R.] l.c. Минеральные Воды
752. *D. pallidiflorus* Ser. - Г. бледноцветковая = Прик,ТБ,НК,М,Ст,СК,П,КН (Понтич.); ST(НК); [R.]
753. *D. pallens* Smith (*D. lanceolatus* Stev.ex Reichenb.) - Г. бледная = Все р-ны (Понтич.); ST,Db(НК); [Pl.]
754. *D. caucaseus* Smith (*D. discolor* Smith) - Г. кавказская = П,Кисл(Кавк.); Pb(НК); [Pl.] l.c. Бештау
755. *D. fragrans* Adams - Г. душистая = П,Кисл(Эукавк.); Pa,Db(НК); [Sp.] l.c. Пятигорск
756. *D. arenarius* L. - Г. песчаная = М(Терек)(Европ.); Db(НК); [Rs.] <Rx>
757. *Saponaria officinalis* L. - Мыльнянка лекарственная = Все р-ны(Европ.); Aa,Rb(НК); [Sp.] <Po;Pm>

Сем. 67. NYMPHAEACEAE Salisb. - НИМФЕЙНЫЕ

758. ★*Nymphaea alba* L. - Кувшинка белая = НК(Европ.); Ac(K); [Rs.] <Pm;Po>

Сем. 68. NUPHARACEAE - КУБЫШКОВЫЕ

759. ★*Nuphar lutea*(L.)Smith - Кубышка жёлтая = НК(Палеаркт.); Ac(K); [R.] <Pm;Po>

Сем. 69. CERATOPHYLLACEAE S.F.Gray - РОГОЛИСТНИКОВЫЕ

760. *Ceratophyllum demersum* L. - Роголистник поргужённый = М,Ст,ЛН (Палеаркт.); Ac(K); [R.]
761. *C. submersum* L. - Р. полупогружённый = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,СК (Палеаркт.); Ac(K); [R.]

Сем. 70. PAEONIACEAE Rudolphi - ПИОНОВЫЕ

762. ★★*Paeonia caucasica*(Shipz.)Schipz. (*P. kavachensis* auct.) - Пион кавказский = Кисл(Эвксин.); S(K); [Rs.] <Rg;Rt;Po>
763. ★★*P. tenuifolia* L. - П. узколистный = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Понтич.); Pa,ST(НК); [Pl.] <Pm;Po>
764. ★*P. biebersteiniana* Rupr. - П. Биберштейна = КЕ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Предкавк.); Pa,ST(НК); [Sp.] <Esub> l.c.Ставрополь

Сем. 71. RANUNCULACEAE Juss. - ЛЮТИКОВЫЕ

765. *Trollius ranunculinus*(Smith)Stearn (*T. patulus Salisb.*) - Купальница лютиковая = П,Кисл(Субкавказ\*.); Pb,Рс(НК); [Sp.] <Pt>
766. ★ *Helleborus caucasicus* A.Br. - Морозник кавказский = Ст(Эвксин.); S(НК:hv); [Rs.] <Rg;Rt;Pm;Po>
767. *Nigella arvensis* L. - Чернушка полевая = Ке,Ст,ЛН,СК(Субсредиз\*.); Rb(Т); [Sp.] <Po>
768. *N. sativa* L. - Ч. посевная = Все р-ны(Общедр.средиз.); Rb(Т); [Sp.] <Pm;Po>
769. *N. damascena* L. - Ч. дамасская = Все р-ны(Средиземн.); Rb(Т); [Sp.] <Po>
770. *Actaea spicata* L. - Воронец колосовидный = Ст,ЛН,П,Кисл(Евро-Сиб.); S(НК); [Sp.] <Rt>
771. *Aquilegia caucasica* Vieb. - Водосбор кавказский = Кисл(Кавк.); Pb(НК); [R.]
772. *Consolida paniculata*(Host)Schur - Живокость метельчатая = Все р-ны (Субпонт\*.); ST(Т); [Pl.] <Pm>
773. *C. regalis* S.F.Gray (*Delphinium consolida* L.) - Ж. великолепная = Ке,МД, АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,СК(Европ.); Ra,Rb(Т); [Sp.]
774. *C. orientalis*(J.Gay)Schroding. - Ж. восточная = М,СК,П(Субсредиз\*.); ST,Rb(Т); [Sp.]
775. *C. divaricata*(Ledeb.)Schroding. - Ж. растопыренная = МД,АИ,НК,Прик, ТБ,М,Ст,СК,КН(Субпонт\*.); Ra,Rb(Т); [Pl.]
776. ★ ★ *Diedropetala punicea*(Pall.)Galushko (*Delphinium puniceum* Pall.) - Диедропетала пунцовая = МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,СК,(Туранск.); ST(НК); [Rs.] <Pt>
777. *D. schmalhauseni*(Albov)Galushko (*D. schmalhauseni* Albov) - Д. Шмальгаузена = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Эвксин.); Ra,ST(НК); [Pl.] <Pt>
778. *Delphinium flexuosum* Vieb. - Дельфиниум извилистый = П,Кисл(Кавк.); Pb(НК); [Sp.] <Pt>
779. *D. dasycarpum* Stev.ex DC. - Д. опушенноплодный = П,Кисл(Эукавказ.); Pb(НК); l.c. Кисловодск <Pt>
780. *Aconitum confectiflorum*(DC.)Gayer - Борец скученноцветковый = Кисл (Евро-Сиб.); Pb(НК); [R.] <Pt>
781. *A. orientale* Mill. - Б. восточный = П,Кисл(Субкавказ\*.); Pb(НК); [Pl.]
782. *A. nasutum* Fisch.ex Reichenb. - Б. носатый = П,Кисл(Кавк.); Pb(НК); [Sp.]
783. ★ *Anemonastrum fasciculatum*(L.)Holub (*Anemone fasciculata* L.) - Анемонаструм (Ветреница) пучковатый = П,Кисл(Кавк.); Pb,Рс(НК); [Sp.]
784. *Anemonoides ranunculoides*(L.)Holub (*Anemone ranunculoides* L.) - Анемоноидес (Ветреница) лютичный = Ке,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Евро-Кавк.); S(К:ephd); [Pl.]
785. ★ *A. nemorosa*(L.)Holub (*Anemone nemorosa* L.) - А.(В.) дубравный = П (Биберштейн)(Европ.); S(К:ephd); [Rs.] <Rg>

786. ★ *A. caucasica*(Rupr.)Holub (*Anemone caucasica Willd.ex Rupr.*) - А.(В.) кавказский = Ст(Кавк.); S(К:eph); [R.] <Rg>
787. ★ ★ *A. blanda*(Schott et Kotschy)Holub (*Anemone blanda Schott et Kotschy*) - А.(В.) приятный = Ст(Эвксин.); S(К:eph); [R.] ,<Rg>
788. ★ *Anemone sylvestris* L. - Ветреница лесная = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Евро-Сиб.); Pa,ST(НК); [Sp.] <Po>
789. ★ *Pulsatilla albana*(Stev.)Bercht.et J.Presl - Сон албанский = П,Кисл(Кавк.); Pb(НК:eph); [Pl.] <Po>
790. ★ *Clematis integrifolia* L. - Ломонос цельнолистный = [КЕ, оз.Солёное: Немирова, Данилевич, 1991],Ст,П,Кисл(Палеаркт.); Pa,Pb(Ch:sf); [Sp.] <Po;Pmel>
791. ★ *C. recta* L. - Л. прямой = КЕ(ст.Рождественская),ЛН(Невинномысск) (Европ.); S,Pa(Ch:sf); [Rs.]
792. ★ *C. lathyrifolia* Bess.ex Reichenb. (*C. pseudoflammula Schmalh.ex Lipsky*) - Л. ложножгучий = КЕ,Ст,ЛН,СК,П(Понтич.); Pa,ST(Ch:sf); [Sp.]
793. ★ *C. vitalba* L. - Л. виноградолистный = Ст,ЛН,П(Субсредиз\*.); S(Ch:ll); [R.] <Pm;Pmel>
794. ★ *C. orientalis* L. - Л. восточный = М,СК,П(Общедр.средиз.); Pa(Ch:ll); [R.] <Pmel>
795. *Myosurus minimus* L. - Мышехвостник маленький = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН (Плюрирег.); Aa(T); [R.]
796. *Ceratoccephala falcata*(L.)Pers. - Рогоглавник серповидный = КЕ,МД,АИ,НК, Прик,ТБ,М,Ст,ЛН,СК,П(Общедр.средиз.); SD(T:eph); [R.] <Pm>
797. *C. testiculata*(Crantz)Bess. - Р. яйцевидный = Все р-ны(Палеаркт.); SD,Dd(T:eph); [Pl.]
798. *Ficaria calthifolia* Reichenb. - Чистяк калужницелистный = Все р-ны (Зап.др.средиз.); S,Pa(НК:eph); [Pl.] <Pm>
799. *Batrachium aquatile*(L.)Dumort (*Batrachium triphyllum(Wallr.) Dumort.*; *Ranunculus aquatilis* L.) - Водяной лютик водный = Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Субсредиз\*.); Ac(K); [R.]
800. *B. rionii*(Lagger)Nym. (*Ranunculus rionii Lagger*) - В.л. Риона = Все р-ны (Палеаркт.); Ac(K); [Sp.]
801. *B. trichophyllum*(Chaix)Bosch (*B. divaricatum(Schrank)Wimm.*; *Ranunculus trichophyllum Chaix*) - В.л. волосистолистный = Все р-ны(Панбор.); Ac(K); [R.]
802. ★ *Buschia lateriflora*(DC.)Ovcz. (*Ranunculus lateriflorus DC.*) - Бушия бокоцветная = МД(Понт.-Южносиб.); Aa(T); [Rs.]
803. ★ *Ranunculus lingua* L. - Лютик длиннолистный = НК,Ст(оз.Кравцово) (Палеаркт.); Aa(НК); [R.] <Rg>
804. ★ *R. auricomus* L. - Л. золотистый = Ст(Европ.); Aa(НК); [Rs.] <Rg>
805. *R. sceleratus* L. - Л. ядовитый = Все р-ны(Голаркт.); Aa(T); [Pl.] <Pt>

806. *R. repens* L. - Л. ползучий = Все р-ны(Голаркт.); Аа,Аб(К); [Pl.] <Pt;Pm>
807. *R. caucasicus* Vieb. - Л. кавказский = Ст,ЛН,П,Кисл(Кавк.); Ра,Аа(НК); [Sp.]  
 1.с. Пятигорск <Pt>
808. *R. baidarae* Rupr. - Л. Байдары = П,Кисл(Кавк.); Pb,Рс(НК); [Rs.] <Pt>
809. *R. oreophilus* Vieb. - Л. горный = Ст,ЛН,П,Кисл(Евро-Кавк.); Pb,Рс(НК); [Sp.]  
 <Pt>
810. *R. bulbosus* L. - Л. клубневой = Ке,Прик,ТБ,Ст,ЛН(Палеаркт.); Ра(НК); [R.]  
 <Pt>
811. *R. meyerianus* Rupr. - Л. Мейера = Все р-ны(Евро-Кавк.); Ра(НК); [Pl.] <Pt>
812. ★ *R. nemorosus* DC. - Л. дубравный = Ст[Танфильев, Кононов, 1987](Европ.);  
 S(НК); [R.] <Rg;Pt>
813. *R. arvensis* L. - Л. полевой = Ст(Общедр.средиз.); Db,Ра(Т); [R.] <Pt>
814. *R. oxyspermus* Willd. - Л. остроплодный = Все р-ны(Ирано-Туран.); ST(НК);  
 [Pl.] <Pt>
815. *R. illiricus* L. (*R. meridionalis* Grossh.) - Л. иллирийский = Ке,Прик,ТБ,НК,Ст,  
 ЛН,СК(Зап.др.средиз.); Ра,ST(НК); [Sp.]
816. *R. pedatus* Waldst.et Kit. - Л. стоповидный = Ке,Прик,ТБ,Ст,СК(Понт.-  
 Южносиб.); ST(НК); [R.]
817. *Thalictrum foetidum* L. - Василистник вонючий = П,Кисл(Палеаркт.);  
 Db(НК); [Sp.] <Pt;Pm>
818. *Th. minus* L - В. малый = Все р-ны(Голаркт.); Ра,ST(НК); [Pl.] <Pt;Pm>
819. *Th. simplex* L. - В. простой = Кисл(Палеаркт.); Pb(НК); [R.]
820. *Th. flavum* L. - В. жёлтый = Ке,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,ЛН,СК,П,КН  
 (Евро-Сиб.); Ра(НК); [R.] <Pm>
821. ★ *Adonis vernalis* L. - Горицвет весенний = Ке,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П(Евро-Сиб.);  
 Ра,ST(НК:eph);[Sp.]< Pm;Po>
822. *A. aestivalis* L. - Г. летний = Все р-ны(Общедр.средиз.); Ра,Rb(Т); [Sp.] <Pm>
823. *A. flammea* Jacq. - Г. пламенный = Все р-ны(Субсредиз\*.); Ра,Rb(Т); [Pl.]

#### Сем. 72. BERBERIDACEAE Juss. – БАРБАРИСОВЫЕ

824. *Berberis vulgaris* L. - Барбарис обыкновенный = Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,  
 П,Кисл(Европ.); ST,Pb(Phn); [Pl.] <Pm;Pme1>

#### Сем. 73. HYPERICOACEAE(Dumort.)Willk. - ГИПЕКОУМНЫЕ

825. *Hypericum pendulum* L. - Гипекоум поникающий = НК(Зап.др.средиз.);  
 Ра,Rb(Т); [R.]

#### Сем. 74. PAPAVERACEAE Juss. - МАКОВЫЕ

826. *Chelidonium majus* L. - Чистотел большой = Все р-ны(Палеаркт.); S,Rb(НК);  
 [Pl.] <Pm>

827. *Glaucium corniculatum*(L.)Rudolph - Мачок рогатый = Все р-ны  
(Общедр.средиз.); Ra,Rb(T); [Sp.]
828. ★ *Roemeria refracta* DC. - Ремерия отогнутая = П[Михеев, 1983](Ирано-  
Туран.); SD,Rb(T); [Rs.] <Po> <Rx>
829. ★ *Paraver bracteatum* Lindl. - Мак прицветниковый = П(Предкавказ.); Pa(НК);  
[Rs.] <Po> <Esub> l.c. Бештау
830. *P. ocellatum* Woronow - М. глазчатый = П[Михеев, 1993](Туранск.);  
Da,Dd,Rb(T:eph); [R.] <Rx>
831. *P. hybridum* L. - М. гибридный = Прик,ТБ,НК,М,Ст,П(Общедр.средиз.);  
Ra,Rb(T:eph); [Sp.]
832. *P. rhoeas* L. - М. самосейка = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,СК,П  
(Общедр.средиз.); Ra,Rb(T:eph); [R.] <Pm>
833. *P. commutatum* Fisch.et C.A.Meу. - М. спутанный = КЕ,Ст,ЛН,СК,П  
(Субкавказ\*.); Ra,Rb(T:eph); [Sp.]
834. *P. arenarium* Vieb. - М. песчаный = Прик,ТБ,НК,М,Ст,СК,П(Туранск.);  
Ra,Rb(T:eph); [Sp.]
835. *P. laevigatum* Vieb. (*P. maeoticum* Klok.) - М. голый = КЕ,Прик,ТБ,НК,М,  
СК,П(Понтич.); Ra,Rb(T:eph); [R.]
836. ★ *P. alberti* A.D.Mikheev (*P. dubium* L. p.p.) - М. Альберта = Прик,П[Михеев,  
1993](Кавк.); ST(T:eph); [R.] <Es> (рис. 3)
837. *P. stevenianum* A.D.Mikheev (*P. dubium* L. p.p.) - М. Стевена = КЕ,МД,АИ,  
Прик,ТБ,М[Михеев, 1993](Понтич.); ST(T:eph); [R.] l.c. Пятигорск
838. *P. tichomirovii* A.D.Mikheev (*P. dubium* L. p.p.) - М. Тихомирова = Ст,П  
[Михеев, 1993](Кр.-Новоросс.); Ra,Rb(T:eph); [Sp.] l.c. Пятигорск
839. ★ *P. raczoskii* A.D.Mikheev (*P. dubium* L. p.p.) - М. Пачоского = Прик,П[Михеев,  
1993](Кавк.); Ra,Rb(T:eph); [Sp.] <Es> l.c. Пятигорск (рис. 4)

#### Сем. 75. FUMARIACEAE DC. - ДЫМЯНКОВЫЕ

840. *Corydalis marschalliana*(Pall.ex Willd.)Pers - Хохлатка Маршалла = Ст,ЛН,П  
(Субпонт\*.); S(K:eph); [Pl.]
841. ★ *C. caucasica* DC. - Х. кавказская = Ст,ЛН,П,Кисл (Эвксин.); S(K:eph);  
[Sp.]
842. *C. malkensis* Galushko - Х. малкская = П,Кисл(Эуавк.); S(K:eph); [Sp.]
843. ★ *C. angustifolia*(Vieb.)DC. - Х. узколистная = Ст(Субкавказ\*.); S(K:eph); [Rs.]  
<Rg>
844. *Fumaria officinalis* L. - Дымянка лекарственная = Ст(Палеаркт.); Rb(T:eph);  
[Rs.] <Pm>
845. *F. schleicheri* Soy.-Willem. - Д. Шлейхера = Все р-ны(Евро-Сиб.);  
Ra,Rb(T:eph); [Pl.]

846. *F. vaillantii* Loisel - Д. Вайланта = Все р-ны(Общедр.средиз.); Ra,Rb(T); [Sp.]  
<Pm>

Сем. 76. BRASSICACEAE Burnett - КАПУСТНЫЕ(КРЕСТОЦВЕТНЫЕ)

847. *Cardaria draba*(L.)Desv. (*Lepidium draba* L.) - Кардария крупка = Все р-ны  
(Палеаркт.); Rb(НК); [Pl.] <Pm;Pp>

848. *Lepidium campestre*(L.)R.Br. - Кресс(Клоповник) полевой = Все р-ны(Европ.); Ra,Rb(НК:pb); [Sp.]

849. *L. sativum* L. - К. посевной =

М,Ст,СК,П,Кисл(Адвент.[одичавш.культурное]); Rb(T); [R.]

850. *L. ruderale* L. - К. сорный = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(T); [Pl.] <Pm>

851. *L. pinnatifidum* Ledeb. - К. перисторассечённый = П(Тамбукан)(Туранск.);  
Dc(T); [R.] <Rx>

852. *L. perfoliatum* L. - К. пронзённый = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,СК,П  
(Палеаркт.); Rb(T); [Sp.]

853. *L. crassifolium* Waldst.et Kit. - К. толстолистный = Прик,ТБ(Субтуран\*.);  
Dc(НК); [Sp.]

854. *L. latifolium* L. - К. широколистный = Все р-ны(Палеаркт.); Dc(НК); [Pl.]  
<Pm>

855. *Myagrum perfoliatum* L. - Полёвка пронзённолистная = П(Субсредиз\*.);  
Ra,Rb(T); [R.]

856. *Isatis sabulosa* Stev.ex Ledeb. - Вайда песчаная = М,КН(Предкавк.);  
Db(НК:pb); [Sp.] l.c. низовья Терека

857. *I. tinctoria* L. - В. красильная = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,СК,П(Палеаркт.);  
ST,Rb(НК:pb); [R.]

858. ★ *Iberis taurica* DC. - Иберийка крымская = Ст,П(Субкавк\*.); Da(НК:pb); [Rs.]  
<Rx>

859. *Thlaspi arvense* L. - Ярутка полевая = Все р-ны(Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.]

860. *Microthlaspi perfoliatum*(L.)F.K.Mey. (*Thlaspi perfoliatum* L.) - Ярутка  
пронзённолистная = Все р-ны(Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.]

861. *Nossaea macrantha*(Lipsky)F.K.Mey. (*Thlaspi macranthum* (Lipsky) N.Busch) -  
Ярутка крупноцветковая = П,Кисл(Кр.-Новоросс.); ST(T); [R.]

862. *Pachyphragma macrophyllum*(Hoffm.)N.Busch - Толстостенка крупнолистная  
= Ст,ЛН,П(Эвксин.); S(НК:hv); [Sp.] <Rt;Rg>

863. *Capsella bursa-pastoris*(L.)Medik. - Пастушья сумка обыкновенная = Все р-ны(Плюрирег.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm>

864. *Humenolobus procumbens*(L.)Fourt. - Многосемянник простёртый = КН  
(Палеаркт.); Db(T); [R.]

865. *Alliaria petiolata*(Vieb.)Cavara et Grande - Чесночница черешковая = КЕ,  
МД,АИ,НК,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.); S(НК); [Pl.] <Pm>

866. *Sisymbrium officinale*(L.)Scop. - Гулявник лекарственный = Ст,СК,ЛН,П,  
Кисл(Плюрирег.); Ra,Rb(T); [Sp.] <Pm>
867. *S. loeselii* L. - Г. Лёзелиев = Все р-ны(Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.]
868. *S. lipskyi* N.Busch - Г. Липского = П,Кисл[Танфильев, Кононов, 1987]  
(Эукавк.); Pa,ST(НК:pb); [R.]
869. *S. irio* L. - Г. ирио = СК,П(Общедр.средиз.); ST(НК:pb); [R.]
870. *S. polymorphum*(Murr.)Roth - Г. полиморфный = КЕ,М,Ст,СК(Палеаркт.);  
ST(НК); [R.]
871. *S. altissimum* L. - Г. высокий = Все р-ны(Голаркт.); Ra,Rb(T); [Sp.]
872. *S. wolgensе* Vieb.ex Fourn. - Г. волжский = [ТБ, Дорофеев, 1994] (Понтич.);  
ST,Rb(НК); [Sp.]
873. *Descurainia sophia*(L.)Webb ex Prantl - Дескурайния Софии = Все р-ны  
(Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.] <Pa;Pm>
874. *Neotorularia contortuplicata*(Steph.)Hedge et J.Leonard (*Torularia*  
*contortuplicata*(Steph.)O.E.Schulz) - Чёточник скученный = Прик,ТБ,НК,КН  
(Туранск.); Rb(T); [R.]
875. *Arabidopsis pumila*(Steph.)N.Busch - Резушка низкая = МД,АИ,НК,Прик,  
ТБ,КН(Ирано-Туран.); Rb(T); [R.] l.c. Кизляр
876. *A. thaliana*(L.)Heynh. - Р. Таля = КЕ,Ст,СК,П(Палеаркт.); Rb(T); [Sp.]
877. *Camelina sylvestris* Wallr. - Рыжик лесной = П,Прик,ТБ,НК(Палеаркт.);  
Ra,Rb(T); [R.]
878. *C. microcarpa* Andrз. - Р. мелкоплодный = Все р-ны(Палеаркт.); Ra,Rb(T);  
[Pl.]
879. *C. pilosa*(DC.)Zing. - Р. волосистый = Ст,СК,П(Европ.); Ra,Rb(T); [R.]
880. *C. sativa*(L.)Crantz (*C. glabrata*(DC.)Fritsch) - Р. посевной = Все р-ны  
(Панбор.); Ra,Rb(T); [R.]
881. *C. alyssum*(Mill.)Thell. (*C. linicola Schimp.et Spenn.*) - Р. бурачковый = П  
[Дорофеев, 1996](Европ.); Ra(T); [R.]
882. *Brassica campestris* L. - Капуста полевая = Все р-ны(Палеаркт.); Ra,Rb(T);  
[Pl.]
883. *B. juncea*(L.)Czern. - К. сарептская = Все р-ны(Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.]  
<Pm>
884. *B. napus* L. - К. рапс = ТБ[Дорофеев, 1994](Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Sp.]
885. *Erucastrum armoracioides*(Czern.ex Turcz.)Cruent (*Brassica armoracioides*  
*Czern.ex Turcz.; B. elongata Ehrh.*) - К. удлинённая = Все р-ны(Палеаркт.);  
ST(T); [Pl.]
886. *Sinapis arvensis* L. - Горчица полевая = Все р-ны(Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.]  
<Pmel>
887. *S. alba* L. - Г. белая = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П(Палеаркт.); Ra,Rb(T);  
[Sp.] <Pmel>

888. *Diplotaxis muralis*(L.)DC. - Двурядка постенная = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст, СК,П(Евро-Кавк.); Rb(T); [Pl.]
889. *D. viminea*(L.)DC. - Д. виминя = Ст,Прик[Дорофеев, 1994](Евро-Кавк.); Rb(T); [Sp.]
890. *Raphanus raphanistrum* L. - Редька обыкновенная = Все р-ны(Адвент. [Зап.Европа]); Ra,Rb(T); [Pl.]
891. ★ ★ *Crambe cordifolia* Stev. - Катран сердцелистный = СК,П(Предкавк.); ST(НК); [R.] <Esub> l.c. Георгиевск
892. ★ *C. pinnatifida* R.Br. - К. перистый = КЕ,Ст,СК,П(Понтич.); ST(НК); [R.] <Pa>
893. ★ *C. gibberosa* Rupr. - К. бугорчатый = КЕ,Прик,ТБ,НК,М(Кавк.); ST(НК); [R.] <Pa>
894. ★ *C. tatarica* Sebeok - К. татарский = КЕ,Прик,ТБ,Ст,СК,П(Понтич.); ST(НК); [R.] <Pa>
895. ★ *C. grandiflora* DC. - К. крупноцветковый = МД,АИ,СК,Кисл(Предкавк.); ST(НК); [Rs.] l.c. Таманский п-ов <Esub>
896. ★ ★ *C. steveniana* Rupr. - К. Стевена = Прик,ТБ,НК,Ст,СК,П,Кисл(Понтич.); ST(НК); [R.] l.c. Георгиевск
897. ★ ★ *C. koktebelica*(Junge)N.Busch - К. коктебелийский = Ст,СК,П(Кр.-Новоросс.); ST,Dd(НК); [R.] <Rx>
898. *Rapistrum rugosum*(L.)All. - Репник морщинистый = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК, П(Субсредиз\*.); Pa,ST(T); [Sp.]
899. *Conringia orientalis*(L.)Dumort. - Конрингия восточная = Все р-ны (Общедр.средиз.); Pa(T); [Pl.]
900. *C. austriaca*(Jacq.)Sweet - К. австрийская = П(Европ.); Pa(T); [R.]
901. *Cardamine impatiens* L. - Сердечник недотрога = Ст,П,Кисл(Палеаркт.); S(T); [Sp.]
902. *C. hirsuta* L. - С. жестковолосистый = П,Кисл(Плюрирег.); S(T); [R.]
903. *C. uliginosa* Vieb. - С. болотный = Кисл(Зап.др.средиз); Ab(K); [Pl.]
904. *C. tenera* S.G.Gmel.ex C.A.Meу. - С. нежный = [Ст: Танфильев, Кононов, 1987](Субкавк\*.); Aa,S(НК); [R.]
905. *Dentaria bulbifera* L. - Зубянка луковиценосная = П,Кисл(Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]
906. *D. quinquefolia* Vieb. - З. пятилистная = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,СК,П,Кисл (Евро-Кавк.); S(K:ephd); [Pl.]
907. *Barbarea vulgaris* R.Br. - Сурепка обыкновенная = СК,П(Европ.); Aa(НК); [R.] <Pm;Pmel>
908. *B. arcuata*(Opiz.exJ.et C.Presl.)Reichenb. - С. дуговидная = Все р-ны (Палеаркт.); Pa,Rb(НК:pb); [Pl.]
909. *Arabis turrata* L. - Резуха башенная = Ст(Субсредиз\*.); Pa(НК:pb); [R.]



910. *A. sagittata*(Bertol.)DC. (*A. hirsuta auct.*) - Р. стреловидная = КЕ,Прик, ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Панбор.); S(T); [Sp.]
911. *A. recta* Vill. (*A. auriculata* Lam.) - Р. прямая = М,Ст,СК,П(Общедр. средиз.); Ра(Т); [Sp.]
912. *Turritis glabra* L. - Вяжечка голая = Все р-ны(Палеаркт.); Ра,Ра,Рb(Т); [Pl.] <Pm>
913. *Nasturtium officinale* R.Br. - Жеруха лекарственная = Ст,ЛН,СК,П (Палеаркт.); Ab(К); [R.] <Pm>
914. *Rorippa sylvestris*(L.)Bess. - Жерушник лесной = Ст,П,Кисл(Европ.); Ab(К); [R.]
915. *R. anceps*(Wahlenb.)Reichenb. (*R. prostrata*(J.P.Bergeret)Schinz et Thell) - Ж. обоюдоострый = ЛН,П,Кисл(Европ.); Аa(НК); [R.]
916. *R. barbareaifolia*(DC.)Kitag. (*R. islandica*(Oed.)Schinz et Thell; *R. palustris*(Leys.)Bess.) - Ж. сурепколистный = Все р-ны(Голаркт.); Аa(НК); [Pl.]
917. *R. brachycarpa*(С.А.Меу.)Науек - Ж. короткоплодный = ЛН(Понт.-Южносиб.); Аa,Ab(К); [R.]
918. *R. amphibia*(L.)Bess. - Ж. земноводный = МД,НК(Палеаркт.); Аa,Ab(К); [R.]
919. *R. austriaca*(Crantz)Bess. - Ж. австрийский = Все р-ны(Европ.); Аa,Ab(К); [Sp.]
920. *Draba stylalis* J.Gay ex Koch - Крупка столбиковая = П,Кисл(Европ.); ST(НК); [Sp.]
921. *D. sibirica*(Pall.)Thell. - К. сибирская = Ст,П,Кисл(Евро-Сиб.); Pb(НК); [Sp.]
922. *D. nemorosa* L. - К. перелесковая = Все р-ны(Панбор.); Ра(Т); [Pl.] <Pm>
923. *D. muralis* L. - К. настенная = СК,П(Европ.); ST(Т); [R.]
924. *Erophila verna*(L.)Bess. - Веснянка весенняя = Все р-ны(Палеаркт.); ST,SD(Т:eph); [Pl.]
925. *E. krockeri* Andrz. - В. Крокера = Ст[Дорофеев, 1994](Европ.); ST(Т:eph); [R.]
926. *Alyssum tortuosum* Waldst.et Kit. - Бурачок извилистый = Ст,ЛН,СК, П,Кисл(Вост.др.средиз.); ST(НК); [Pl.]
927. ★ *A. obtusifolium* Stev.ex DC. - Б. туполистный = Ст(Кр.-Новоросс.); Db(НК); [Rs.] <Rx>
928. *A. murale* Waldst.et Kit. - Б. стеной = ЛН,Кисл(Зап.др.средиз.); ST(НК); [Pl.]
929. *A. trichostachium* Rupr. - Б. пушистый = П,Кисл(Кавк.); Pb(Т); [Sp.] l.c.  
Кисловодск
930. *A. rostratum* Stev. - Б. носатый = Ст(Понтич.); Da(НК:pb); [R.] <Rx>
931. *A. minutum* Schlecht.ex DC. - Б. маленький = КЕ(Субпонт\*.); ST(Т); [R.] <Rx>
932. *A. desertorum* Stapf - Б. пустынный = Все р-ны(Палеаркт.); ST,SD(Т); [Pl.]
933. *A. hirsutum* Vieb. - Б. шершавый = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Субпонт\*.); ST,SD(Т); [Sp.]

934. *A. parviflorum* Fisch.ex Bieb. (*A. rothmaleri Galushko.*; *A. campestre auct.*) - Б. мелкоцветковый = П,Кисл(Армено-Иран.); ST(T); [Sp.] <Rx>
935. *A. calycinum* L. (*A. alyssoides(L.)L.*) - Б. чашечковый = Все р-ны (Общедр.средиз.); ST(T); [Pl.]
936. *Meniocus linifolius*(Steph.)DC. - Плоскоплодник линейнолистный = Все р-ны(Палеаркт.); SD(T); [Pl.]
937. *Berteroa incana*(L.)DC. - Икотник серый = Все р-ны(Евро-Сиб.); ST,Ra,Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm;Pmel>
938. *Euclidium syriacum*(L.)R.Br. - Крепкоплодник сирийский = Все р-ны (Ирано-Туран.); Rb(T); [Pl.]
939. ★ *Litwinowia tenuissima*(Pall.)Woronow ex Pavl. - Литвиновия тончайшая = Прик,ТБ,НК(Туранск.); ST,Rb(T); [Rs.] <Rx>
940. *Neslia paniculata*(L.)Desv. - Неслия метельчатая = Все р-ны(Евро-Сиб.); ST,Ra,Rb(T); [Pl.] <Pm>
941. *Bunias orientalis* L. - Свербига восточная = Все р-ны(Евро-Кавк.); ST,Ra,Rb(НК:pb); [Pl.]
942. ★ *Strigosella africana*(L.)Botsch. (*Malcolmia africana(L.)R.Br.*) - Стригозелла африканская = КН(Кара-Тюбе)[Танфильев, Кононов, 1979] (Общедр. средиз.); Ra,Rb(T); [R.] <Rx>
943. *Nesperis caucasica* Rupr. (*H. matronalis L.*) - Ночная фиалка кавказская = П,Кисл (Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]
944. *H. sibirica* L. - Н.ф. сибирская = Ст(Евро-Сиб.); S(НК); [R.] <Rg>
945. *H. tristis*(L.)G.Beck. - Н. ф. мрачная = КЕ,Ст,СК,П(Понтич.); Pa,ST(НК); [R.]
946. *H. ruscotricha* Borb.et Degen - Н.ф. густоволосистая = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Евро-Сиб.); S(НК:pb); [Pl.]
947. ★ *Goldbachia laevigata*(Bieb.)DC. - Гольдбахия гладковатая = М(Орловка на Купе)(Туранск.); Rb(T); [Rs.] <Rx>
948. *Erysimum cuspidatum*(Bieb.)DC. - Желтушник щитовидный = Все р-ны (Общедр.средиз.); Pa,ST(НК:pb); [R.]
949. *E. aureum* Bieb. - Ж. золотистый = Все р-ны(Кавк.); S,Pa(НК:pb); [Sp.]
950. *E. meyerianum*(Rupr.)N.Busch - Ж. Мейера = Кисл(Эукавк.); SD(НК); [R.] <Esub.]
951. *E. brevistylum* Somm.et Levier - Ж. короткостолбиковый = Кисл(Эукавк.); ST(НК:pb); [R.] <Esub.>
952. *E. leptostylum* DC. - Ж. тонкостолбиковый = КЕ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Понтич.); ST(НК:pb); [R.] l.c. Бештау.
953. *E. substrigosum*(Rupr.)N.Busch - Ж. шершавый = П,Кисл(Эукавк.); Da(НК); [Sp.]
954. *E. gerandum* L. - Ж. выгрызенный = Все р-ны(Общедр.средиз.); SD,Ra,Rb(T); [Sp.]

955. *E. leucanthemum*(Steph.)B.Fedtsch. - Ж. бледноцветковый = Ке, Прик, Тб, НК, М, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Ирано-Туран); ST(НК:pb); [Sp.]
956. *E. versicolor*(Bieb.)Andrz. - Ж. разноцветный = МД, АИ, НК, Прик, Тб, М, КН (Палеаркт.); ST(НК); [R.]
957. *E. canescens* Roth (*E. diffusum* Ehrh.) - Ж. раскидистый = Ке, Прик, Тб, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Вост. др. средиз.); ST(НК:pb); [Sp.] <Pm>
958. *E. ucranicum* J. Gay - Ж. украинский = Ке [г. Изобильный: Дорофеев, 1991] (Евро-Кавк.); ST(НК); [Rs.] <Rx>
959. *Syrenia siliculosa*(Bieb.)Andrz. - Сирения стручковая = МД, АИ, НК, Прик, Тб, Ст, СК, П (Субтуран\*.); Db(НК:pb); [Pl.] l.c. Прикумские пустыни <Pm>
960. *S. montana*(Pall.)Клок. (*S. sessilifolia*(DC.)Ledeb.) - С. горная = Ке, МД, АИ, НК, Прик, Тб, Ст, СК (Понтич.); Db(НК:pb); [R.]
961. ★ *Matthiola caspica*(N. Busch)Grossh - Левкой каспийский = Кисл (Кисловодск) [Иванов, ](Эукавк.); Da(НК); [Rs.] <Rx>
962. *Chorispora tenella*(Pall.)DC. - Хориспора нежная = Все р-ны (Общедр. средиз.); Ra, Rb(T); [Pl.]
963. ★ *Clausia arctica*(Steph.)Korn.-Tr. - Клаузия солнцепёчная = Кисл (г. Кольцо, г. Медведка) (Понт.-Южносиб); Da(НК); [Rs.] <Rx>

#### Сем. 77. CAPPARACEAE Juss. - КАПЕРЦЕВЫЕ

964. ★ *Capparis herbacea* Willd. (*C. spinosa* L.) - Каперцы травянистые НК, Прик, Ст, ЛН, СК (Вост. др. средиз.); Dd(Ch:sf); [Sp.] <Pa; Pm; Pmel>

#### Сем. 78. RESEDACEAE S.F. Gray - РЕЗЕДОВЫЕ

965. *Reseda lutea* L. - Резеда жёлтая = Все р-ны (Зап. др. средиз.); Pa, Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm>

#### Сем. 79. CRASSULACEAE DC. - ТОЛСТЯНКОВЫЕ

966. *Sempervivum caucasicum* Rupr. ex Boiss. - Молодило кавказское = П, Кисл (Эукавк.); Da(НК:ps); [Sp.] <Po>
967. *S. pumilum* Bieb. - М. низкое = П, Кисл (Кавк.); Da(НК:ps); [Pl.] <Po>
968. *Hylotelephium caucasicum*(Grossh.)H. Ohba (*Sedum caucasicum* Grossh.) - Очиточник кавказский = Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Кавк.); Da(НК:ps); [Pl.] <Pm>
969. *Sedum spurium* Bieb. - Очиток ложный = П, Кисл (Эвксин.); Da(НК:ps); [R.] l.c. Пятигорск
970. *S. oppositifolium* Sims - О. супротиволистный = П, Кисл (Субкавк\*.); Da(НК:ps); [Sp.] <Pm>
971. *S. stoloniferum* S.G. Gmel. - О. побегоносный = П (Субкавк\*.); S(НК:ps); [R.] <Rg>
972. *S. album* L. - О. белый = Кисл (Понт.-Южносиб); Da(НК:ps); [R.]

973. *S. subulatum*(C.A.Mey.)Boiss. - О. шиловидный = Ст,П,Кисл(Субкавказ\*.);  
Da(НК:ps); [Sp.]
974. *S. acre* L. - О. едкий = Ст,П,Кисл(Европ.); Da(НК:ps); [Sp.] <Pt;Pm;Po>
975. *S. reflexum* L. - О. отогнутый = Ст,П[Мизирева, 1993](Европ.); Da(НК:ps);  
[R.] <Po>
976. *S. hispanicum* L. - О. испанский = Все р-ны(Средиземн.); ST, Da, Db(Т:ps);  
[Pl.]
977. *S. pallidum* Bieb. - О. бледный = П(Армено-Иран.); ST, Rb(Т:ps); [Pl.]
978. ★ *Prometeum pilosum*(Bieb.)H.Ohba (*Rosularia pilosa*(Grossh.)Boriss.) -  
Прометеум (Розулярия) волосистый = П(Бештау)(Эукавказ); Da(НК:ps); [Rs.]  
<Rx>

#### Сем. 80. SAXIFRAGACEAE Juss. - КАМНЕЛОМКОВЫЕ

979. ★ *Saxifraga flagellaris* Willd. ex Sternb. - Камнеломка плетистая = П(Бештау)  
(Евро-Сиб.); Da(НК); [Rs.] <Rg>
980. *S. tridactylites* L. - К. трёхпалая = Ст,ЛН,П,Кисл(Европ.); Da(Т); [Pl.]
981. *S. mollis* Smith - К. мягкая = Кисл(Армено-Иран.); Pс(НК); [Sp.]
982. *S. juniperifolia* Adams - К. можжевелолистная = Кисл(Кавк.); Da(НК); [R.]
983. *Chrysosplenium alternifolium* L. - Селезёночник очереднолистный = П,Кисл  
(Панбор.); S(Т); [Pl.] <Pm>

#### Сем. 81. PARNASSIACEAE S.F.Gray - БЕЛОЗОРОВЫЕ

984. *Parnassia palustris* L. - Белозор болотный = П,Кисл(Голаркт.); Aa(НК); [R.]  
<Pm>

#### Сем. 82. GROSSULARIACEAE DC. - КРЫЖОВНИКОВЫЕ

985. *Ribes biebersteinii* Berl. ex DC. - Смородина Биберштейна = Кисл(Кавк.);  
S(Phn); [R.] <Pa>
986. *R. alpinum* L. - С. альпийская = П,Кисл(Европ.); S(Phn); [R.] <Pa>
987. *Grossularia reclinata*(L.)Mill. - Крыжовник отклонённый = П,Кисл(Европ.);  
S(Phn); [Pl.] <Pa;Pm>

#### Сем. 83. ROSACEAE Juss. - РОЗОВЫЕ

988. *Spiraea crenata* L. - Спирея(Таволга) городчатая = Ст,ЛН,П,Кисл(Понт.-  
Южносиб.); Pa, ST(Phn); [Sp.] <Pmel>
989. *Aruncus vulgaris* Rafin. - Волжанка обыкновенная = П,Кисл(Европ.); S(НК);  
[Sp.] <Po>
990. *Cotoneaster melanocarpus* Fisch. ex Blytt - Кизильник черноплодный = П,Кисл  
(Палеаркт.); Da(Phn); [Sp.]

991. ★ *C. integerrimus* Medik. - К. цельнокрайний = Ст(Европ.); Pa,ST(Phn); [Rs.] <Rg>
992. ★ *C. nefedovii* Galushko - К. Нефёдова = П(Предкавказ.); Pa(Phn); [Rs.] <Es>(рис.5)
993. *C. meyeri* Pojark. - К. Мейера = Ст,П,Кисл(Кавк.); Pa,ST(Phn); [R.]
994. *Rugos caucasica* Fed. - Груша кавказская = Ке,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК, П,Кисл(Кавк.); S(Phms); [Pl.] <Pa;Pmel>
995. *Malus orientalis* Uglitzk. - Яблоня восточная = Все р-ны(Субкавказ\*.); S(Phms); [Pl.] <Pa;Pm>
996. *Sorbus aucuparia* L. - Рябина обыкновенная = П,Кисл(Европ.); S(Phms); [Pl.] <Pm;Pa>
997. *S. caucasica* Zinserl. - Р. кавказская = П,Кисл(Кавк.); Pa,S(Phm); [Sp.] l.c. Бештау
998. *S. graeca*(Spach)Lodd.ex Schauer. - Р. греческая = П(Машук),Кисл (Дарьинские высоты)(Евро-Кавк.); S(Phm); [R.] <Rg>
999. ★ *S. torminalis*(L.)Crantz - Р. глоговина = П,Кисл(Европ.); S(Phms); [Sp.] <Rg;Rt>
1000. *Amelanchier ovalis* Medik. (*A. rotundifolia*(Lam.)Dum.-Cours. nom. illegit.) - Ирга овальная = П,Кисл(Средиземн.); Da(Phn); [Sp.] <Pa>
1001. *Mespilus germanica* L. - Мушмула германская = М(Терек),П(Общедр. средиз.); S(Phm); [R.] <Pm>
1002. *Crataegus pentagyna* Waldst.et Kit. - Боярышник пятипестичный = Все р-ны (Зап.др.средиз.); Pa,ST(Phm); [Pl.] <Pm;Pa;Pmel>
1003. *C. curvisepala* Lindm. (*C. kyrtostyla auct.*) - Б. согнуточашелистниковый = Ке,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Европ.); S(Phm); [Sp.] <Pm;Pa;Pmel>
1004. *C. pallasii* Griseb. - Б. Палласа = КН(Понтич.); Db(Phm); [Sp.] <Pmel>
1005. *C. monogyna* Jacq. - Б. однопестичный = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Европ.); S(Phm); [Sp.] <Pm;Pa;Pmel>
1006. *C. microphylla* C.Koch - Б. мелколистный = П(Субкавказ\*.); S(Phn); [R.] <Pmel>
1007. *C. ambigua* C.A.Mey.ex A.Beck. - Б. сомнительный = М,КН(Понтич.); Db(Phm); [Sp.] <Pmel>
1008. *Rubus saxatilis* L. - Костяника обыкновенная = П,Кисл(Панбор.); Pb(НК); [Sp.] <Pa;Pmel>
1009. *R. buschii* Grossh.ex Sinjakova - Малина Буша = Ст,П,Кисл(Кавк.); S(Ch); [Sp.] <Pm;Pa;Pmel>
1010. *R. sandicans* Weihe - Ежевика беловатая = [Прик(г.Брык): Танфильев, Кононов, 1987](Европ.); S(Phn); [R.] <Pa;Pmel>
1011. *R. canescens* DC. (*R. tomentosus* Borkh. nom. illegit.) - Е. седоватая = П (Зап.др.средиз.); S(Phn); [R.] <Pa;Pmel>

1012. *R. caucasicus* Focke - Е. кавказская = П,Кисл(Эвксин.); S(Phn); [R.]  
<Pa;Pmel>
1013. *R. caesius* L. - Е. сизая = Все р-ны(Палеаркт.); S,Pa(Phn); [Pl.] <Pa;Pm;Pmel>
1014. *Fragaria viridis*(Duch.)Weston - Земляника зелёная = Все р-ны(Евро-Сиб.);  
Pa(НК); [Pl.] <Pm;Pa>
1015. *F. vesca* L. - З. лесная = Все р-ны(Голаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pm;Pa>
1016. *F. moschata*(Duch)Weston - З. мускусная = Ст,ЛН,СК,П(Европ.); S(НК); [R.]  
<Pm;Pa>
1017. *Pentaphylloides fruticosa*(L.)O.Schwarz (*Dasiphora fruticosa*(L.) Rydb.) -  
Курильский чай кустарниковый = П,Кисл(Панбор.); Pb(Ch); [R.] <Pa>
1018. *Potentilla argentea* L. - Лапчатка серебристая = Все р-ны(Евро-Сиб.);  
ST(НК); [Pl.] <Pm>
1019. *P. canescens* Bess. (*P. inclinata auct.*) - Л. седая = Все р-ны(Палеаркт.);  
Pa(НК); [Sp.]
1020. *P. recta* L. - Л. прямая = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,ST(НК); [Pl.]
1021. *P. obscura* Willd. - Л. неясная = Все р-ны(Субкавк\*.); Pa,ST(НК); [Sp.]
1022. *P. astrachanica* Jacq. - Л. астраханская = КЕ,[Прик,ТБ,Ст,: Танфильев,  
Кононов, 1987](Понтич.); Da,Db(НК); [Sp.]
1023. *P. supina* L. - Л. низкая = Все р-ны(Голаркт.); Aa(T); [Pl.]
1024. *P. caucasica* Juz. - Л. кавказская = КЕ,Прик,ТБ,Ст,СК,П(Кавк.); Pa,ST(НК);  
[Sp.]
1025. *P. adscharica* Somm.et Levier - Л. аджарская = Ст,ЛН,СК,П,Кисл  
(Субкавк\*.); Pa,ST(НК); [Sp.]
1026. *P. humifusa* Willd.ex Schlecht. - Л. распростёртая = Ст,ЛН,СК,П,Кисл  
(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Sp.]
1027. *P. adenophylla* Boiss.et Hohen. - Л. железистая = Ст,ЛН,Кисл(Субкавк\*.);  
ST(НК); [Sp.]
1028. *P. arenaria* Borkh. (*P. glaucescens Schlecht.*) - Л. песчаная = Ст,СК,П,  
Кисл(Понт.-Южносиб.); ST,Da(НК); [Sp.]
1029. *P. erecta*(L.)Raeusch. - Л. прямостоящая = Кисл(Европ.); Pb(НК); [Sp.]
1030. *P. reptans* L. - Л. ползучая = Все р-ны(Палеаркт.); Aa(НК); [Pl.] <Pm;Pp>
1031. *P. anserina* L. - Л. гусиная лапка = П,Кисл(Плюрирег.); Aa(НК); [R.]  
<Pm;Pmel>
1032. *Geum urbanum* L. - Гравилат городской = Все р-ны(Палеаркт.); S,Rb(НК);  
[Pl.] <Pm;Pa>
1033. *G. allepicum* Jacq. (*G. strictum Ait.*) - Г. аллепский = Ст,ЛН,П,Кисл  
(Голаркт.); S(НК); [R.]
1034. *G. rivale* L. - Г. речной - Кисл(Голаркт.); Aa(НК); [Sp.]

1035. ★*Dryas caucasica* Juz. (*D. octopetala* L. subsp. *caucasica* (Juz.) Hult.) = Куропаточья трава кавказская = Кисл(г. Кабан) [Михеев, 1976] (Эукавк); Pс(Ch:hv); [R.]
1036. *Filipendula vulgaris* Moench (*F. hexapetala* Gilib.) - Лабазник обыкновенный = Все р-ны(Евро-Сиб.); Pa,ST(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>
1037. *F. ulmaria* (L.) Maxim. - Л. вязолистный = П,Кисл(Евро-Сиб.); Aa(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>
1038. *Alchemilla sericata* Reichenb.ex Bus. - Манжетка шелковистая = П,Кисл(Кавк.); Pс(НК); [Pl.]
1039. *A. rigida* Bus. - М. жёсткая = П(Бештау),Кисл(Кавк.); Pс(НК); [Pl.]
1040. *A. caucasica* Bus. - М. кавказская = П,Кисл(Кавк.); Pс(НК); [Pl.] <Pp>
1041. *A. languida* Bus. - М. вялая = П,Кисл(Эукавк.); Pс(НК); [Sp.] l.c. Кисловодск
1042. *A. divaricans* Bus. - М. растопыряющаяся = Кисл(Эукавк.); Pс(НК); [R.] <Esub.> l.c. Кисловодск
1043. *A. tephroserica* (Bus.) Juz. - М. пепельно-шелковистая = Кисл(Эукавк.); Pс(НК); [Sp.] <Esub>
1044. *A. microdonta* Juz. - М. мелкозубчатая = Кисл(Эукавк.); Pс(НК); [Sp.]
1045. *Agrimonia eupatoria* L. - Репейничек аптечный = Все р-ны(Евро-Кавк. ); Pa,ST(НК); [Pl.] <Pm>
1046. *Sanguisorba officinalis* L. - Кровохлёбка аптечная = П,Кисл(Голаркт.); Pb(НК); [Sp.] <Pm;Pp>
1047. *Poterium polygamum* Waldst.et Kit. - Черноголовник многобрачный = Все р-ны(Общедр.средиз.); Pa,ST(НК); [Pl.]
1048. ★*Rosa gallica* L. - Шиповник французский = П(Европ.); S(Ch:fl); [R.] <Rg;Pmel>
1049. *R. pimpinellifolia* L. (*R. spinosissima* L.) - Ш. бедренецелистный = Все р-ны(Палеаркт.); ST(Phn); [Pl.] <Pmel>
1050. *R. elasmocantha* Trautv. - Ш. плоскошипый = СК,П,Кисл(Эукавк.); ST(Phn); [R.] <Pmel>
1051. *R. canina* L. - Ш. собачий = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,ST(Phn); [Pl.] <Pm;Pmel>
1052. ★*R. caesia* Smith (*R. coriifolia* Fries.) - Ш. сизый = Ст(Ставрополь) [Танфильев, Кононов, 1987](Европ.); ST(Phn); [R.] <Pm;Pmel>
1053. ★*R. dolichocarpa* Galushko - Ш. удлиненноплодный = П(г.Развалка) (Предкавк.); Da(Phn); [Rs.] <Es> l.c. Железноводск (рис. 6)
1054. *R. corymbifera* Borkh. - Ш. щитконосный = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,ST(Phn); [Pl.] <Pmel>
1055. *R. balsamina* Bess. (*R. klukii* Bess.) - Ш. Клюка = Все р-ны(Евро-Кавк.); ST(Phn); [Sp.] <Pmel>

1056. *R. marschalliana* Sosn. - Ш. Маршалла = Все р-ны(Эукавк.); Pa,ST(Phn); [R.] <Pmel>
1057. *R. iberica* Stev.ex Bieb. - Ш. грузинский = Ст,СК,П,Кисл(Субкавк\*.); ST(Phn); [Sp.] <Pmel>
1058. *R. pulverulenta* Bieb. (*R. glutinosa auct.*) - Ш. припудренный = П,Кисл (Зап.др.средиз.); ST(Phn); [Sp.] <Pmel> 1.с. Кисловодск
1059. *R. tomentosa* Smith (*R. cuspidata* Bieb.) - Ш. войлочный = П,Кисл (Европ.); S(Phn); [Sp.] <Pmel>
1060. *R. mollis* Smith - Ш. мягкий = Ст,СК,Кисл(Евро-Кавк.); S(Phn); [R.] <Pmel>
1061. ★*R. praetermissa* Galushko - Ш. пропущенный = Кисл(Эукавк.); Pa,ST(Phn); <Esub>
1062. *R. boissieri* Crep. - Ш. Буасье = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Субкавк\*.); S(Phn); [Sp.] <Pmel>
1063. *R. jundzillii* Bess. - Ш. Юндзилла = Ке,Ст,ЛН,СК,П(Европ.); ST(Phn); [R.] <Pmel>
1064. *Prunus spinosa* L. - Слива колючая = Все р-ны(Евро-Кавк.); Pa,ST(Phn); [Pl.] <Pa;Pm>
1065. *P. divaricata* Ledeb. - С. растопыренная(Алыча) = Все р-ны (Общедр.средиз.); S(Phm); [Pl.] <Pa;Pm>
1066. *Amygdalus nana* L. - Миндаль низкий = Все р-ны(Понтич.); ST(Ch); [Sp.]
1067. *Cerasus avium*(L.) Moench - Вишня птичья(Черешня) = Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Европ.); S(Phms); [Pl.] <Pa;Pmel>
1068. ★*C. fruticosa* Pall. - В. кустарниковая = Ст,СК(Понт.-Южносиб.); ST(Phn); [R.] <Po>
1069. ★*C. incana*(Pall.) Spach - В. серая = П(Армено-Иран.); ST(Phn); [R.] <Rx>
1070. *Armeniaca vulgaris* Lam. - Абрикос обыкновенный = Все р-ны(Адвент. [Средняя Азия, Китай]; S(Phms); [Pl.] <Pa,Pmel,Pm>

#### Сем. 84. CAESALPINIACEAE R.Br. - ЦЕЗАЛЬПИНИЕВЫЕ

1071. *Gleditsia triacanthos* L. - Гледичия трёхколючковая = Все р-ны(Адвент. [Сев.Америка]; S(Phms); [Sp.] <Po>

#### Сем. 85. FABACEAE Lindl. - БОБОВЫЕ

1072. *Amorpha fruticosa* L. - Аморфа кустарниковая = Все р-ны(Адвент.[Сев. Америка]; ST(Phm); [Sp.] <Po,Pm>
1073. *Robinia pseudoacacia* L. - Белая акация обыкновенная = Все р-ны(Адвент. [Сев. Америка]; S,ST(Phms); <Po>
1074. *Pseudosophora alopecuroides*(L.) Sweet (*Sophora alopecuroides* L.) - Псевдософора лисохвостная = М,КН(Вост.др.средиз.); Db(НК); [Sp.] <Pt>



1075. ★ *Argyrolobium biebersteinii* P.W.Ball (*A. calycinum* (Bieb.) Jaub. et Spach, nom. superfl.) - Аргиролобиум Биберштейна = СК,П,Кисл(Армено-Иран.); Pa(Ch:sf); [R.] <Rg>
1076. *Genista compacta* Schischk. (*G. albida* Willd.) - Дрок плотный = П,Кисл (Эукавк.); Da(Ch); [R.] <Po>
1077. ★ *G. angustifolia* Schischk. - Д. узколистный = П[Дубовик, 1990],Кисл (Предкавк.); Da(Ch:fl); [R.] <Esub>
1078. *G. patula* Vieb. - Д. отклонённый = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Кавк.); Pa(Ch); [Sp.] <Po>
1079. ★ *Cytisus austriacus* L. (*Chamaecytisus austriacus* (L.) Link) - Ракитник австрийский = Ст,СК(Георгиевск)(Понтич.); ST(Ch); [R.] <Po;Rg>
1080. *Chamaecytisus borystenicus* (Grun) Klaskova (*Cytisus borystenicus* Grun) - Ракитничек днепровский = Ке,Ст(Понт.-Южносиб.); Db(Ch); [R.] <Po> <Rx>
1081. *Ch. lindemannii* (V.Krecz.) Klaskova (*C. lindemannii* V.Krecz.) - Р. Линдемманна = Ст,СК,П,Кисл(Понтич.); Pa(Ch); [R.] <Po>
1082. *Ch. ruthenicus* (Fisch.ex Woloszcz.) Klaskova (*Ch. caucasicus* (Grossh.) Holub) - Р. русский = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Понт.-Южносиб.); Pa(Ch); [Sp.] <Po>
1083. ★ *Ch. wolffii* (V.Krecz.) Klaskova (*C. wolffii* V.Krecz.) - Р. Вульфа = Кисл (Понтич.); Da(Ch); [Rs.] <Rx>
1084. ★ *Ononis pusilla* L. - Стальник маленький = П,Кисл[Танфильев, Кононов, 1987](Средиз.); Pa(Ch:sf); [Rs.] <Rx>
1085. *O. arvensis* L. - С. пашенный = Все р-ны(Евро-Сиб.); Pa(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>
1086. *Trigonella orthoceras* Kar.et Kir. - Пажитник пряморогий = МД,АИ,НК, Прик,ТБ,М,СК,КН(Вост.др.средиз.); ST(T); [Sp.]
1087. *T. monspeliaca* L. - П. монпельевский = М,Ст,КН(Субпонт\*.); SD,Rb(T); [R.]
1088. *T. procumbens* (Bess.) Reichenb. - П. простёртый = Ке,МД,АИ,НК,Прик, ТБ,Ст,СК,КН(Палеаркт.); ST(T); [Sp.]
1089. *T. coerulescens* (Bieb.) Halacsy - П. голубоватый = Прик,ТБ,НК,М,КН (Зап.др.средиз.); SD(T); [R.] <Rx> l.c. Ачикулак
1090. *Medicago lupulina* L. - Люцерна хмелевидная = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Rb(НК); [Pl.] <Pp>
1091. ★ ★ *M. cancellata* Vieb. - Л. решётчатая = Прик,Ст(Понтич.); Db(НК); [R.] <Rx;Pp>
1092. *M. falcata* L. - Л. серповидная = Все р-ны(Палеаркт.); ST(НК); [Pl.] <Pp;Pmel>
1093. *M. romanica* Prod. - Л. румынская = Ке,ЛН,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Палеаркт.); ST(НК); [R.] <Pp>

1094. *M. sativa* L. - Л. посевная = Все р-ны(Голаркт.); Pa,ST(НК); [Sp.]  
<Pp;Pm;Pmel>
1095. *M. vardanis* Vass. - Л. варданикская = Кисл(Эукавк.); ST(НК); [R.] l.c.  
Кисловодск
1096. *M. caerulea* Less.ex Ledeb. - Л. голубая = Все р-ны(Туранск.); ST,Db(НК);  
[Pl.] <Pp>
1097. *M. glutinosa* Bieb. - Л. клейкая = П,Кисл(Эукавк.); Pa,ST(НК); [R.] <Pp>
1098. *M. orbicularis*(L.)Bartalini - Л. округлая = Ст,СК,П(Зап.др.средиз.);  
ST,Rb(НК); [Sp.] <Pp>
1099. *M. rigidula*(L.)All. (*M. agrestis* Ten.)- Л. жестковатая = СК(Георгиевск и  
Новомарьевская)(Общедр.средиз.); ST,Rb(T); [R.]
1100. *M. minima*(L.)Bartalini - Л. мелкая = Все р-ны(Общедр.средиз.); ST,Rb(T);  
[Pl.]
1101. *Melilotus polonicus*(L.)Pall. (*M. caspius* Grun.) - Донник каспийский = М,КН  
(Субтуран\*.); Db(НК); [Pl.] <Pp>
1102. *M. dentatus*(Waldst.et Kit)Pers. - Д. зубчатый = Все р-ны(Палеаркт.);  
Aa(НК); [Sp.] <Pp>
1103. *M. albus* Medik. - Д. белый = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(НК); [Pl.]  
<Pm;Pmel;Pp>
1104. *M. wolgicus* Poir. - Д. волжский = П,КН(Понт.-Южносиб.); Rb(T); [Rs.]  
<Pp> <Rx>
1105. *M. officinalis*(L.)Pall. - Д. лекарственный = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(НК);  
[Pl.] <Pm;Pmel;Pp>
1106. *Amoria montana*(L.)Sojak (*Trifolium montanum* L.) - Амория (Клевер) горная  
= КЕ, Прик,ТБ,Ст,СК,ЛН,П,Кисл(Евро-Сиб.); Pa(НК); [Pl.] <Pp>
1107. *A. ambigua*(Bieb.)Sojak (*T. ambiguum* Bieb.) - А. (К.) непостоянная = Все р-  
ны (Субпонт\*.); Pa(НК); [Pl.] <Pp>
1108. *A. repens*(L.)C.Presl (*T. repens* L.) - А. (К.) ползучая = Все р-ны(Палеаркт.);  
Pa,Rb(НК); [Pl.] <Pp;Pmel;Pm>
1109. *A. hybrida*(L.)C.Presl (*T. hybridum* L.) - А. (К.)гибридная = Ст,П,Кисл  
(Европ.); Pa(НК); [Sp.] <Pp;Pm>
1110. *A. angulata*(Waldst.et Kit.)C.Presl (*T. angulatum* Waldst.et Kit.) - А.(К.)  
угловатая = Все р-ны(Евро-Кавк.); Pa(T); [R.] <Pp>
1111. *A. retusa*(L.)Dostal (*T. retusum* L.; *T. parviflorum* Ehrh.) - А.(К.)  
притупленная = Ст,СК,П,Кисл(Субсредиз\*.); Pa,Aa(T); [Sp.]
1112. *A. vesiculosa*(Savi)Roskov (*T. vesiculosum* Savi) - А.(К.) пузырчатая = КЕ,Ст,  
ЛН,СК(Субсредиз\*.); ST(T); [R.]
1113. *A. fragifera*(L.)Roskov (*T. fragiferum* L.) - А.(К.) земляничная = КЕ,Прик,ТБ,  
НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.); Aa(НК); [R.] <Pp>

1114. *A. bonanii*(C.Presl)Roskov (*T. bonnani* C.Presl; *T. neglectum* C.A.Mey.) - А.(К.) Бонанна = Все р-ны(Общедр.средиз.); Аа(НК); [Sp.] <Pp>
1115. *A. tumens*(Stev.ex Bieb.)Roskov (*T. tumens* Stev.ex Bieb.) - А.(К.) вздутая = Ст, СК(Субкавк\*.); Ра(НК); [R.] <Rg>
1116. *Chrisaspis spadicea*(L.)Greene (*Trifolium spadiceum* L.) - Хризаспис (Клевер) тёмно-каштановый = П,Кисл(Европ.); Pb,Рс(Т); [Pl.]
1117. *Ch. aurea*(Poll.)Greene (*T. aureum* Poll.; *T. strepens* Crantz) - Х.(К.) золотисто-жёлтый = Ст,П,Кисл(Евро-Сиб.); Ра(Т); [Sp.]
1118. *Ch. campestris*(Schreb.)Desv. (*T. campestre* Schreb.) - Х.(К.) полевой = Все р-ны (Палеаркт.); Ра(Т); [Pl.]
1119. *Trifolium caucasicum* Tausch - Клевер кавказский = Ст,ЛН,П,Кисл(Субкавк\*.); S,Pb(НК); [Sp.]
1120. *T. echinatum* Bieb. - К. иглистый = Ст,ЛН,П,Кисл(Средиземн.); Db(Т); [R.]
1121. ★ *T. angustifolium* L. - К. узколистный = П(Машук)[Танфильев, Кононов, 1987](Средиземн.); Ра(Т); [Rs.] <Rg>
1122. *T. phleoides* Pourr. - К. батлачковый = П,Кисл(Средиземн.); Pb(Т); [R.]
1123. *T. striatum* L. - К. ребристый = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Субсредиз\*.); Ра(Т); [R.]
1124. *T. medium* L. - К. средний = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.); Ра,Pb(НК); [Sp.] <Pm;Pp>
1125. *T. alpestre* L. - К. предальпийский = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Евро-Кавк.); Ра,Pb(НК); [Pl.] <Pp>
1126. *T. pratense* L. - К. луговой = Все р-ны(Палеаркт.); Ра(НК); [Pl.] <Pp;Pm>
1127. *T. diffusum* Ehrh. - К. раскидистый = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Европ.); Ра(Т); [Sp.]
1128. *T. apertum* Bobr. - К. открытый = КЕ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Кавк.); Db(Т); [Sp.]  
I.c. Майкоп
1129. *T. arvense* L. - К. пашенный = Все р-ны(Палеаркт.); Ра,ST(Т); [Sp.]
1130. *Anthyllis macrocephala* Wend. (*A. polyphylla*(DC.)Kit.ex Loud.)- Язвенник крупноголовый = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Европ.); ST(НК); [Pl.] <Pm>
1131. *A. lachnophora* Juz.(*A. boissieri*(Sagor.)Grossh.) - Я. шерстеносный = Ст,П, Кисл[Гроссгейм, 1952](Кавк.); ST(НК); [Pl.]
1132. *Lotus angustissimus* L. - Лядвенец узкий = КН(Ачикулак)(Субсредиз\*.); Db(Т); [R.] <Rx>
1133. *L. corniculatus* L. - Л. рогатый = КЕ,Прик,ТБ,НК,М,Ст,СК (Палеаркт.);ST(НК); [Sp.] <Pm;Pp>
1134. *L. tenuis* Waldst.et Kit. - Л. тонкий = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,Ст,П (Субсредиз\*.); Аа(НК); [Sp.] <Pm;Pp>
1135. *L. caucasicus* Kuprian.ex Juz. - Л. кавказский = Все р-ны(Кавк.); Ра(НК); [Pl.] <Pp>

1136. *Galega officinalis* L. - Козлятник лекарственный = КЕ, Прик, ТБ, НК, Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Субсредиз\*.); Аа(НК); [Sp.] <Pm>
1137. *G. orientalis* Lam. - К. восточный = Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Кавк.); S(НК); [Pl.] <Pp>
1138. ★ ★ *Eremosparton aphyllum*(Pall.)Fisch.et C.A.Mey. - Эремоспартон безлистный = М, КН(Туранск.); Db(Ch); [Rs.] <Rx>
1139. *Caragana frutex*(L.)C.Koch - Карагана кустарник = Кисл(Кисловодск) (Понт.-Южносиб.); ST(Ch); [Rs.] <Rx;Pmel;Po>
1140. ★ *C. mollis*(Vieb.)Bess. - К. мягкая = Прик, ТБ, Ст, СК, П(Понтич.); ST(Ch); [Sp.] <Rx;Pmel;Po>
1141. ★ *C. grandiflora*(Vieb.)DC. - К. крупноцветковая = Кисл(Туран.)[авт.]; Da(Ch); [R.] <Rx>
1142. *C. arborescens* Lam. - К. древовидная = Все р-ны(Адвент.[Сибирь, Средняя Азия]; S, ST(Phm); <Po>
1143. ★ ★ *Calophaca wolgarica*(L.fil.)DC. - Майкараган волжский = [КЕ: Немирова, Данилевич, 1991], Ст(Понтич.); ST(Ch); [Rs.] <Rx>
1144. ★ *Astracantha aurea*(Willd.)Podlech (*Astragalus aureus* Willd.) - Астраканта золотистая = П[г.Бештау: Галушко, 1989](Субкавк\*.); Da(Ch:fl); [Rs.] <Rx>
1145. ★ *Astragalus contortuplicatus* L. - Астрагал свёрнутый = МД, НК, Кисл, КН (Понтич.); Аа(Т); [R.]
1146. ★ *A. striatellus* Pall.ex Vieb. - А. полосатый = МД(Большая Джалга)(Ирано-Туран.); Dd(Т); [Rs.]
1147. *A. ucrainicus* M.Pop.et Клок. - А. украинский = КЕ(с.Подлужное)[Дубовик, Дзыбов, 1990](Понтич.); ST(НК); [Rs.] <Rx>
1148. *A. cicer* L. - А. нутовый = Все р-ны(Европ.); Аа(НК); [Pl.] <Pp>
1149. *A. danicus* Retz. - А. датский = П, Кисл(Евро-Сиб.); Pb(НК); [Sp.]
1150. ★ *A. albicaulis* DC. - А. белостебельный = Прик(г.Брык)(Понтич.); Db(Ch); [Rs.] <Rx>
1151. *A. brachytropis*(Stev.)C.A.Mey. - А. коротколодочковый = П(Эукавк.); Pс(НК); [Rs.] <Rg>
1152. *A. glycyphyllos* L. - А. сладколистный = Все р-ны(Европ.); S(НК); [Pl.] <Pm;Pp>
1153. *A. glycyphylloides* DC. - А. ложносладолистный = П(Субкавк\*.); S(НК); [R.] <Pp>
1154. ★ *A. galegiformis* L. - А. козлятниковый = Ст, П, Кисл(Кавк.); Pa, ST(НК); [Sp.]
1155. ★ *A. dasyanthus* Pall. - А. шерстистоцветковый = СК, П(Кума)(Понтич.); ST(НК); [Rs.] <Rx;Pm>
1156. ★ *A. longipetalus* Chater (*A. longiflorus* Pall. nom. illegit. superfl.) - А. длинноцветковый = М, [Ст: Сытин, 1991], П, КН(Туранск.); Db(Ch); [Sp.]

1157. ★ *A. ponticus* Pall. - А. понтийский = КЕ(Субсредиз\*.); ST(НК); [Rs.] <Rx>
1158. ★ *A. lehmannianus* Bunge - А. Леманна = М[Белоус, 1990], КН(Туранск.); Db(Ch); [Rs.] <Rx>
1159. *A. falcatus* Lam. - А. серповидный = Ст, ЛН, П, Кисл(Евро-Кавк.); Pb(НК); [Sp.] <Pp>
1160. *A. asper* Jacq. - А. шершавый = КЕ, Прик, ТБ, Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Понтич.); ST(НК); [R.]
1161. *A. austriacus* Jacq. - А. австрийский = КЕ, Прик, ТБ, НК, Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Sp.]
1162. ★ *A. cartiosus* Boriss. (*A. interpositus* Boriss.) - А. обманчивый = Ст, СК, П, Кисл(Эукавк.); ST(НК); [Sp.]
1163. ★ *A. onobrychioides* Vieb. - А. эспарцетовидный = П[Г.Юца: Сытин, 1986](Кавк.); Da(НК); [Rs.]
1164. ★ *A. bungeanus* Boiss. - А. Бунге = Ст, СК, П, Кисл(Субкавк\*.); ST(НК); [Sp.] <Pp> l.c. Пятигорск
1165. *A. onobrychis* L. - А. эспарцетный = Все р-ны(Европ.); ST, Db(НК); [Pl.] <Pp>
1166. ★ *A. lasioglottis* Stev. ex Vieb. - А. волосистый = СК, П, Кисл(Предкавк.); Pa, Da(НК); [Sp.] l.c. Кисловодск <Esub>
1167. *A. reduncus* Pall. - А. изогнутый = СК, П, Кисл(Понтич.); ST(НК); [R.]
1168. ★ *A. lasiophyllus* Ledeb. - А. мохнатолистный = МД(Манычское, Белые Копани, Арзгир) [Белоус, 1997] (Туранск.); ST, Dd(НК); [Rs.] <Rx>
1169. *A. dolichophyllus* Pall. - А. длиннолистный = КЕ, МД, АИ, НК, Прик, ТБ, Ст, СК(Понтич.); ST(НК); [Sp.]
1170. *A. testiculatus* Pall. - А. яичкоплодный = МД, НК(Субтуран\*.); SD(НК); [R.] <Rx>
1171. *A. demetrii* Charadze - А. Дмитрия = КЕ, Прик, ТБ, Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Предкавк.); Da(НК); [Sp.] <Esub> l.c. Кисловодск
1172. ★ *A. brachycarpus* Vieb. - А. короткоплодный = П, Кисл(Субкавк\*.); ST(НК); [R.] l.c. Бештау
1173. ★ *A. brachylobus* Fisch. - А. коротколопастный = М, КН(Понт.-Южносиб.); Db(Phn); [Sp.] <Rx>
1174. *A. varius* S.G.Gmel. (*A. virgatus* Pall.) - А. разнообразный = М, СК, П, КН(Понт.-Южносиб.); Db(Ch); [R.] <Rx>
1175. ★ *A. cornutus* Pall. - А. рогоплодный = М, КН(Терские пески)(Субтуран\*.); ST, SD(Ch); [R.] <Rx>
1176. *A. subuliformis* DC. (*A. subulatus* Pall.) - А. шилоподобный = СК, П, Кисл(Понт.-Южносиб.); Da(НК); [R.]
1177. ★ *A. pseudotataricus* Boriss. - А. ложнотатарский = Прик, ТБ, Ст, СК(Понтич.); ST, Db(НК); [R.] <Rx> l.c. Ставрополь

1178. ★ *A. haesitabundus* Lipsky - Ф. ненадёжный = Кисл(Эукавк.); Da(НК); [Rs.] <Rx>
1179. ★ ★ *A. karakugensis* Bunge - А. каракугинский = М,КН[Белоус, 1990] (Туранск.); Db(Ch:sf); [Rs.] <Rx>
1180. ★ *A. calycinus* Bieb. - А. чашечный = МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,СК (Кавк.); ST(НК); [R.] l.c. Маджар на Куме
1181. ★ *A. henningii*(Stev.)Klok. - А. Хеннига = МД[Дубовик, Дзыбов, 1990] (Понтич.); ST(НК); [Rs.]
1182. *Oxytropis owerinii* Bunge - Остролодочник Оверина = ЛН,П,Кисл (Эукавк.); Pс(НК); [Pl.]
1183. *O. pilosa*(L.)DC. - О. волосистый = Все р-ны(Евро-Сиб.); ST(НК); [Pl.]
1184. *O. cyanea* Bieb. - О. синий = Кисл(Кавк.); Da(НК); [Pl.]
1185. *Glycyrrhiza glabra* L. - Солодка голая = Все р-ны(Общедр.средиз.); ST(НК); [Pl.] <Pm;Pp>
1186. *G. aspera* Pall. - С. шершавая = Ст,СК,П(Туранск.); ST,SD(НК); [R.]
1187. *G. echinata* L. - С. щетинистая = Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК(Зап.др.средиз.); Аа(НК); [Sp.]
1188. *G. foetidissima* Tausch (*G. macedonica* Boiss.et Orph.) - С. зловонная = М,КН(Зап.др.средиз.); Аа(НК); [Sp.]
1189. *Coronilla coronata* L. - Вязель корончатый = П,Кисл(Евро-Кавк.); ST,Da(НК); [Sp.]
1190. *Securigera varia*(L.)Lassen (*Coronilla varia* L.) - Секуригера (Вязель) пёстрая = Все р-ны(Евро-Кавк.); Pa(НК); [Pl.] <Pm>
1191. *Hedysarum sericeum* Bieb. - Копеечник шелковистый = Кисл(Эукавк.); Da(НК); [Rs.] <Rx>
1192. ★ *H. biebersteinii* Zertova (*H. argenteum* Bieb.) - К. Биберштейна = Ст,СК, П,Кисл(Предкавк.); Da(НК); [Sp.] <Esub>
1193. ★ *H. tauricum* Pall.ex Willd. - К. крымский = П(г.Кинжал)(Кр.-Новоросс.); Da(НК); [Rs.] <Rx>
1194. *Xanthobrychis vassilczenkoi* (Grossh.)Galushko (*Onobrychis vassilczenkoi* Grossh.) - Ксантобрихис Васильченко = Ст,СК,П,Кисл(Предкавк.); Da(НК); [Pl.] <Esub> l.c. Пятигорск
1195. ★ *X. majorovii*(Gross.)Galushko (*O. majorovii* Grossh.) - К. Майорова = НК(Зеленокумск)[гербарий БИН, сборы Новопокровского 1906 года] (Предкавк.); Db,ST(НК); [Rs.] <Rx>
1196. *Onobrychis petraea*(Bieb.ex Willd.)Fisch. - Эспарцет каменный = П,Кисл (Кавк.); Da(НК); [Sp.] <Pmel>
1197. *O. ruprechtii* Grossh. - Э. Рупрехта = П(Кавк.); Pс(НК); [Sp.] <Pp;Pmel>
1198. *O. biebersteinii* Sirj. - Э. Биберштейна = Кисл(Кавк.); Pс(НК); [Sp.]

1199. ★*O. hamata* Vass. - Э. крючковатый = Кисл(Эукавк.); Рс(НК); [R.] <Esub>  
 l.c. Кисловодск
1200. *O. cugi* Grossh. - Э. куринский = Все р-ны(Кавк.); ST(НК); [Pl.] <Pp;Pmel>
1201. *O. dielsii*(Sirj.)Vass. - Э. Дильса = Ст,СК(Предкавк.); ST(НК); [R.] <Pp;Pmel>  
 <Esub> l.c. Беслан
1202. *O. novopokrovskii* Vass. - Э. Новопокровского = М,КН(Предкавк.);  
 Db,Dd(НК); [Sp.] <Pmel> <Esub>
1203. *O. inermis* Stev. - Э. невооружённый = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл  
 (Предкавк.); Ра(НК); [Sp.] <Esub> l.c. Пятигорск
1204. *O. tanaitica* Spreng. - Э. донской = МД,АИ,НК,Прик,ТБ,(Субтуран\*.);  
 ST(НК); [R.] <Pmel>
1205. *Alchagi pseudoalchagi*(Bieb.)Fisch. - Верблюжья колючка обыкновенная =  
 МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,СК(Ирано-Туран.); SD(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>
1206. *Vicia serium* L. - Горошек заборный = Все р-ны(Евро-Сиб.); Ра(НК); [Pl.]  
 <Pmel;Pp>
1207. *V. abbreviata* Fisch.ex Spreng. (*V. truncatula* Fisch.ex Bieb.) - Г. обрубленный  
 = П,Кисл(Субкавк\*.); Pb(НК); [Sp.]
1208. *V. ciliatula* Lipsky - Г. реснитчатый = КЕ,ЛН,П,Кисл(Кавк.); S(T); [Sp.] l.c.  
 Армавир
1209. *V. rannonica* Crantz - Г. венгерский = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл  
 (Зап.др.средиз.); Ра,Rb(T); [Sp.] <Pmel;Pp>
1210. *V. hybrida* L. - Г. гибридный = Ст,ЛН(Субсредиз\*.); Ра,Rb(T); [Rs.]
1211. *V. lutea* L. - Г. жёлтый = Ст(Ставрополь)[Колмаков, 1928](Субсредиз\*.);  
 S(T); [R.] <Rg>
1212. *V. grandiflora* Scop. - Г. крупноцветковый = Все р-ны(Субсредиз\*.); Ра(T);  
 [Sp.] <Pmel>
1213. *V. sativa* L. - Г. посевной = Все р-ны(Европ.); Ра,Rb(T); [Sp.] <Pmel;Pp>
1214. *V. angustifolia* Reichard - Г. узколистный = Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Палеаркт.);  
 Ра,Rb(T); [Pl.] <Pmel;Pp>
1215. *V. cassubica* L. - Г. кашубский = П,Кисл(Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]
1216. *V. pisiformis* L. - Г. гороховидный = П(Железноводск)(Европ.); S,Ра(НК);  
 [Rs.] <Rg>
1217. *V. cracca* L. - Г. мышинный = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,ЛН,П  
 (Палеаркт.); Ра(НК); [Pl.] <Pm;Pmel;Pp>
1218. *V. tenuifolia* Roth - Г. тонколистный = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,  
 Кисл(Палеаркт.); Ра(НК); [R.] <Pmel;Pp>
1219. *V. biennis* L. (*V. picta* Fisch.et C.A.Mey.) - Г. разукрашенный = НК,КН  
 (Понт.-Южносиб.); Аа(НК); [R.]
1220. *V. cinerea* Bieb. - Г. пепельный = М,КН(Туранск.); Ра,Rb(T); [R.]

1221. *V. varia* Host (*V. dasycarpa* Ten.) - Г. шерстистоплодный = Все р-ны (Евро-Кавк.); Pa,Ra(T); [Pl.]
1222. *V. villosa* Roth - Г. мохнатый = М,СК,КН(Палеаркт.); Da,Ra(T); [R.] <Pp>
1223. *V. hirsuta*(L.)S.F.Gray - Г. волосистый = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.); Pa,Ra(T); [Sp.]
1224. *V. tetrasperma*(L.)Schreb. - Г. четырёхсеменной = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Sp.]
1225. *Lathyrus aphaca* L. - Чина безлисточковая = Все р-ны(Общедр.средиз.); Pa(T); [Sp.] <Pmel;Pp>
1226. *L. nissolia* L. - Ч. Ниссоля = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Субсредиз\*.); Pa(T); [Sp.]
1227. *L. hirsutus* L. - Ч. шершавая = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Rb(T); [Sp.] <Pmel;Pp>
1228. *L. tuberosus* L. - Ч. клубненоносная = Все р-ны(Палеаркт.); Ra,Rb(НК:lh); [Pl.] <Pmel;Pp>
1229. *L. sylvestris* L. - Ч. лесная = КЕ,Прик,ТБ,НК, Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Европ.); S(НК:lh); [Sp.] <Pm;Pmel;Pp>
1230. *L. miniatus* Vieb.ex Stev. - Ч. киноваревая = Ст,ЛН,П,Кисл(Кавк.); S(НК:lh); [Sp.] l.c. Бештау <Pmel;Pp>
1231. *L. sphaericus* Retz - Ч. шаровидная = Кисл(Общедр.средиз.); Pa,Ra(T); [R.] <Pmel;Pp>
1232. *L. pratensis* L. - Ч. луговая = Все р-ны(Палеаркт.); Pa(НК:lh); [Pl.] <Pm;Pmel;Pp>
1233. *L. pisiformis* L. - Ч. гороховидная = П(Палеаркт.); S(НК); [R.] <Pp>
1234. *L. palustris* L. - Ч. болотная = КЕ,Ст(Палеаркт.); Aa(НК); [R.] <Pmel;Pp>
1235. *L. incurvus*(Roth)Roth - Ч. согнутая = Все р-ны(Субтуран\*.); Aa(НК); [Sp.] <Pmel;Pp>
1236. ★*Orobis pannonicus* Jacq. (*Lathyrus pannonicus*(Jacq.)Garcke) - Сочевичник венгерский = Ст(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Rs.] <Rx>
1237. *O. pallescens* Vieb. (*L. pallescens*(Vieb.)C.Koch) - С. бледнеющий = Ст,ЛН,СК,П(Понтич.); ST(НК); [R.]
1238. *O. cyaneus* Stev. (*L. cyaneus*(Stev.)C.Koch) - С. синий = Кисл(Зап.др.средиз.); Pb(НК); [Sp.]
1239. *Pisum elatius* Vieb. - Горох высокий = ЛН,П(Зап.др.средиз.); S(T); [R.]

#### Сем. 86. GERANIACEAE Juss. - ГЕРАНИЕВЫЕ

1240. *Geranium tuberosum* L. - Герань клубневая = КЕ,Прик,ТБ,НК,М,Ст,СК,П(Субсредиз\*.); ST(НК); [Sp.]
1241. ★*G. linearilobum* DC. - Г. линейнолопастная = МД[авт.](Понтич.); ST(НК); [R.]



1242. *G. sanguineum* L. - Г. кроваво-красная = КЕ, Прик, ТБ, НК, М, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Евро-Кавк.); Ра (НК); [Pl.] <Pm>
1243. *G. sylvaticum* L. - Г. лесная = П, Кисл (Евро-Сиб.); S (НК); [Pl.]
1244. *G. palustre* L. - Г. болотная = П, Кисл (Европ.); Аа (НК); [Sp.]
1245. *G. collinum* Steph. - Г. холмовая = КЕ, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Субтуран\*.); Ра (НК); [Sp.]
1246. *G. depilatum* (Somm. et Levier) Grossh. - Г. безволосая = Ст, П, Кисл (Субкавказ\*.); Ра, Rb (НК); [Sp.]
1247. *G. sibiricum* L. - Г. сибирская = ЛН, П, Кисл (Панбор.); Ра (НК); [Sp.]
1248. *G. rotundifolium* L. - Г. круглолистная = П (Палеаркт.); Ра, Rb (Т); [R.]
1249. *G. pusillum* L. - Г. маленькая = Все р-ны (Евро-Кавк.); Ра, Rb (Т); [Pl.]
1250. *G. columbinum* L. - Г. голубиная = Все р-ны (Европ.); Ра, Rb (Т); [Pl.]
1251. *G. dissectum* L. - Г. рассечённая = Ст, П, Кисл (Субсредиз\*.); Ра, Rb (НК); [R.]
1252. *G. divaricatum* Ehrh. - Г. раскидистая = Все р-ны (Общедр. средиз.); S, Rb (Т); [Pl.]
1253. *G. bohemicum* L. - Г. богемская = Ст [Ставрополь: Танфильев, Кононов, 1987] (Европ.); S (Т); [R.] <Rg>
1254. *G. robertianum* L. - Г. Роберта = КЕ, Прик, ТБ, НК, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Палеаркт.); S (Т); [Pl.] <Pm>
1255. *G. lucidum* L. - Г. блестящая = П (Субсредиз\*.); S, Аа (Т); [Sp.]
1256. *Erodium malacoides* (L.) L'Her. - Журавельник (Аистник) мальвовидный = КН (Средиземн.); Db (Т); [Sp.]
1257. *E. hoefftianum* С.А.Меу. - Ж. Гёффта = М, КН (Субтуран\*.); Db (Т); [Sp.] l.c. Кизляр
1258. *E. ciconium* (L.) L'Her. - Ж. аистовый = Все р-ны (Субсредиз\*.); S, Rb (Т); [Sp.]
1259. ★ ★ *E. stevenii* Vieb. - Ж. Стевена = Прик, Ст (Предкавказ.); Db (НК); [Rs.] <Esub> l.c. Бешпагир
1260. *E. cicutarium* (L.) L'Her. - Ж. цикутовый = Все р-ны (Палеаркт.); Db (Т); [Sp.] <Pm; Pp>

#### Сем. 87. OXALIDACEAE R.Br. - КИСЛИЧНЫЕ

1261. *Oxalis acetosella* L. Кислица обыкновенная = Кисл (Голаркт.); S (НК); [Sp.] <Pa>
1262. *Xanthoxalis corniculata* (L.) Small (*Oxalis corniculata* L.) - Ксантоксалис рожковый = Ст (Общедр. средиз.); Rb (Т); [R.]
1263. *X. stricta* (L.) Small (*O. stricta* L.) - К. торчащий = Ст, П (Адвент. [Сев. Америка]); Rb (Т); [R.]

#### Сем. 88. LINACEAE S.F.Gray - ЛЬНОВЫЕ

1264. *Linum catharticum* L. - Лён слабительный = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Европ.); S,Pa(T); [Sp.]
1265. *L. austriacum* L. (*L. squamulosum Rudolphi*) - Л. австрийский = Все р-ны (Зап.др.средиз.); ST(НК); [Pl.]
1266. *L. bienne* Mill. (*L. angustifolium Huds.*) - Л. двулетний = Кисл (Общедр.средиз.); Pb(НК); [Sp.]
1267. *L. hypericifolium* Salisb. - Л. зверобоелистный = П,Кисл(Субкавказ\*.); Pb(НК); [Sp.] <Po>
1268. *L. tenuifolium* L. - Л. тонколистный = Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Общедр.средиз.); ST,Da(НК); [Sp.]
1269. *L. nervosum* Waldst.et Kit. - Л. жилковатый = Все р-ны(Понт.-Южносиб.); Pa(НК); [Pl.]
1270. *L. nodiflorum* L. (*L. luteolum Bieb.*) - Л. желтоватый = Ст,ЛН,СК,П (Субкавказ\*.); ST(T); [Sp.]
1271. ★ *L. tauricum* Willd. - Л. крымский = Ст,СК,П,Кисл(Понтич.); Da(НК); [Sp.] <Po;Rx>
1272. *L. alexeenkoanum* E.Wulf (*L. orientale auct.*) - Л. Алексеенко = Ст,СК, П,Кисл(Субкавказ\*.); Da(НК); [Sp.] <Po>

Сем. 89. PEGANACEAE (Engl.) Tiegh. - ГАРМАЛОВЫЕ

1273. *Peganum harmala* L. - Гармала обыкновенная = МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М, Ст,КН(Общедр.средиз.); SD(НК); [R.] <Pt;Pm>

Сем. 90. TETRADICLIDIACEAE (Engl.) Takht. - ТЕТРАДИКЛИДИЕВЫЕ

1274. ★ *Tetradiclis tenella* (Ehrenb.) Litv. - Тетрадиклис тонкий = Прик(р.Грачёвка), НК(Туранск.); Dc(T); [R.] l.c. р. Кума у Горькой <Rx>

Сем. 91. ZYGOPHYLLACEAE R.Br. - ПАРНОЛИСТНИКОВЫЕ

1275. *Zygophyllum fabago* L. - Парнолистник обыкновенный = Прик,ТБ,СК,П (Общедр.средиз.); ST(НК); [Sp.] <Pt;Pm>
1276. *Tribulus terrestris* L. - Якорцы стелющиеся = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М (Общедр.средиз.); Da,Rb(T); [Pl.] <Pm>

Сем. 92. NITRARIACEAE Bercht.et J.Presl - СЕЛИТРЯНКОВЫЕ

1277. *Nitraria schoberi* L. (*N. caspia Willd.*) - Селитрянка Шобера = НК(Ирано-Туран.); Dc(Ch); [R.] <Rx>

Сем. 93. RUTACEAE Juss. - РУТОВЫЕ

1278. ★ *Naplophyllum villosum* (Bieb.) G.Don fil. - Цельнолистник мягковолосистый = МД[Немирова, Данилевич, 1995](Армено-Иран.); ST,SD(НК); [R.] <Rx>

1279. ★ *H. ciscaucasicum* (Rupr.) Grossh. et Vved. - Ц. предкавказский = П [Галушко, 1980] (Предкавк.); Da (НК); [Rs.] <Esub> l.c. Джегута
1280. ★ *Dictamnus gymnostylis* Stev. - Ясенец голостолбиковый = П, Кисл (Эвксин.); S, Pb (НК); [R.] <Pt; Pm; Pmel>
1281. *D. caucasicus* (Fisch. et C. A. Mey.) Grossh. - Я. кавказский = Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Субкавк\*.); Pa (НК); [Pl.] l.c. Бештау <Pt; Pm; Pmel>

#### Сем. 94 POLYGALACEAE R.Br. - ИСТОДОВЫЕ

1282. ★ *Polygala sosnowskyi* Kem.-Nath. - Истод Сосновского = Кисл (Эукавк.); Db (НК); [R.] <Esub> <Pm> l.c. Кисловодск
1283. *P. mariamae* Tamamsh. - И. Мариам = Прик [Бешпагир: Танфильев, Кононов, 1987] (Кавк.); ST (НК); [Rs.] <Pmel; Rx>
1284. *P. comosa* Schkuhr - И. хохлатый = Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Европ.); Pa (НК); [Sp.] <Pmel>
1285. *P. amoenissima* Tamamsch. - И. прелестнейший = [Ст: Танфильев, Кононов, 1987], П, Кисл (Средиземн.); Pa (НК); [Sp.] <Pmel>
1286. *P. alpicola* Rupr. - И. альпийский = Кисл (Кавк.); Pb (НК); [Sp.]
1287. *P. anatolica* Boiss. et Heldr. - И. анатолийский = Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Субкавк\*.); Pa (НК); [Pl.] <Pm; Pmel>
1288. *P. caucasica* Rupr. - И. кавказский = Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Кавк.); Pa (НК); [Pl.] <Pmel>

#### Сем. 95. SIMAROUBIACEAE DC. - СИМАРУБОВЫЕ

1289. *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle - Айлант высочайший = Все р-ны (Адвент. [Китай]); S, ST (Phms); [Sp.] <Po>

#### Сем. 96. EUPHORBIACEAE Juss. - МОЛОЧАЙНЫЕ

1290. *Mercurialis perennis* L. - Пролесник многолетний = НК [Кума, пос. Красный Октябрь, авт.] (Европ.); Rb (НК); [R.]
1291. *Euphorbia dentata* Michx. (*Tithymalus dentatus* (Michx.) Gaertn.) - Молочай зубчатый = KE [Танфильев, Кононов, 1987], М, П (Адвент.); Rb (Т); [Sp.]
1292. *E. helioscopia* L. (*T. helioscopius* (L.) Scop.) - М. солнечный = Все р-ны (Палеаркт.); Rb (Т); [Pl.] <Pt>
1293. *E. rhabdotosperma* A. Radcliffe-Smith (*T. rhabdotospermus*) - М. рабдотоспермум = М (Терек) [Гельтман, 1991] (Кавк.); Da, Rb (Т); [R.]
1294. ★ *E. glareosa* Pall. ex Vieb. (*T. glareosus* (Pall. ex Vieb.) Prokh.) - М. хрящеватый = KE, Ст (Кавк.); Da, Dd (НК); [Sp.] <Rx; Pt>
1295. *E. procera* Vieb. (*T. procerus* (Vieb.) Galushko) - М. мохнатый = ЛН, П, Кисл (Понтич.); Aa (НК); [Sp.] <Pt>

1296. ★ ★ *E. aristata* Schmalh. (*T. aristatus*(Schmalh.)Prokh.) - М. остистый = Прик, Ст(Предкавказ.); ST(НК); [R.] <Es> <Pt> I.c. Ставрополь (рис. 7)
1297. *E. seguieriana* Neck. (*T. seguierianus*(Neck.)Prokh.) - М. Сегиеров = Все р-ны(Субтуран\*.); ST,SD(НК); [pl.] <Pt>
1298. *E. stepposa* Zoz (*T. stepposus*(Zoz)Prokh.) - М. степной = КЕ,Ст,ЛН,СК,П, Кисл(Понт.-Южносиб.); ST,Da(НК); [Sp.] <Pt>
1299. *E. stricta* L. (*E. micrantha* Steph., *T. micranthus*(Steph.)Sojak) - М. мелкоцветковый = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Евро-Кавк.); S(T); [Sp.]
1300. *E. condilocarpa* Vieb. (*T. condylocarpus*(Vieb.)Klotzch et Garcke ex Klotzch) - М. членистоплодный = ЛН,СК,П,Кисл(Субкавказ\*.); ST(НК); [Sp.] <Pt> I.c. Кисловодск
1301. *E. squamosa* Willd. (*T. squamosus*(Willd.)Klotzch et Garcke ex Klotzch) - М. чешуйчатый = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Кавк.); S(НК); [Pl.] <Pt>
1302. *E. falcata* L. (*E. acuminata* Lam., *T. falcatus*(L.)Klotzch et Garcke) - М. серповидный = Все р-ны(Общедр.средиз.); Dd,Ra,Rb(T); [Sp.] <Pt>
1303. ★ *E. normannii* Schmalh.ex Lipsky (*T. normannii*(Schmalh.ex Lipsky)Prokh.) - М. Норманна = Ст,ЛН(Предкавказ.); ST,Rb(T); [Rs.]<Es;Pt> I.c. Невинномысск (рис.8)
1304. ★ *E. szovitsii* Fisch.et C.A.Mey. (*T. szovitsii*(Fisch.et C.A.Mey.) Klotzch et Garcke ex Klotzch) - М. Шовица = Прик[Галушко, 1989](Субкавказ\*.); Da,Db(T); [Rs.] <Rx>
1305. ★ *E. petrophila* C.A.Mey. (*T. petrophilus*(C.A.Mey.)Sojak) - М. скалолюбивый = Ст,ЛН,П,Кисл(Кр.-Новоросс.); Da(НК); [Sp.] <Pt>
1306. *E. amygdaloides* L. (*T. amygdaloides*(L.)Gars.) - М. миндалевидный = П (Общедр.средиз.); S(НК); [R.] <Pt>
1307. ★ *E. praecox*(Fisch.ex Boiss.)B.Fedtsch.et Fler. (*E. astrachanica* C.A.Mey.ex Prokh., *T. astrachanicus* (C.A.Mey.)Prokh.) - М. ранний = МД,АИ,НК,Ст,СК (Туранск.); ST(НК); [R.] <Rx;Pt>
1308. ★ *E. tanaitica* Pacz. (*T. tanaiticus*(Pacz.)Galushko; *Euphorbia sareptana* Beck.) - М. донской = Ст(Понтич.); ST(НК); [Rs.] <Rx;Pt>
1309. *E. boissieriana* Woronow (*E. virgata* Waldst.et Kit.; *T. boissierianus* (Woronow)Prokh.) - М. Буасье = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М, Ст,ЛН,СК, П,Кисл(Армено-Иран.); ST(НК); [Sp.] <Pt>
1310. *E. iberica* Boiss. (*T. ibericus*(Boiss.)Prokh.) - М. грузинский = Все р-ны (Субкавказ\*.); ST,Rb(НК); [Pl.] <Pt>
1311. *E. undulata* Vieb. (*T. undulatus*(Vieb.)Klotzch et Garcke ex Klotzch) - М. волнистый = МД,АИ,НК,КН(Туранск.); ST(НК); [R.] <Rx> <Pt>
1312. *E. leptocaula* Boiss.(*T. leptocaulis*(Boiss.)Prokh.) - М. тонкостебельный = КЕ,Прик,ТБ,Ст,СК,КН(Понтич.); ST(НК); [R.] <Pt>

1313. *E. esula* L. (*T. esulus*(L.)*Gaertn.*) - М. острый = Ст,П(Палеаркт.); Ра(НК); [R.] <Pt>
1314. *Chamaesyce humifusa*(Schlecht.)*Prokh.* (*Euphorbia humifusa* *Schlecht.*) - Хамезице приземистый = Прик,Ст,СК(Адвент.[Япония,Китай]); Rb(Т); [Sp.] <Pt>
1315. *Ch. vulgaris* *Prokh.* (*E. chamaesyce* L.) - Х. обыкновенный = П,КН (Субсредиз\*.); Ra,Rb(Т); [R.] <Pt>

Сем. 97. CALLITRICHACEAE Link - БОЛОТНИКОВЫЕ

1316. *Callitriche palustris* L. (*C. verna* L.)- Водяная звездочка болотная = Ст,Кисл (Плюрирег.); Ac(К); [Sp.]

Сем. 98. ANACARDIACEAE Lindl. - СУМАХОВЫЕ

1317. *Cotinus coggygria* Scop. - Скумпия кожевенная = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН, СК,П,Кисл(Общедр.средиз.);Da(Phn); [Sp.] <Rt;Pm>
1318. ★ *Rhus coriaria* L. - Сумах дубильный = П(Машук)(Общедр.средиз.); Db(Phn); [Rs.] <Rx;Pm>

Сем. 99. CELASTRACEAE R.Br. - БЕРЕСКЛЕТОВЫЕ

1319. *Euonymus europaea* L. - Бересклет европейский = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН, СК,П,Кисл(Европ.); S(Phn); [Pl.] <Pm>
1320. *E. verrucosa* Scop. - Б. бородавчатый = Ст,П,Кисл(Европ.); S(Phn); [Sp.]
1321. *E. latifolia*(L.)*Mill.* - Б. широколистный = П(Субсредиз\*.); S(Phn); [R.]
1322. ★ ★ *E. nana* *Vieb.* - Б. карликовый = П(Бештау,Машук)(Понтич.); S,Da(Ch); [Rs.] <Rt;Rg> l.c. Бештау

Сем. 100. ACERACEAE Juss. - КЛЁНОВЫЕ

1323. ★ *Acer laetum* C.A.*Meu.* - Клён светлый = Кисл(Эвксин.); S(Phms); [Sp.] <Rg;Rt;Pmel>
1324. *A. platanoides* L. - К. остролистный = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Европ.); S(Phmg); [Pl.] <Pmel>
1325. *A. campestre* L. - К. полевой = Все р-ны(Евро-Кавк.); S(Phms); [Pl.] <Pmel>
1326. *A. pseudoplatanus* L. - К. ложноплатанолистный (Явор) = Кисл(Европ.); S(Phms); [Sp.]
1327. *A. tataricum* L. - К. татарский = Ст,ЛН,П(Субпонт\*.); S(Phm); [Sp.] <Pmel>
1328. *Negundo aceroides* *Moench* (*Acer negundo* L.) - Негундо клёновидный = Все р-ны(Адвент.[Сев.Америка]; S,ST(Phms); <Po>

Сем. 101. BALSAMINACEAE A.Rich. - БАЛЬЗАМИНОВЫЕ

1329. *Impatiens noli-tangere* L. - Недотрога обыкновенная = КЕ, Прик, ТБ, НК, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Евро-Сиб.); S(T); [Pl.]
1330. *I. glandulifera* Royle – Н. железконосная = Ст, П, Кисл (Адвент. [Индия]); Rb, Aa(T); [R.]

Сем. 102. RHAMNACEAE Juss. - КРУШИНОВЫЕ

1331. *Paliurus spina-christi* Mill. - Держи-дерево христова колючка = П[Гроссгейм, 1962](Общедр.средиз.); ST(Phn); [Rs.] <Pmel;Pm>
1332. *Frangula alnus* Mill. - Крушина ломкая = Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Палеаркт.); S(Phn); [Sp.] <Pm>
1333. *Rhamnus cathartica* L. - Жостер слабительный = Все р-ны (Палеаркт.); S(Phm); [Pl.] <Pm>
1334. *Rh. pallasii* Fisch. et C.A. Mey. - Ж. Палласа = Все р-ны (Ирано-Туран.); Da(Phn); [Pl.]
1335. *Rh. spathulifolia* Fisch. et C.A. Mey. - Ж. лопатчатолистный = МД, АИ, НК, СК (Субкавказ\*.); ST(Phn); [Sp.]

Сем. 103. VITACEAE Juss. - ВИНОГРАДОВЫЕ

1336. ★ *Vitis sylvestris* C.C. Gmel. - Виноград лесной = НК, М, ЛН, Ст, СК, КН (Субсредиз\*.); S(Phn:ll); [Sp.] <Pa>

Сем. 104. TILIACEAE Juss. - ЛИПОВЫЕ

1337. *Tilia platyphyllos* Scop. - Липа широколистная = П (Европ.); S(Phmg); [R.] <Pm;Pmel>
1338. *T. caucasica* Rupr. - Л. кавказская = КЕ, Прик, ТБ, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Кавк.); S(Phmg); [Pl.] <Pm;Pmel>

Сем. 105. MALVACEAE Juss. - МАЛЬВОВЫЕ

1339. *Abutilon theophrasti* Medik. - Канатник Теофраста = Все р-ны (Плюрирег.); Rb(T); [Sp.]
1340. *Malva sylvestris* L. - Просвирник лесной = КЕ, М, Ст, ЛН, СК, П, КН (Палеаркт.); Pa, ST, Rb(T); [Sp.] <Pm;Pmel>
1341. *M. nicaeensis* All. - П. ницкий = М, Ст, СК, П, Кисл (Общедр.средиз.); Rb(T); [R.] <Pmel>
1342. *M. neglecta* Wallr. - П. пренебреженный = Все р-ны (Палеаркт.); Rb(T); [Pl.] <Pa;Pmel>
1343. *M. pusilla* Smith - П. низкий = Все р-ны (Палеаркт.); Rb(T); [Pl.] <Pa;Pmel>
1344. *Lavatera thuringiaca* L. - Хатьма тюрингенская = Все р-ны (Палеаркт.); Pa, ST(НК); [Pl.] <Pm;Po>

1345. *L. punctata* All. - Х. пятнистая = Ст,П[Меницкий, 1997](Туранск.); ST(НК); [Sp.]
1346. *Alcea rugosa* Alef. - Шток-роза морщинистая = Все р-ны(Понтич.); ST,Pa(НК); [Pl.] <Po>
1347. *Althaea hirsuta* L. - Алтей жёстковолосистый = Ке,МД,АИ,НК,Прик,ТБ, М,Ст,СК,П(Субсредиз\*.); ST,Rb(T); [Sp.]
1348. *A. officinalis* L. - А. лекарственный = Все р-ны(Палеаркт.); Аа(НК); [Sp.] <Pm>
1349. *A. armeniaca* Ten. - А. армянский = Ке,Прик,ТБ,М,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Субтуран\*.); Pa,Аа(НК); [Sp.] <Pm>
1350. *A. cannabina* L. - А. коноплевый = Все р-ны(Общедр.средиз.); Pa,ST(НК); [Sp.]
1351. *Hibiscus trionum* L. - Гибискус тройчатый = Ст,ЛН,СК,П(Плюрирег.); Ra,Rb(T); [Sp.]
1352. *Kitaibelia vitifolia* Willd. - Китайбелия виноградолистная = Ст[Белоус, 1999](Средиземн.); Rb(НК); [R.]

Сем. 106. HYPERICACEAE Juss. - ЗВЕРОБОЙНЫЕ

1353. *Hypericum hirsutum* L. - Зверобой жёстковолосистый = Ке,Прик,ТБ, Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.); Pa,ST(НК); [Pl.]
1354. *H. quadrangulum* L. (*H. tetrapterum* Fries; *H. acutum* Moench, nom. illegit.) - З. четырёхкрылый = Ке,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Европ.); Аа(НК); [Sp.]
1355. *H. elegans* Steph. - З. изящный = Все р-ны(Евро-Сиб.); ST(НК); [Sp.]
1356. *H. perforatum* L. - З. пронзённый = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,ST(НК); [Pl.] <Pm>

Сем. 107. ELATINACEAE Dumort. - ПОВОЙНИЧКОВЫЕ

1357. *Elatine alsinastrum* L. - Повойничек мокричный = СК,П(Европ.); Ab(T); [R.]

Сем. 108. FRANKENIACEAE S.F.Gray - ФРАНКЕНИЕВЫЕ

1358. *Frankenia pulverulenta* L. - Франкения порошистая = Ке,МД,АИ,НК,Ст,П (Зап.др.средиз.); Dc(T); [R.]
1359. *F. hirsuta* L. - Ф. жестковолосистая = МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,П (Зап.др.средиз.); Dc(Ch:sf); [R.]

Сем. 109. TAMARICACEAE Link - ГРЕБЕНЩИКОВЫЕ

1360. *Tamarix laxa* Willd. - Гребенщик рыхлый = МД,(Ирано-Туран.); Аа(Phn); [Rs.] <Rg>
1361. *T. gracilis* Willd. - Г. изящный = МД(Субтуран\*.); Аа(Phn); [Rs.] <Rg>

1362. *T. ramosissima* Ledeb. - Г. многоветвистый = Ке,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М, Ст,СК,П,КН(Вост.др.средиз.); Аа,Db(Phn); [Sp.] <Pm>  
 1363. *Muricaria bracteata* Royle (*M. alopecuroides* Schrenk) - Мирикария прицветниковая = Ст,П,Кисл(Общедр.средиз.); Аа(Phn); [Sp.]

Сем. 110. CISTACEAE Juss. - ЛАДАННИКОВЫЕ

1364. *Helianthemum ovatum*(Viv.)Dun. - Солнцецвет яйцевидный = П,Кисл (Европ.); Pb(Ch:sf); [Sp.]  
 1365. *H. nitidum* Clementi - С. блестящий = Кисл(Евро-Сиб.); Pb(Ch:sf); [Sp.]  
 1366. *H. ciscaucasicum* Juz.et Pozd. - С. предкавказский = П,Кисл (Эукавк.)Pb,ST(Ch:sf); [Pl.] <Pmel>  
 1367. *H. buschii*(Palib.)Juz.ex Pozd. - С. Буша = Кисл(Эвксин.); Da(Ch:sf); [Sp.]  
 1368. ★ *Fumana procumbens*(Dun.)Gren.et Godr. - Фумана лежачая = П,Кисл (Средиземн.); Da (Ch:sf); [Rs.] <Rx>

Сем. 111. VIOLACEAE Batsch - ФИАЛКОВЫЕ

1369. *Viola caucasica* Kolenati - Фиалка кавказская = Кисл(Кавк.); Pb,Рс(НК:ephhd); [Pl.]  
 1370. *V. alba* Bess. - Ф. белая = Ке,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Европ.); S(НК:ephhd); [Sp.]  
 1371. *V. odorata* L. - Ф. душистая = Все р-ны(Евро-Кавк.); S(НК:ephhd); [Pl.] <Pm>  
 1372. *V. wiedemannii* Boiss. - Ф. Вейдемманна = П(Бештау)(Субкавк\*.); Рс(НК:ephhd); [Sp.] <Rg>  
 1373. *V. suavis* Vieb. - Ф. приятная = Ке,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Субпонт\*.); S(НК:ephhd); [Sp.]  
 1374. *V. hirta* L. - Ф. коротковолосистая = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Евро-Сиб.); Ра(НК:ephhd); [Pl.]  
 1375. *V. ambigua* Waldst.et Kit. - Ф. сомнительная = Все р-ны(Понтич.); Ра(НК:ephhd); [Pl.]  
 1376. *V. elatior* Fries - Ф. высокая = Ст,П(Палеаркт.); S(НК:ephhd); [R.]  
 1377. *V. pumila* Chaix - Ф. низкая = Ст,СК(Европ.); S(НК:ephhd); [Rs.] <Rg>  
 1378. *V. canina* L. - Ф. собачья = Все р-ны(Евро-Сиб.); S(НК:ephhd); [Pl.] <Pm>  
 1379. *V. rupestris* F.W.Schmidt - Ф. скальная = Кисл(Евро-Сиб.); Pb(НК:ephhd); [R.]  
 1380. *V. reichenbachiana* Jord.ex Boreau (*V. silvestris* Lam.) - Ф. Рейхенбаха = Ке,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Европ.); S(НК:ephhd); [Sp.]  
 1381. *V. mirabilis* L. - Ф. удивительная = П,Кисл(Палеаркт.); S(НК:ephhd); [Sp.]  
 1382. *V. somchetica* C.Koch - Ф. сомжетская = [Ст: Танфильев, Кононов, 1987], П(Кавк.); Рс(НК:ephhd); [Pl.]  
 1383. *V. kitaibeliana* Schult. - Ф. Китайбелева = Все р-ны(Понтич.); ST(T); [Pl.]  
 1384. *V. arvensis* Murr. - Ф. полевая = Все р-ны(Евро-Сиб.); Ра,Rb(T); [Sp.] <Pm>



1385. *V. vespertina* Klok. - Ф. вечерняя = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Эукавк.); Ра(Т); [Pl.]  
I.c. Нальчик.

Сем. 112. THYMELAEACEAE Juss. - ВОЛЧНИКОВЫЕ

1386. *Thymelaea passerina*(L.)Coss.et Germ. - Лигия воробьиная = Все р-ны  
(Общедр.средиз.); ST,Da(Т); [R.]

Сем. 113. ELAEAGNACEAE Juss. - ЛОХОВЫЕ

1387. *Hippophaë rhamnoides* L. - Облепиха крушиновидная = Все р-ны  
(Палеаркт.); Аа(Phn); [Pl.] <Pm;Pa;Pmel>

1388. *Elaeagnus angustifolia* L. - Лох узколистный = Все р-ны(Общедр.средиз.);  
Db(Phn); [Sp.] <Pa;Pm;Pmel>

Сем. 114. LYTHRACEAE J.St.-Hil. - ДЕРБЕННИКОВЫЕ

1389. ★ *Lythrum thesioides* Vieb. - Дербенник ленецевидный = Ст(Понтич.); Аа(Т);  
[Rs.] <Rg> I.c. Ставрополь

1390. *L. virgatum* L. - Д. лозный = Все р-ны(Палеаркт.); Аа(НК); [Sp.] <Pmel>

1391. *L. salicaria* L. - Д. иволистный = Все р-ны(Палеаркт.); Аа(НК); [Pl.]  
<Pm;Pmel>

Сем. 115. ONAGRACEAE Juss. - КИПРЕЙНЫЕ

1392. *Epilobium hirsutum* L. - Кипрей шерстистый = Все р-ны(Палеаркт.);  
Аа(НК); [Pl.]

1393. *E. parviflorum* Schreb. - К. бледноцветковый = Ст,ЛН,СК,П,Кисл  
(Общедр.средиз.); Аа(НК); [Sp.]

1394. *E. montanum* L. - К. горный = Все р-ны(Палеаркт.); Аа(НК); [Pl.]

1395. *E. lanceolatum* Seb.et Mauri - К. ланцетолистный = Кисл (Зап.др.средиз.);  
S,Аа(НК); [R.]

1396. *E. tetragonum* L. (*E. adnatum* Griseb.) - К. четырёхугольный = Ст,ЛН,СК,  
П,Кисл(Палеаркт.); Аа(НК); [R.]

1397. *E. nervosum* Boiss.et Buhse - К. жилковатый = Ст,ЛН,СК,П,Кисл  
(Вост.др.средиз.); Аа(НК); [Sp.]

1398. *E. algidum* Vieb. - К. холодный = П,Кисл(Субкавк\*.); Аа(НК); [Pl.]

1399. *Chamerion angustifolium*(L.)Scop. (*Chamerion angustifolium* (L.) Holub) -  
Иван-чай узколистный - Ст,П,Кисл(Голаркт.); S(НК); [Sp.] <Pa;Pm;Pmel>

1400. *Ch. dodonae*(Vill.)Kost. (*Ch. angustissimum*(Web.)Grossh.) - И.-ч. Додоны =  
П,Кисл(Голаркт.); Аа(НК); [Sp.]

1401. *Oenothera biennis* L. (*Onagra biennis*(L.)Scop.) - Ослиник двулетний = Все  
р-ны (Адвент.[Сев.Америка]); Rb(НК:pb); [Pl.] <Po;Pm>

1402. *Circaea lutetiana* L. - Двулепестник парижский = КЕ, Прик, ТБ, НК, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Евро-Сиб.); S(НК); [Sp.]

Сем. 116. HALORAGACEAE R.Br. - СЛАНОЯГОДНИКОВЫЕ(УРУТЕВЫЕ)

1403. *Myriophyllum verticillatum* L. - Уруть мутовчатая = Все р-ны(Голаркт.); Ас(К); [Sp.]

1404. *M. spicatum* L. - У. колосовая = Все р-ны(Голаркт.); Ас(К); [Sp.]

Сем. 117. HIPPURIDACEAE Link - ХВОСТНИКОВЫЕ

1405. *Hippuris vulgaris* L. - Хвостник обыкновенный = КН(Голаркт.); Ас(К); [R.]

Сем. 118. ARALIACEAE Juss. - АРАЛИЕВЫЕ

1406. *Hedera caucasigena* Pojark. - Плющ кавказский = П(Бештау)Кисл[авт.] (Эвксин.); S(Ch:ll); [R.] <Rg;Rt>

Сем. 119. APIACEAE Lindl. - СЕЛЬДЕРЕЙНЫЕ(ЗОНТИЧНЫЕ)

1407. *Sanicula europaea* L. - Подлесник европейский = КЕ, Прик, ТБ, НК, Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Евро-Сиб.); S(НК); [Pl.] <Pm>

1408. *Astrantia trifida* Hoffm. - Астранция трёхнадрезанная = Кисл(Эукавк.); Pb(НК); [R.]

1409. *A. biebersteinii* Trautv. - А. Биберштейна = Кисл(Кавк.); Pb(НК); [Pl.]

1410. *A. maxima* Pall. - А. наибольшая = П(Субкавк\*.); Pb(НК); [Sp.]

1411. *Eryngium giganteum* Vieb. - Синеголовник гигантский = [Ст, ЛН: Гроссгейм, 1967], П(Эвксин.); Pb(НК); [Sp.]

1412. *E. campestre* L. - С. полевой = Все р-ны(Субсредиз\*.); ST, Rb(НК); [Pl.] <Pm>

1413. *E. planum* L. - С. плосколистный = КЕ, Прик, ТБ, НК, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Sp.] <Pm;Po>

1414. *E. caucasicum* Trautv. (*E. caeruleum* Vieb.; *E. biebersteinianum* Nevsky) - С. кавказский = П, Кисл(Армено-Иран.); ST(НК); [Sp.]

1415. *Physocaulis nodosus*(L.)Koch (*Myrrhoides nodosa*(L.)Cannon) -

Вздутоплодник узловатый = Ст(Общедр.средиз.); S, Rb(T); [R.] <Rg>

1416. *Chaerophyllum aureum* L. (*Ch. maculatum* Willd. ex DC.) - Бутень золотистый = [ТБ, КН: Меницкий, 1991], Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Армено-Иран.); S(НК); [Sp.]

1417. *Ch. roseum* Vieb. (*Ch. millefolium* DC.) - Б. розовый = Кисл(Кавк.); Pb(НК); [Pl.]

1418. *Ch. temulum* L. - Б. опьяняющий = КЕ[Меницкий, 1991], Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Европ.); S(T); [Sp.]

1419. *Ch. bulbosum* L. (*Ch. caucasicum*(Hoffm.)Schischk.) - Б. клубненосный = Ст, СК, ЛН, П, Кисл(Евро-Кавк.); S, Rb(T); [Sp.]

1420. *Ch. prescottii* DC. - Б. Прескотта = Ст(Палеаркт.); S(НК:pb); [R.] <Rg>
1421. *Anthriscus nemorosa*(Bieb.)Spreng. - Купырь дубравный = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Субкавказ\*.); S(НК); [Pl.]
1422. *A. sylvestris*(L.)Hoffm. - К. лесной = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Европ.); Rb(НК); [Sp.]
1423. *A. cereifolium*(L.)Hoffm. (*A. longirostris Bertol.*) - К. длинноносиковый = Все р-ны(Зап.др.средиз.); Rb(Т); [R.]
1424. *Scandix pecten-veneris* L. - Скандикс гребенчатый = КЕ,[ТБ,НК,М,КН:Меницкий, 1991],Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Общедр.средиз.); Rb(Т); [Sp.]
1425. *S. australis* L. (*S. falcata Londez, S. grandiflora auct.*) - С. южный = П(Кр.-Новоросс.); Rb(Т); [R.]
1426. *Myrrhis odorata*(L.)Scop. - Миррис душистый = П(Машук)[Галушко, 1980](Европ.); Pс(НК); [Rs.] <Rg>
1427. *Torilis japonica*(Houtt.)DC. - Торилис японский = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.); S(Т); [Pl.]
1428. *T. arvensis*(Huds.)Link - Т. полевой = Все р-ны(Общедр.средиз.); S,Rb(Т); [Pl.]
1429. *T. heterophylla* Guss. - Т. разнолистный = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Зап.др.средиз.); S(Т); [R.]
1430. *T. leptophylla*(L.)Reichenb.fil. - Т. плосколистный = КЕ,Ст,П,Кисл(Общедр.средиз.); ST,Rb(Т); [R.]
1431. *Astrodaucus orientalis*(L.)Drude - Морковница восточная = ЛН,СК,П,Кисл(Армено-Иран.); Dd,Rb(Т); [Pl.]
1432. *Caucalis lappula*(Web.)Grande - Прицепник липучковый = Все р-ны(Палеаркт.); ST,Ra,Rb(Т); [Sp.] <Pa>
1433. *Turgenia latifolia*(L.)Hoffm. - Тургенеция широколистная = КЕ,[ТБ,КН:Меницкий, 1991],Ст, (Общедр.средиз.); Rb(Т); [R.]
1434. *Coriandrum sativum* L. - Кориандр посевной = СК,П(Общедр.средиз.); Rb(Т); [R.]
1435. *Smyrniolum perfoliatum* L. - Смирния пронзеннолистная = [Прик,ТБ,НК:Меницкий, 1991],Ст,ЛН,СК,П(Средиземн.); S(НК:pb); [Sp.]
1436. *Physospermum cornubiense*(L.)DC. (*Ph. danaa*(Bieb.)Schishk.; *Danaa nudicaulis*(Bieb.)Grossh.) - Вздутосемянник корнубский = ТБ,НК[Меницкий, 1991], СК,П,Кисл(Зап.др.средиз.); S(НК); [Sp.]
1437. *Conium maculatum* L. - Болиголов пятнистый = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pt;Pm>
1438. *Eleutherospermum cicutarium*(Bieb.)Boiss. - Свободносемянник цикутовый = П,Кисл(Субкавказ\*.); S(НК); [Sp.]

1439. *Bilacunaria microcarpa*(Bieb.)M.Pimen.et V. Tichomirov (*Hippomarathrum microcarpum*(Bieb.)V.Petrov; *Cachrys microcarpos* Bieb.) - Конский фенхель мелкоплодный = Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Субкавказ\*.); Pa(НК); [Sp.]
1440. *Prangos odontalgica*(Pall.)Herrnst.et Heyn (*Cachrys odontalgica* Pall.) - Прангос противозубной = МД,АИ,НК,М,Ст,СК(Субтуран\*.); Dc(НК); [R.]
1441. *Vupleurum rotundifolium* L. - Володушка круглолистная = Ке,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.); Pa,Rb(T); [Sp.]
1442. *V. exaltatum* Bieb. - В. высокая = Ст,ЛН,П,Кисл(Вост.др.средиз.); Da(НК); [Pl.]
1443. *V. polyphyllum* Ledeb. - В. многолистная = П,Кисл(Кавк.); Pb(НК); [Pl.]
1444. *V. gerardii* All. (*V. commutatum* Boiss.et Bal.) - В. Жерарда = Ке,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,Ст,СК,КН(Зап.др.средиз.); ST(T); [Sp.]
1445. *V. affine* Sadl. - В. родственная = Ке[Меницкий, 1991],СК,П(Понтич.); ST(T); [R.]
1446. *V. brachiatum* C.Koch - В. ветвистая = Ке,Ст,СК,П(Эвксин.); ST(T); [R.]
1447. *V. asperuloides* Helder.ex Boiss. - В. ясменниковая = П(Железноводск) (Кр.-Новоросс.); Dc(T); [Rs.] <Rx>
1448. *V. tenuissimum* L. - В. тончайшая = Ке,Ст,СК(Субсредиз\*.); ST(T); [Sp.]
1449. *V. marschallianum* C.A.Mey. - В. Маршалла = Прик,ТБ,НК,М,СК,КН(Субкавказ\*.); Dc(T); [R.] l.c. Кизляра
1450. *Trinia multicaulis*(Poir.)Schischk. - Триния многостебельная = Ке (Понтич.); ST(НК); [R.]
1451. *T. kitaibeli* Bieb. - Т. Китайбея = Ке,Ст,СК,П(Понтич.); ST(НК:pb); [R.]
1452. *T. leiogona*(C.A.Mey.)B.Fedtsch. - Т. гладкоплодная = Ке,Прик,ТБ,НК,М,Ст,СК,П(Субкавказ\*.); ST(НК); [Sp.]
1453. *T. hispida* Hoffm. - Т. щетинистоволосистая = Ке,Прик,ТБ,НК,М,Ст,СК,П(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.]
1454. *Apium graveolens* L. - Сельдерей пахучий = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(НК:pb); [R.] <Pa>
1455. *Visnaga daucoides* Gaertn. (*Ammi visnaga*(L.)Lam.) - Визнага морковная (Амми зубная) = П (Пятигорск),КН(Средиземн.); ST(НК:pb); [R.] <Pm>
1456. *Falcaria vulgaris* Bernh. (*F. sioides*(Wib.)Aschers.) - Резак обыкновенный = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,ST(НК); [Pl.] <Pm>
1457. *Carum carvi* L. - Тмин обыкновенный = Кисл(Палеаркт.); Pb,Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm>
1458. *Elaeosticta lutea*(Hoffm.)Kljuikov,M.Pimen.et V. Tichomirov (*Muretia lutea*(Hoffm.)Boiss.) - Элеостикта (Муреция) жёлтая = МД(Понт.-Южносиб.); Dc,Rb(НК); [R.] <Rx>
1459. *Chamaescidium acaule*(Bieb.)Boiss. - Низкозонтичник бесстебельный = П,Кисл(Субкавказ\*.); Pb(НК); [Sp.] l.c. Бештау

1460. *Pimpinella pseudotragium* DC. (*P. confusa* Woronow) - Бедренец  
смешиваемый = КЕ, Прик, ТБ(Кавк.); Да(НК); [R.]
1461. *P. saxifraga* L. - Б. камнеломка = Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Евро-Сиб.); Pb(НК);  
[Pl.] <Pm>
1462. *P. rhodantha* Boiss. - Б. розоцветный = П, Кисл(Субкавк\*.); Pb(НК); [Pl.]
1463. *P. major*(L.)Huds. - Б. большой = Кисл(Евро-Сиб.); Pb(НК); [R.]
1464. *Albovia tripartita*(Kalen.)Schischk. (*Pimpinella tripartita* Kalen.) - Альбовия  
трёхраздельная = КЕ, Прик, ТБ, Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Субкавк\*.); S(НК); [Sp.]
1465. *Aegorodium podagraria* L. - Сныть обыкновенная = Ст, ЛН, СК, П, Кисл  
(Палеаркт.); S, Rb(НК); [Pl.] <Pm>
1466. *Sium latifolium* L. - Поручейник широколистный = ТБ, НК, КН[Меницкий,  
1991](Палеаркт.); Да(НК); [Sp.] <Pt>
1467. *S. sisaroides* DC. - П. сизаровидный = Все р-ны(Субтуран\*.); Аа(НК); [Pl.]
1468. *Verula erecta*(Huds.)Cov. (*Sium erectum* Huds.) - Берула прямая = АИ, НК,  
М, Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Евро-Кавк.); Ab(К); [Sp.]
1469. *Seseli dichotomum* Pall.ex Vieb. - Жабрица вильчатая = П(Бештау)  
(Понтич.); Db(НК); [R.] <Rx>
1470. *S. petraeum* Vieb. - Ж. каменистая = П, Кисл(Кавк.); Db(НК); [Sp.]
1471. *S. peucedanoides*(Vieb.)K.-Pol. - Ж. горчичниковидная = Ст, ЛН, СК, П,  
Кисл(Субкавк\*.); Pa(НК); [Sp.] l.c. Кисловодск
1472. *S. varium* Trev. - Ж. варьирующая = П, Кисл(Эукавк.); ST(НК); [Sp.]
1473. *S. tortuosum* L. (*S. campestre* Bess.) - Ж. извилистая = Все р-ны (Понтич.);  
Pa, ST(НК); [Sp.]
1474. *Libanotis transcaucasica* Schischk. (*Seseli libanotis*(L.)Koch) - Порезник  
кавказский = Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Субкавк\*.); Pa, Pb(НК:pb); [Sp.] <Pm>
1475. *Oenanthe aquatica*(L.)Poir. - Омежник водяной = КЕ, МД, АИ, НК, Прик,  
ТБ, М, СК, П, Кисл(Палеаркт.); Ab(К); [Sp.]
1476. *Aethusa cynapium* L. - Кокорыш собачья петрушка = КЕ, Прик, ТБ, НК,  
Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Палеаркт.); S, Rb(T); [Pl.]
1477. *Silaum silaus*(L.)Schinz et Thell. (*Silaum besseri*(DC.)Galushko) - Морковник  
обыкновенный = П(Понтич.); Pa(НК); [R.]
1478. *Macroscladium alatum*(Vieb.)V. Tichomirov et Lavrova (*Ligusticum*  
*alatum*(Vieb.)Spreng.) - Макросциadium (Лигустикум) крылатый =  
Ст, П, Кисл(Субкавк\*.); Pb(НК); [Sp.] l.c. Кисловодск
1479. *Angelica sylvestris* L. (*Angelica pachyptera* Ave-Lall.) - Дягель лесной = Кисл  
(Палеаркт.); S, Аа(НК); [Sp.]
1480. *Archangelica officinalis* Hoffm. (*Angelica archangelica* L.) - Архангелика  
лекарственная = П(Европ.); S, Аа(НК:pb); [R.] <Pm>
1481. *Agasyllis latifolia*(Vieb.)Boiss. - Агазилис широколистный = П, Кисл (Кавк.);  
Pb(НК); [Sp.]

1482. ★ ★ *Eriosynaphe longifolia*(Fisch.ex Spreng.)DC. - Пушистоспайник  
длиннолистный = КЕ,М,СК,П(Субтуран\*.); СТ(НК); [R.] <Rx>
1483. ★ *Ferula tatarica* Fisch.ex Spreng. - Ферула татарская = М,Ст,ЛН,СК  
(Субтуран\*.); Дс(НК); [Sp.] l.c. Ставрополь
1484. ★ *F. caspica* Vieb. - Ф. каспийская = М,Ст,СК,П,КН(Субтуран\*.); Дс(НК);  
[Sp.]
1485. *Ferulago campestris*(Bess.)Grec. - Ферульник полевой = Все р-ны  
(Субпонт\*.); Ра(НК); [R.]
1486. *Peucedanum ruthenicum* Vieb. - Горичник русский = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,  
ЛН,СК,П,Кисл(Понт.-Южносиб.); Ра(НК); [Pl.]
1487. *P. tauricum* Vieb. - Г. крымский = КЕ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Кр.-Новоросс.);  
СТ(НК); [Sp.]
1488. *P. adae* Woronow - Г. Ады = П(Эвксин.); Да(НК); [R.] <Rx>
1489. *P. carvifolia* Vill. (*P. podolicum*(Bess.)Todor) - Г. оленелистный = Ст,Кисл  
(Европ.); S(НК); [R.]
1490. *P. pshawicum* Boiss. - Г. пшавский = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Эукавк.); Рb(НК);  
[Sp.]
1491. *P. oreoselinum* (L.)Moench - Г. горный = П,Кисл(Европ.); S(НК); [R.]
1492. *Macroselinum latifolium*(Vieb.)Schur (*Peucedanum latifolium* (Vieb.)DC.) -  
Макроселинум широколистный = [Прик: Танфильев, Кононов, 1987],Ст  
(Эукавк.); S(НК); [R.]
1493. *Xanthoselinum alsaticum*(L.)Schur (*Peucedanum alsaticum* L.; *P. lubimen-*  
*koanum* Koton) - Ксантоселинум альзатский = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Понт.-  
Южносиб.); Ра(НК); [Sp.]
1494. *Cervaria rivinii* Gaertn. (*Peucedanum cervaria*(L.)Lapeyr.) - Цервария оленья =  
П(Машук,Бештау)(Европ.); Ра(НК); [R.] <Rg>
1495. *C. caucasica*(Vieb.)M.Pimen. - Ц. кавказская = Кисл(Эвксин.); S(НК); [R.]
1496. *Laser trilobum*(L.)Borkh. - Лазурник трёхлопастный = Ст,ЛН,П,Кисл (Евро-  
Кавк.); Ра,S(НК); [Sp.]
1497. *Pastinaca sylvestris* Mill. - Пастернак лесной = Ст,СК,П,Кисл(Палеаркт.);  
Ра(НК:pb); [Sp.]
1498. *P. umbrosa* Stev.ex DC. - П. теневой = Кисл(Кисловодск)(Армено-Иран.);  
Ра(НК); [Sp.]
1499. *P. pimpinellifolia* Vieb. - П. бедреницелистный = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,  
СК,П,Кисл(Кавк.); Ра(НК); [Pl.]
1500. *P. armena* Fisch.et С.А.Меу. - П армянский = Кисл(Кавк.); Рb(НК); [Sp.]
1501. *P. clausii*(Ledeb.)M.Pimen.(*P. biebersteinii* Galushko) - П. Клауса = Ст,  
ЛН,СК,П,Кисл,КН(Понтич.); Ра(НК); [Sp.]
1502. *Heracleum sibiricum* L. - Борщевик сибирский = Ст,СК,П,Кисл (Палеаркт.);  
Ра(НК); [Sp.] <Pt;Pm>

1503. *H. asperum*(Hoffm.)Vieb. - Б. жёсткий = П,Кисл(Кавк.); Pa(НК); [Pl.] <Pt>  
 l.c. Бештау
1504. *H. mantegazzianum* Somm.et Levier - Б. Мантегацци = Ст,ЛН,СК,П,Кисл  
 (Эвксин.); S,Pb(НК:pb); [Pl.] <Pt>
1505. *H. chorodanum*(Hoffm.)DC. - Б. айрный = П,Кисл(Кавк.); Pb(НК); [Sp.] l.c.  
 Кисловодск
1506. *Zosima orientalis* Hoffm. (*Z. absinthifolia*(Vent.)Link) - Зосима восточная =  
 Ст,СК,П,Кисл(Общедр.средиз.); Da(НК); [Sp.]
1507. *Tordylium maximum* L. - Тордилиум крупный = Все р-ны (Общедр.средиз.);  
 Pa,Rb(T); [Sp.]
1508. *Laserpitium hispidum* Vieb. - Гладыш щетинистоволосистый = СК,П,Кисл  
 (Кавк.); Da(НК); [Sp.]
1509. *Daucus carota* L. - Морковь дикая = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Rb(НК:pb);  
 [Pl.] <Pm>

Сем. 120. CORNACEAE Dumort. - КИЗИЛОВЫЕ

1510. *Cornus mas* L. - Кизил обыкновенный = Ке,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл  
 (Общедр.средиз.); S(Phm); [Pl.] <Pa;Pm>
1511. *Swida australis*(C.A.Mey.)Pojark.ex Grossh. (*Thelycrania australis* auct.) -  
 Свидина южная = Ке,Прик,ТБ,НК,М,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Общедр.средиз.);  
 S(Phm); [Pl.]

Сем. 121. PYROLACEAE Dumort. - ГРУШАНКОВЫЕ

1512. ★ *Pyrola rotundifolia* L. - Грушанка круглолистная = Ст,П,Кисл(Голаркт.);  
 S(НК); [Rs.] <Rg;Pm>
1513. ★ *Orthilia secunda*(L.)House - Ортилия маленькая = Ст,ЛН,П,Кисл (Панбор.);  
 S(НК); [Rs.] <Rg>

Сем. 122. MONOTROPACEAE Nutt. - ПОДЪЕЛЬНИКОВЫЕ

1514. ★ *Nyropitis monotropa* Crantz - Подъельник обыкновенный = Ст,П,Кисл  
 (Голаркт.); S(НК:sap); [Rs.] <Rg>

Сем. 123. ERICACEAE Juss. - ВЕРЕСКОВЫЕ

1515. ★ *Rhododendron luteum* Sweet - Рододендрон жёлтый = Ст[Гросгейм,  
 1967],П,Кисл(Евро-Кавк.); S,Pb(Phn); [Sp.] <Po;Pt>

Сем. 124. PRIMULACEAE Vent. - ПЕРВОЦВЕТНЫЕ

1516. ★ *Primula amoena* Vieb. - Первоцвет приятный = П(Бештау)(Эукавк.);  
 Pa,Pb(НК); [Rs.] <Rg> <Po> l.c. Бештау

1517. *P. macrocalyx* Bunge - П. крупночашечковый = Все р-ны(Евро-Сиб.); S,Pa(НК); [Pl.] <Pm;Po>
1518. *P. ruprechtii* Kusn. - П. Рупрехта = Кисл(Кавк.); Pb(НК); [R.] <Po>
1519. *P. algida* Adams - П. холодный = Кисл(Евро-Сиб.); Pb,PC(НК); [Sp.]
1520. *Androsace barbulate* Ovcz. (*A. villosa auct.*; *A. koso-poljanskii* Ovcz.) - Проломник бородчатый = Кисл(Кавк.); Da(НК); [Pl.] <Po>
1521. *A. elongata* L. - П. удлинённый = Ст,СК,П,Кисл(Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.]
1522. *A. maxima* L. (*A. turczaninonii* Freyn.) - П. наибольший = Все р-ны (Палеаркт.); ST,Rb(T); [Pl.]
1523. ★ *Lysimachia nummularia* L. - Вербейник монетный = КЕ(Григорополисская), Ст(Ставрополь) (Европ.); S(НК); [R.] <Rg;Pm;Po>
1524. *L. verticillaris* Spreng. - В. мутовчатый = Все р-ны(Субкавказ\*.); Pa(НК); [Pl.]
1525. *L. dubia* Soland. - В. сомнительный = М(Субкавказ\*.); Aa(T); [Sp.]
1526. *L. vulgaris* L. - В. обыкновенный = Все р-ны(Палеаркт.); S,Aa(НК); [Sp.]
1527. *Anagallis arvensis* L. - Очный цвет полевой = М,Ст,СК(Палеаркт.); Ra,Rb(T); [R.] <Pm>
1528. *A. foemina* Vill. (*A. caerulea* Schreb.) - О.ц. женский = КЕ,Ст,СК,П (Общедр.средиз.); Ra,Rb(T); [R.]
1529. ★ *Samolus valerandi* L. - Северница Валеранда = НК,Ст,СК,П (Общедр.средиз.); Aa(НК); [R.]

#### Сем. 125. LIMONIACEAE Ser. - КЕРМЕКОВЫЕ

1530. *Goniolimon tataricum*(L.)Boiss. - Гониолимон татарский = Все р-ны (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Sp.] <Po>
1531. ★ *G. besserianum*(Schult.)Kusn. - Г. Бессера = МД,АИ,НК,М,КН(Понтич.); Dc(НК); [Rs.] <Rx>
1532. *Limonium meyeri*(Boiss.)O.Kuntze - Кермек Мейера = Все р-ны (Субтуран\*.); Dc(НК); [Pl.] <Pm;Pmel;Po>
1533. *L. tomentellum*(Boiss.)O.Kuntze - К. опушённый = КН[Гроссгейм, 1967] (Понтич.); Dc,Aa(НК); [Sp.] <Pmel>
1534. *L. platyphyllum* Lincz. (*L. latifolium*(Smith)O.Kuntze) - К. широколистный = Все р-ны(Понтич.); ST(НК); [Pl.] l.c. Азов <Pmel;Po>
1535. *L. sareptanum*(A.Beck.)Gams - К. сарептский = МД[Танфильев, Кононов, 1987](Субтуран\*.); ST,Dc(НК); [Pl.] <Pmel;Po>
1536. *L. caspium*(Willd.)Gams - К. каспийский = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ, Ст,СК,КН(Субтуран\*.); Dc(НК); [Sp.] <Pmel;Po>
1537. *L. suffruticosum*(L.)O.Kuntze - К. полукустарниковый = МД(Субтуран\*.); Dc(Ch:sf); [R.] <Pmel>
1538. *Psylliostachys spicata*(Willd.)Nevski - Подорожничкоцветник колосистый = НК,КН(Ирано-Туран.); Dc(T); [R.]



Сем. 126. OLEACEAE Hoffm. et Link - МАСЛИНОВЫЕ

1539. *Fraxinus excelsior* L. - Ясень обыкновенный = Ке, Прик, Тб, Нк, Ст, Лн, Ск, П, Кисл (Европ.); S(Phmg); [Pl.] <Pm>  
1540. *Ligustrum vulgare* L. - Бирючина обыкновенная = Все р-ны (Европ.); S(Phn); [Pl.] <Po;Pm;Pmel>

Сем. 127. GENTIANACEAE Juss. - ГОРЕЧАВКОВЫЕ

1541. *Centaureum pulchellum* (Sw.) Druce - Золототысячник красивый = Ст [Танфильев, Кононов, 1987], П, Кисл (Палеаркт.); Аа(Т); [Sp.] <Pm>  
1542. *C. meyeri* (Bunge) Druce - З. Мейера = М, Лн, Ск, П, Кн (Общедр. средиз.); Аа(Т); [Sp.]  
1543. *C. littorale* (D. Turner) Gilmour (*C. minus* Moench; *C. vulgare* Rafn) - З. прибрежный = Все р-ны (Европ.); Ра(Нк:pb); [Pl.] <Pm>  
1544. ★ *C. spicatum* (L.) Fritsch - З. колосовидный = МД (Калаус), Кн (Общедр. средиз.); Дс(Т); [R.] <Rx>  
1545. *Gentiana schistocalyx* (C. Koch) C. Koch - Горечавка раздельночашечная = П, Кисл (Кавк.); S(Нк); [R.] <pm>  
1546. *G. septemfida* Pall. - Г. семираздельная = П, Кисл (Субкавк\*); S, Pb(Нк); [Sp.]  
1547. *G. cruciata* L. - Г. крестообразная = Ке, Прик, Тб, Нк, Ст, Лн, Ск, П, Кисл (Палеаркт.); Ра(Нк); [Sp.] <Pm>  
1548. *G. dshimilensis* C. Koch - Г. джимильская = Кисл (Кавк.); Ра, Pb(Нк); [Sp.]  
1549. *G. aquatica* L. - Г. водная = П, Кисл (Голаркт.); Pb, Pc(Т); [Sp.]  
1550. *G. angulosa* Vieb. - Г. угловатая = Кисл (Субкавк\*); Pb?Pc(Нк); [Sp.]  
1551. ★ *G. oshtenica* (Kusn.) Woronow - Г. оштенская = Кисл (Кисловодск) (Эукавк.); Pb, Pc(Нк); [Rs.]  
1552. *Gentianopsis blepharophora* (Bordz.) Galushko (*Gentiana blepharophora* Bordz.) - Горечавочник ресниченосный = П, Кисл (Субкавк\*); ST(Нк); [R.]  
1553. *Gentianella biebersteinii* (Bunge) Holub (*Gentiana biebersteinii* Bunge) - Горечавочка Биберштейна = П, Кисл (Кавк.-Эвкс.); Pb, Pc(Нк); [Sp.] l.c. Минеральные Воды  
1554. *G. amarella* (L.) Boern. (*Gentianella axillaris* (F. W. Schmidt) A. et D. Love; *Gentiana axillaris* (F. W. Schmidt) Reichenb) - Г. горьковатая = П, Кисл (Евро-Сиб.); Pb(Нк); [R.]  
1555. *G. promethea* (Juz.) Holub (*Gentiana caucasica* Vieb.) - Г. Прометея = П, Кисл (Субкавк\*); Pb, Pc(Нк); [Sp.]  
1556. *G. caucasea* (Lodd. ex Siros) Holub - Г. кавказская = Кисл (Эукавк.); Pb, Pc(Нк); [Rs.]

Сем. 128. APOCYNACEAE Juss. - КУТРОВЫЕ

1557. *Vinca herbacea* Waldst. et Kit. - Барвинок травянистый = Все р-ны (Субпонт\*.); Pa(НК); [Pl.] <Pt;Po>
1558. *Trachomitum sarmatiense* Woodson - Кендырь сарматский = Все р-ны (Понт.-Южносиб.); Aa(НК); [Sp.]

Сем. 129. ASCLEPIADACEAE R.Br. - ЛАСТОВНЕВЫЕ

1559. *Asclepias siriaca* L. - Ваточник сирийский = Ст[авт.](Адвент.[Передняя Азия]); Ra,Rb(НК); [R.]
1560. ★ *Periploca graeca* L. - Обвойник греческий = KE(Кубань)(Зап.др.средиз.); S(Ch:ll); [R.] <Pm;Po>
1561. *Vincetoxicum albovianum*(Kusn.)Pobed. (*V. stepposum*(Pobed.)A. et D.Love; *V. officinale* Ledeb.) - Ластовень степной = Ст,П[Танфильев, Кононов, 1987](Эвксин.); ST(НК); [R.] <Rx>
1562. ★ *V. stauropolitanum* Pobed. - Л. ставропольский = Ст(Стрижамент), Прик(Брык)(Предкавк.); ST(НК); [Rs.] <Es> l.c. г.Брык (рис. 9)
1563. *V. scandens* Somm. et Levier - Л. лазящий = KE, Прик, ТБ, НК, Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Субкавк\*.); S(НК); [Pl.] <Pmel>
1564. *V. rehmannii* Boiss. - Л. Реманна = Ст, П, Кисл(Кавк.); S(НК); [Sp.] l.c. Владикавказ <Pmel>
1565. *V. laxum*(Bartl.)Gren. et Gord. - Л. рыхлый = KE, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Субпонт\*.); Pa(НК); [Pl.] <Pmel>
1566. *V. funebre* Boiss. et Kotschy - Л. погребальный = Ст, П, Кисл(Субкавк\*.); Dd(НК); [R.] <Pmel>
1567. *V. schmalhausonii*(Kusn.)Stank. - Л. Шмальгаузена = Ст, СК, П, Кисл(Кавк.); Pa(НК); [Sp.] <Pmel>
1568. *Cynanchum acutum* L. - Цинанхум острый = Все р-ны(Субсредиз\*.); Db,Rb(НК:lh); [Sp.]

Сем. 130. CONVULVULACEAE Juss. - БЬЮНКОВЫЕ

1569. *Convolvulus cantabrica* L. - Вьюнок кантабрийский = KE, П(Зап.др.средиз.); Da(НК); [R.]
1570. *C. lineatus* L. - В. узколистый = Ст, СК, П, Кисл(Общедр.средиз.); ST, Da(НК); [Sp.] <Pm>
1571. *C. arvense* L. - В. полевой = Все р-ны(Плюрирег.); ST, Ra, Rb(НК:lh); [Pl.] <Pm>
1572. *Calystegia sepium*(L.)R.Br. - Повой заборный = Все р-ны(Плюрирег.); S, Aa(НК:lh); [Sp.] <Pm>
1573. *C. silvatica*(Kit.)Griseb. (*Convolvulus silvaticus* Kit.; *Calystegia sylvestris*(Willd.)Roem. et Schult.) - П. лесной = Все р-ны(Зап.др.средиз.); S, Aa(НК:lh); [Sp.]

Сем. 131. CUSCUTACEAE Dumort. - ПОВИЛИКОВЫЕ

1574. *Cuscuta epithymum*(L.)L. - Повилика тимьяновая = Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Палеаркт.); ST(T:par); [Pl.]
1575. *C. approximata* Vab. (*C. cupulata* Engelm.) - П. сближенная = Все р-ны (Палеаркт.); ST(T:par); [Pl.]
1576. *C. europaea* L. - П. европейская = КЕ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.); Pa(T:par); [Sp.] <Pm>
1577. *C. epilinum* Weihe - П. льняная = Ст,П(Плюрирег.); Pa(T:par); [R.]
1578. *C. tinei* Insenga (*C. australis* R.Br.; *C. brevifolia* Vis.) - П. Тина = КЕ,Прик, ТБ(Общедр.средиз.); Ra(T:par); [R.]
1579. *C. campestris* Yunck. - П. полевая = Все р-ны(Адвент.[Дальний Восток]); Ra(T:par); [R.]
1580. *C. monogyna* Vahl. - П. одностолбиковая = Все р-ны(Общедр.средиз.); Pa(T:par); [Sp.]
1581. *C. lupuliformis* Krock. - П. хмелевидная = П(Вост.др.средиз.); Pa(T:par); [R.]

Сем. 132. HYDROPHYLLACEAE R.Br. - ГИДРОФИЛИЕВЫЕ

1582. *Phacelia tanacetifolia* Benth. - Фацелия пижмолистная = П(Адвент.[Сев. Америка]); Ra,Rb(T); [R.]

Сем. 133. HELIOTROPACEAE H.A.Schrader - ГЕЛИОТРОПОВЫЕ

1583. *Argusia sibirica*(L.)Dandy (*Tournefortia sibirica* L.) - Аргузия сибирская = МД,АИ,НК,М,СК(Палеаркт.); Db(НК); [Sp.]
1584. *Heliotropium ellipticum* Ledeb. (*Heliotropium lasiocarpum* Fisch.et C.A.Mey.) - Гелиотроп опушённоплодный = М,СК,КН(Общедр.средиз.); ST,Rb(T); [R.]
1585. *H. europaicum* L. - Г. европейский = Прик,ТБ,НК,М,Ст,СК,П(Субпонт\*.); Rb(T); [Sp.]
1586. *H. suaveolens* Vieb. - Г. душистый = МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,СК,КН (Субпонт\*.); ST,De(T); [Sp.]

Сем. 134. BORAGINACEAE Juss. - БУРАЧНИКОВЫЕ

1587. *Aegonichon purpureocaeruleum*(L.)Holub (*Lithospermum purpureocaeruleum* L.; *Buglossoides purpureocaerulea*(L.)Johnst.) - Эгонихон фиолетово-синий = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Европ.); S(НК); [Pl.]
1588. *Lithospermum officinale* L. - Воробейник лекарственный = Все р-ны (Палеаркт.); ST,Rb(НК); [Sp.] <Pm>
1589. *Buglossoides arvensis*(L.)Johnst. (*Lithospermum arvense* L.) - Буглоссоид полевой = Все р-ны(Палеаркт.); Pa(T); [Pl.] <Pm>

1590. *V. tenuiflora*(L.fil.)Johnst. (*L. tenuiflorum L.fil.*) - Б. тонкоцветковый = МД, АИ,Прик,ТБ,Ст,КН(Общедр.средиз.); Дс(Т); [R.]
1591. *Airyanthus echioides*(L.)Stev. - Айпиант синяковый = Кисл(Кавк.); Pb(НК); [Sp.]
1592. *Onosma tinctoria* Vieb. (*O. polychroma Klok.ex M.Pop.*) - Оносма красильная = Все р-ны(Субтуран\*.); ST(Т); [Sp.]
1593. *O. caucasica* Levin ex M.Pop. - О. кавказская = П,Кисл(Эукавк.); Pb(НК); [Pl.]
1594. *Cerinth minor* L. - Восковник малый = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Субсредиз\*.); Pa,Rb(НК:pb); [Pl.]
1595. *Echium russicum* J.F.Gmel. (*E. rubrum Jacq.*) - Синяк русский = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Субпонт\*.); Pa(НК:pb); [Pl.]
1596. *E. biebersteinii*(Lacaita)Dobroc. (*E. italicum L.*) - С. итальянский = КЕ,Ст,СК(Общедр.средиз.); Rb(НК:pb); [Sp.]
1597. *E. vulgare* L. - С. обыкновенный = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm;Pmel>
1598. *Symphytum officinale* L. - Окопник лекарственный = Прик,ТБ,НК,М,СК,П(Кума)(Европ.); Аа(НК); [R.] <Pm;Pmel>
1599. *S. causicum* Vieb. - О. кавказский = Ст,П,Кисл(Кавк.); S(НК); [Sp.] <Pmel>
1600. *S. asperum* Lerech. - О. шершавый = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Кавк.); S,Rb(НК); [Pl.] <Pmel;Pp>
1601. ★ *S. podcubicum* Frolov - О. подкумский = П,Кисл[Фролов, 1985] (Предкавк.); Аа(НК); [R.] <Pmel> <Es> l.c. ст. Подкумок (рис.10)
1602. *S. tauricum* Willd. - О. крымский = Ст,ЛН,Кисл(Понтич.); S,Rb(НК:pb); [Sp.] <Pmel>
1603. *Lycopsis orientalis* L. - Кривоцвет восточный = Все р-ны(Общедр.средиз.); Pa,Ra,Rb(Т); [Pl.]
1604. *Borago officinalis* L. - Огуречная трава лекарственная = Ст,СК(Адвент [Европа].); Rb(НК:pb); [R.] <Pa;Pmel;Pm>
1605. *Anchusa officinalis* L. - Воловик лекарственный = Ст,СК(Европ.); Ra,Rb(НК:pb); [Sp.]
1606. *A. gmelinii* Ledeb. - В. Гмелина = КЕ(Понтич.); Db(НК:pb); [R.]
1607. *A. ochroleuca* Vieb. - В. бледно-жёлтый = КЕ,МД,АИ,НК,КН(Понтич.); Db(НК:pb); [Sp.]
1608. *A. azurea* Mill. (*A. italica Retz.*) - В. итальянский = КЕ,Ст,СК(Общедр.средиз.); Ra,Rb(НК); [Sp.] <Pm>
1609. *Nonea lutea*(Desv.)DC. - Ноней жёлтая = МД,АИ,НК,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Субкавк\*.); Db,Rb(Т); [Pl.]

1610. *N. setosa*(Lehm.)Roem.et Schult. - Н. щетинистая = Прик,ТБ,НК,Ст,П,КН (Кавк.); ST,Dd(T); [Sp.]
1611. *N. rosea*(Bieb.)Link - Н. розовая = КЕ,Ст,СК(Кавк.); ST,Rb(T); [Sp.]л.с.  
Кизляр
1612. *N. caspica*(Willd.)G.Don fil. - Н. каспийская = КН(Ирано-Туран.); ST(T); [R.]
1613. *N. rossica* Stev. (*N. pulla auct.*) - Н. русская = МД,АИ,Прик,ТБ,Ст,СК(Понт.-Южносиб.); ST,Rb(НК); [Sp.]
1614. *Pulmonaria mollis* Wulf.ex Hornem. (*Pulmonaria mollissima A.Kerner*) - Медуница мягкая = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Евро-Сиб.); S(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>
1615. *Myosotis amoena*(Rupr.)Voiss. - Незабудка приятная = П,Кисл(Эвксин.); S(НК); [Sp.]
1616. *M. sparsiflora* Pohl - Н. редкоцветковая = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Палеаркт.); S,Aa(T); [Sp.]
1617. *M. palustris*(L.)L. - Н. болотная = Кисл(Голаркт.); Aa(НК); [Sp.]
1618. *M. cespitosa* K.F.Schultz - Н. дернистая = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Голаркт.); Aa(НК); [Sp.]
1619. *M. micrantha* Pall.ex Lehm. - Н. мелкоцветковая = Ст,СК,П(Палеаркт.); Db(T); [R.]
1620. *M. arvensis* (L.)Hill - Н. полевая = Все р-ны(Палеаркт.); Pa(T); [Pl.] <Pm>
1621. *M. sylvatica* Ehrh.ex Hoffm. - Н. лесная = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Европ.); S(T); [Pl.]
1622. *M. lithospermifolia*(Willd.)Hornem. (*M. suaveolens auct.*) - Н. воробейниколистная = Ст,СК,П(Палеаркт.); Pa,Pb(НК); [Sp.]
1623. *M. alpestris* F.W.Schmidt - Н. альпийская = П,Кисл(Евро-Кавк.); Pb(НК); [Pl.]
1624. *Lappula squarrosa*(Retz.)Dumort. (*L. myosotis Moench; L. echinata Gilib. nom. invalid.*) - Липучка ежевидная = Все р-ны(Палеаркт.); ST,Rb(T); [Pl.]
1625. *L. heteracantha*(Ledeb.)Vorb. - Л. разношипая = Ст,СК,П,Кисл(Понт.-Южносиб.); ST(T); [R.]
1626. *L. barbata*(Bieb.)Guerke - Л. бородчатая = Все р-ны(Ирано-Туран.); ST,Rb(T); [Pl.]
1627. *L. filiformis*(Godet)Kusn. - Л. нитевидная = Кисл(Эукавк.); ST(T); [R.]
1628. *L. patula*(Lehm.)Menyharth - Л. пониклая = Все р-ны(Общедр.средиз.); Rb(T); [Sp.]
1629. *L. marginata*(Lehm.)Guerke - Л. окаймлённая = М,КН(Туранск.); ST(T); [R.]
1630. *Asperugo procumbens* L. - Асперуга простёртая = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(T); [Sp.]
1631. *Rochelia retorta*(Pall.)Lipsky - Рохелия согнутая = КЕ,Прик,ТБ,Ст,СК (Субтуран\*); Pa(T); [R.]

1632. ★ *Rindera tetraspis* Pall. - Риндера четырёхщитковая = СК,П(Субтуран\*.); СТ(НК); [Rs.] <Rx>
1633. ★ *Omphalodes scorpioides*(Haenke)Schrank - Пупочник ползучий = Ст(Европ.); S(T); [Rs.] <Rg>
1634. ★ *Solenanthes Biebersteinii* DC. - Трубноцвет Биберштейна = Прик,Ст (Стрижамент)(Эвксин.); S(НК); [Rs.] <Rg>
1635. *Cynoglossum officinale* L. - Чернокорень лекарственный = Все р-ны (Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm>
1636. *C. germanicum* Jacq. (*C. montanum* L.) - Ч. германский = Ст(Европ.); S(НК:pb); [Sp.]

Сем. 135. VERBENACEAE J.St.-Hil. - ВЕРБЕНОВЫЕ

1637. *Verbena officinalis* L. - Вербена лекарственная = Все р-ны(Плюрирег.); Rb(НК); [Pl.] <Pm>
1638. *V. supina* L. - В. лежащая = МД,АИ(Общедр.средиз.); Db,Dd(T); [R.]

Сем. 136. LAMIACEAE Lindl. - ЯСНОТКОВЫЕ(ГУБОЦВЕТНЫЕ)

1639. *Ajuga reptans* L. - Живучка ползучая = Ст(Палеаркт.); Pa(НК); [R.] <Pm>
1640. *A. genevensis* L. - Ж. женевская = Все р-ны(Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pm>
1641. *A. orientalis* L. - Ж. восточная = Все р-ны(Зап.др.средиз.); ST(НК:eph); [Pl.]
1642. *A. laxmannii*(L.)Benth. - Ж. Лаксмана = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Понтич.); Pa(НК); [Sp.]
1643. *A. chia* Schreb. - Ж. хиосская = КН(Общедр.средиз.); ST(T); [R.] <Pm>
1644. *A. glabra* C.Presl. (*A. pseudochia* Shost.) - Ж. голая = КЕ,МД,АИ, НК,Прик,ТБ,Ст,СК(Зап.др.средиз.); ST,Rb(T); [Pl.]
1645. *Teucrium orientale* L. - Дубровник восточный = Кисл(Субкавк.\*); Da(Ch:sf); [R.]
1646. *T. scordioides* Schreb. - Д. скордиевидный = Прик,ТБ,НК,СК,П (Общедр.средиз.); Aa(НК); [Sp.]
1647. *T. nuchense* C.Koch - Д. нухинский = Все р-ны(Субкавк\*.); Pa(НК); [Pl.]
1648. *T. chamaedrys* L. - Д. обыкновенный = Все р-ны(Субпонт\*.); Pa(Ch:sf); [Sp.] <Pm>
1649. *T. polium* L. - Д. белый = Все р-ны(Общедр.средиз.); Pa,ST(Ch:sf); [Pl.] <Pm>
1650. *Scutellaria galericulata* L. - Шлемник обыкновенный = Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.] <Pm>
1651. *S. hastifolia* L. - Ш. копьелистный = Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Европ.); Aa(НК); [Sp.]

1652. *S. altissima* L. - Ш. высочайший = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Субсредиз\*.); S(НК); [Sp.]
1653. ★ *S. polyodon* Juz. - Ш. многозубый = [Ст: Танфильев, Кононов, 1987],ЛН, П,Кисл(Эукавк.); Da(Ch:sf); [R.] <Po> 1.с. Кисловодск
1654. *S. oreophila* Grossh. - Ш. горолюбивый = П,Кисл(Кавк.); Pb(Ch:sf); [Pl.]
1655. *Marrubium praesox* Janka - Шандра ранняя = Все р-ны(Понтич.); ST,Rb(НК); [Pl.] <Pmel>
1656. *M. vulgare* L. - Ш. обыкновенная = КЕ,Прик,ТБ,НК,М,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Общедр.средиз.); Pa,Ra,Rb(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>
1657. *M. catarifolium* Desg. - Ш. котовниколистная = Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Субкавк\*.); ST(НК); [Sp.]
1658. *M. leonuroides* Desg. - Ш. пустырниковая = СК,П,Кисл(Кавк.); ST,Rb(НК); [Pl.]
1659. *M. peregrinum* L. - Ш. чужеземная = КЕ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Понтич.); ST(НК); [Sp.]
1660. *Sideritis montana* L. - Железница горная = Все р-ны(Общедр.средиз.); ST(T); [Pl.]
1661. *S. comosa*(Rochel ex Benth.)Stank. - Ж. хохлатая = Ст,СК,П,Кисл (Средиземн.); ST(T); [Sp.]
1662. *Nepeta cataria* L. - Котовник кошачий = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Rb(НК); [Sp.] <Pm>
1663. *N. grandiflora* Vieb. - К. крупноцветковый = ЛН,П,Кисл(Кавк.); Pa,Pb(НК); [Sp.]
1664. *N. kubanica* Pojark. - К. кубанский = СК,Кисл(Эвксин.); ST(НК); [R.]
1665. *N. rannonica* L. - К. венгерский = Все р-ны(Палеаркт.); ST(НК); [Pl.]
1666. *N. parviflora* Vieb. - К. мелкоцветковый = МД,АИ,Прик,ТБ,НК,Ст (Понтич.); ST,Rb(НК); [R.]
1667. *Glechoma hederacea* L. - Будра плющевидная = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН, СК,П,Кисл(Палеаркт.); S,Pa(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>
1668. *Dracoscephalum thymiflorum* L. - Змееголовник чебреццветковый = Ст, ЛН,СК(Евро-Сиб.); Rb(T); [R.] <Pmel>
1669. *D. moldavica* L. - З. молдавский = СК,Кисл(Евро-Сиб.); Rb(T); [R.] <Pm;Pmel;Po>
1670. *D. ruyschiana* L. - З. Руйша = Ст,П,Кисл(Палеаркт.); Pb(НК); [Sp.] <Pmel;Po>
1671. *D. austriacum* L. - З. австрийский = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Евро-Кавк.); Pb(НК); [Pl.] <Pmel;Po>
1672. *Lallemantia iberica*(Vieb.)Fisch.et C.A.Meу. - Ляллеманция грузинская = Ст,СК(Средиземн.); ST,Rb(T); [R.] <Pmel>

1673. *Prunella vulgaris* L. - Черноголовка обыкновенная = Все р-ны(Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pm>
1674. *P. laciniata*(L.)L. - Ч. разрезная = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Евро-Кавк.); Pa,Аа(НК); [R.]
1675. *P. grandiflora*(L.)Scholl. - Ч. крупноцветковая = П,Кисл(Европ.); S,Pa(НК); [Sp.]
1676. *Phlomis pungens* Willd. - Зопник колючий = Все р-ны(Субпонт\*.); ST(НК); [Pl.] <Pm>
1677. ★*Ph. majkopensis*(Novopokr.)Grossh. - З. майкопский = Ст(Предкавк.); ST(НК); [R.] l.c. Майкоп <Esub>
1678. *Phlomoides tuberosa*(L.)Moench (*Phlomis tuberosa* L.) - Фломоидес (Зопник) клубненосный = Все р-ны(Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pa;Pm>
1679. *Galeopsis ladanum* L. - Пикульник ладанниковый = Ст,СК,П(Евро-Кавк.); Ra,Rb(T); [R.] <Pmel>
1680. *G. bifida* Boenn. - П. двунадрезанный = Ке,Ст,СК,П(Палеаркт.); S(T); [Sp.] <Pmel>
1681. *Lamium amplexicaule* L. - Яснотка стеблеобъемлющая = Все р-ны (Палеаркт.); Pa,Ra,Rb(T); [Pl.] <Pm>
1682. *L. raczokianum* Worosch. - Я. Пачоского = МД,[Ст(Сенгилеевское оз.),авт.](Субтуран\*.); ST,Rb(T); [Sp.]
1683. *L. maculatum*(L.)L. - Я. пятнистая = Ст,П,Кисл(Европ.); S,Pa(НК); [Sp.] <Pmel>
1684. *L. album* L. - Я. белая = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>
1685. *L. purpureum* L. - Я. пурпурная = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Rb(T); [Pl.] <Pmel>
1686. *Chaiturus marrubiastrum*(L.)Reichenb. - Гривоухвост шандровый = МД,АИ, Ст,ЛН,П(Палеаркт.); Rb(НК); [Sp.]
1687. *Leonurus quinquelobatus* Gilib - Пустырник пятилопастный = Все р-ны (Евро-Сиб.); Rb(НК); [Sp.] <Pm;Pmel>
1688. *L. glaucescens* Bunge - П. сизый = МД,СК(Субтуран\*.); Rb(НК); [R.] <Pmel>
1689. *Molucella laevis* L. - Моллюцелла гладкая = Ке,Ст,СК,П(Зап.др.средиз.); Rb(T); [R.]
1690. *Ballota nigra* L. - Белокудренник чёрный = Все р-ны(Европ.); S,Rb(НК); [Pl.] <Pm>
1691. *Stachys germanica* L. - Чистец германский = Все р-ны(Европ.); S,Pa,Rb(НК); [Sp.] <Pmel>
1692. *S. intermedia* Ait. - Ч. промежуточный = Ст,П,Кисл(Субкавк\*.); Pa,Pb(НК); [Sp.] <Pmel>
1693. *S. balansae* Boiss.et Kotschy - Ч. Балансы = Ст,ЛН,П,Кисл(Субкавк\*.); Pa(НК); [Sp.] <Pmel>



1694. *S. sylvatica* L. - Ч. лесной = КЕ, Прик, ТБ, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Евро-Сиб.); S(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>
1695. *S. palustris* L. - Ч. болотный = Прик, ТБ, НК, Ст, СК, (Палеаркт.); Аа(НК); [R.] <Pmel>
1696. *S. atherocalyx* C.Koch - Ч. острочашечковый = Все р-ны(Субкавказ\*.); Дс(НК); [Sp.] <Pmel>
1697. *S. pubescens* Ten. - Ч. пушистый = П(Субкавказ\*.); Ра, СТ(НК); [R.] <Pmel>
1698. *S. annua*(L.)L. - Ч. однолетний = КЕ, Прик, ТБ, НК, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Евро-Кавк.); Ра, Rb(T); [Sp.] <Pmel>
1699. *Betonica macrantha* C.Koch (*B. grandiflora* Willd.; *Stachys macrantha* (C.Koch) Stearn) - Буквица крупноцветковая = П, Кисл (Ирано-Туран.); Pb(НК); [Pl.] <Po>
1700. *B. officinalis* L. (*S. officinalis*(L.) Trevis; *B. perauca* Klok.) - Б. сильно-расширенная = КЕ, Прик, ТБ, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Палеаркт.); Ра(НК); [Pl.]
1701. *Salvia glutinosa* L. - Шалфей железистый = КЕ, Прик, ТБ, НК, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.] <Pm>
1702. *S. viridis* L. - Ш. зелёный = СК, П(Средиземн.); ST, Rb(T); [R.]
1703. *S. canescens* C.A. Mey. - Ш. седеющий = Кисл (Эукавказ.); Da, Dd(НК); [Sp.] l.c. Кисловодск
1704. *S. aethiops* L. - Ш. эфиопский = Все р-ны(Общедр.средиз.); ST, Da(НК); [Pl.] <Pm>
1705. ★ *S. nutans* L. - Ш. поникающий = КЕ, Прик, ТБ, Ст, СК(Понтич.); ST(НК); [R.] <Po>
1706. *S. kuznetzovii* Sosn. - Ш. Кузнецова = Кисл (Эукавказ.); Da(НК); [Sp.]
1707. *S. tesquicola* Klok. et Pobed. - Ш. сухостепной = Все р-ны(Субтуран\*.); ST(НК); [Pl.] <Pmel>
1708. *S. nemorosa* L. (*S. deserta* Schang.) - Ш. пустынный = КЕ, МД, АИ, НК, Прик, ТБ, М(Туранск.); ST(НК); [R.]
1709. *S. fugax* Pobed. - Ш. опадающий = М, СК(Эукавказ.); ST(НК); [R.] <Rx>
1710. *S. virgata* Jacq. - Ш. лозный = Кисл (Евро-Сиб.); Pb(НК); [R.]
1711. *S. reflexa* Hornem. - Ш. отогнутый = КЕ, МД, АИ, НК, Прик, ТБ, М, Ст, СК (Адвент.[Европа]); Ра, Rb(T); [R.]
1712. *S. verticillata* L. - Ш. мутовчатый = Все р-ны(Понт.-Южносиб.); Ра, Rb(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>
1713. *Ziziphora capitata* L. - Зизифора головчатая = П, Кисл (Субкавказ\*.); Da, Db(T); [R.]
1714. *Melissa officinalis* L. - Мелисса лекарственная = П, Кисл (Общедр.средиз.); Ра(НК); [Sp.] <Pm>
1715. *Satureja hortensis* L. (*Satureja laxiflora* C.Koch) - Чабер садовый = Ст, П(Понтич.); Da, Rb(T); [Sp.] <Pmel>

1716. *S. pachyphylla* C.Koch - Ч. толстолистный = КН(Понтич.); ST(T); [R.] <Rx>
1717. *Calamintha caucasica* Somm.et Levier - Душевик кавказский = Кисл(Кавк.); Da(T); [R.]
1718. *S. grandiflora*(L.)Moench - Д. рупноцветковый = Ст(Евро-Кавк.); S(НК); [R.]
1719. *Clinopodium vulgare* L. - Пахучка обыкновенная = Все р-ны(Евро-Сиб.); S(НК); [Pl.] <Pm>
1720. *Acinos arvensis*(Lam.)Dandy (*A. thymoides* Moench) - Душевка полевая = Все р-ны(Евро-Кавк.); S,Pa(T); [Pl.]
1721. *A. rotundifolius* Pers. (*A. graveolens*(Bieb.)Link) - Д. округлолистная = Все р-ны(Субпонт\*.); ST(T); [Sp.]
1722. *Hyssopus angustifolius* Vieb. - Иссоп узколистный = П(Субкавказ\*.); ST(НК); [R.]
1723. *Origanum vulgare* L. - Душица обыкновенная = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,ST(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>
1724. *Thymus marschallianus* Willd. (*Th. dimorphus* Klok.et Shost.) - Чебрец Маршаллов = Все р-ны(Понт.-Южносиб.); Pa,ST(Ch:sf); [Pl.] <Pm;Pmel>
1725. ★ *Th. pastoralis* Iljin ex Klok. - Ч. пастуший = СК,П,Кисл(Кавк.); ST(Ch:sf); [R.] <Pmel> l.c. Кисловодск
1726. ★ *Th. markhotensis* Maleev - Ч. маркхотский = П(Машук)[Меницкий, 1986],Кисл(Кр.-Новоросс.); Da(Ch:sf); [Rs.] <Pmel> <Rx>
1727. ★ *Th. elisabethae* Klok.et Schost. - Ч. Елизаветы = П(Машук)[гербарий БИН, сборы С.С.Иконникова и Н.П.Литвинова](Эукавк.); ST(Ch:sf); [Rs.]
1728. ★ *Th. pallasianus* H.Br. - Ч. Палласа = Прик(Донская Балка),П,КН(Европ.); Db(Ch:sf); [Rs.] <Pmel> <Rx>
1729. ★ *Th. daghestanicus* Klok.et Shost. (*Th. mashukensis* Klok.) - Ч. дагестанский = Прик(Донская балка, Бешпагир)[Меницкий, 1986],Ст,СК,П(Предкавказ.); Da(Ch:sf); [R.] <Pmel>
1730. ★ *Th. pseudopulegioides* Klok.et Shost. - Ч. ложноблониный = Кисл(Эукавк.); Pb(Ch:sf); [R.] <Esub>
1731. *Lycopus europaeus* L. - Зюзник европейский = Все р-ны(Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.] <Pm>
1732. *L. exaltatus* L.fil. - З. высокий = Все р-ны(Палеаркт.); Aa(НК); [R.]
1733. *Mentha arvensis* L. - Мята полевая = КЕ,Ст,СК,П,Кисл(Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.] <Pm;Pmel>
1734. *M. aquatica* L. - М. водная = НК,П,Кисл(Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.] <Pmel>
1735. *M. caucasica* Gand. (*M. longifolia*(L.)Huds.) - М. кавказская = Все р-ны (Кавк.); Aa(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>
1736. *M. spicata* L. - М. колосовая = Ст,ЛН,СК(Субсредиз\*.); Aa,Rb(НК); [R.]
1737. *M. piperita* L. - М. перечная = Ст,П,Кисл(Адвент.[одичавшее культурное]); Rb(НК); [Sp.] <Pm>

Сем. 137. SOLANACEAE Juss. - ПАСЛЁНОВЫЕ

1738. *Nicandra physaloides*(L.)Gaertn. - Никандра физалисовидная = КЕ,Ст,ЛН, СК,П,Кисл(Адвент.[Южн.Америка]); Rb(T); [R.]
1739. *Lycium barbarum* L. - Дерева бородачатая = МД,АИ,Прик,ТБ,НК,Ст (Адвент. [Сев.Африка,Иран]); Rb(Ch); [Sp.]
1740. ★ ★ *Atropa caucasica* Kreyer - Красавка кавказская = П,Кисл(Субкавк.); S(НК); [R.] <Pm;Pt>
1741. ★ *Physochlaina orientalis*(Bieb.)G.Don fil. - Пузырница восточная = П,Кисл (Субкавк\*.); Pb(НК); [Sp.] <Pt> l.c. Кисловодск
1742. *Hyoscyamus niger* L. (*H. bohemicus* F.W.Schmidt) - Белена чёрная = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm;Pt>
1743. *Physalis alkekengi* L. - Физалис обыкновенный = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН, СК,П,Кисл(Европ.); S,Rb(НК); [Pl.] <Pa;Pm;Po>
1744. *Solanum nigrum* L. - Паслён чёрный = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(T); [Pl.] <Pa;Pt;Pm>
1745. *S. schultesii* Opiz (*S. decipiens* Opiz) - П. Шультеца = СК(Евро-Кавк.); Rb(T); [R.] <Pt>
1746. *S. villosum* Mill. (*S. luteum* Mill.) - П. мохнатый = Ст(Субсредиз\*.); Rb(T); [R.] <Pt>
1747. *S. pseudopersicum* Pojark. - П. ложноперсидский = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН, СК,П,Кисл(Субкавк\*.); S,Rb(Ch:sf:lh); [Pl.] l.c. Машук <Pt;Pm>
1748. *S. persicum* Willd.ex Roem. - П. персидский = КН(Армено-Иран.); Аа(Ch); [Sp.]
1749. *S. cornutum* Lam. (*S. rostratum* Dun.) - П. рогатый = КЕ,Прик,ТБ,НК,М,Ст, ЛН,КН(Адвент.[Сев.Америка]); Ra,Rb(T); [Sp.] <Pt>
1750. *Datura stramonium* L. - Дурман обыкновенный = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(T); [Sp.] <Pm;Pt>

Сем. 138. SCROPHULARIACEAE Juss. - НОРИЧНИКОВЫЕ

1751. *Verbascum phlomoides* L. - Коровяк лекарственный = КЕ,Ст(Европ.); Pa(НК:pb); [Sp.] <Pm>
1752. *V. densiflorus* Bertol. (*V. thapsiforme* Schrad.) - К. редкоцветковый = Ст(Европ.); ST(НК); [R.] <Pm>
1753. *V. thapsus* L. - К. обыкновенный = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.); Rb(НК); [Pl.] <Pm>
1754. *V. lychnitis* L. - К. мучнистый = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Европ.); Pa(НК); [Sp.]
1755. *V. marschallianum* Ivanina et Tzvel. (*V. austriacum* Schott; *V. orientale* Bieb.) - К. Маршалла = Ст(Субтуран\*.); Pa(НК); [R.] <Rx>

1756. *V. laxum* Filar. et Jav. - К. раскидистый = Все р-ны(Кавк.); Ра(НК); [Pl.]
1757. *V. nigrum* L. - К. чёрный = Ст(Ставрополь)[Гроссгейм, 1967](Палеаркт.); Ра(НК); [Rs.] <Rg>
1758. *V. ovalifolium* Donn ex Sims - К. овальнолистный = Ке,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,КН(Понтич.); ST,Db(НК); [R.]
1759. *V. pyramidatum* Vieb. - К. пирамидальный = Ке,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Субкавказ\*.); Ра(НК); [Pl.]
1760. *V. blattaria* L. - К. тараканий = Ке,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,КН(Палеаркт.); Ра(НК:pb); [Sp.] <Pm>
1761. *V. phoeniceum* L. - К. фиолетовый = Все р-ны(Понт.-Южносиб.); Ра(НК); [Pl.]
1762. *Linaria vulgaris* Mill. - Льянка обыкновенная = Все р-ны(Европ.); Ра,Rb(НК); [Sp.] <Pm>
1763. *L. biebersteinii* Bess. - Л. Биберштейна = Ке,Прик,ТБ,НК,М,Ст,СК(Понтич.); Ра(НК); [Sp.]
1764. *L. ruthenica* Blonski - Л. русская = Ке,МД,АИ,Прик,ТБ,НК(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [R.]
1765. *L. macroura*(Vieb.)Vieb. - Л. крупнохвостая = Ке,МД,АИ(Понтич.); ST,Db(НК); [R.]
1766. *L. incompleta* Kurpian. - Л. неполноцветковая = Все р-ны(Туранск.); ST,Db(НК); [Sp.]
1767. *L. odora*(Vieb.)Fisch. - Л. душистая = НК(Понтич.); Db(НК); [R.]
1768. *L. genistifolia*(L.)Mill. (*L. pontica* Kurpian.) - Л. дреколистная = Ке,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,СК(Кавк.); Ра(НК); [Pl.]
1769. *L. caucasigena* Kem.-Nath. - Л. кавказская = Кисл(Кавк.); Pb(НК); [R.]
1770. *Chaenorhinum minus*(L.)Lange (*Ch. viscidum*(Moench)Simonk) - Хеноринум малый = П,Кисл(Евро-Кавк.); Da(T); [R.]
1771. ★ *Scrophularia lateriflora* Trautv. - Норичник бокоцветный = Ст(Кавк.); Da(НК); [R.] <Rg>
1772. *S. scopolii* Норре ex Pers. - Н. Скополи = Ст,П,Кисл(Общедр.средиз.); S(НК); [R.]
1773. *S. divaricata* Ledeb. - Н. растопыренный = Ст,ЛН,П,Кисл(Кавк.); S(НК); [Sp.]
1774. *S. mollis* Somm. et Levier - Н. мягкий = Ст,П,Кисл(Эукавказ.); Da(НК); [R.]
1775. *S. nodosa* L. - Н. узловатый = Все р-ны(Панбор.); S,Аа(НК); [R.] <Pm;Pmel>
1776. *S. umbrosa* Dumort. (*S. alata* Gilib. nom. invalid.) - Н. теневой = Ст,СК,П,Кисл(Палеаркт.); S(НК); [Sp.]
1777. *S. variegata* Vieb. - Н. пёстрый = П,Кисл(Субкавказ\*.); Da(НК); [Pl.]
1778. *S. rupestris* Vieb. ex Willd. - Н. скальный = СК,П,Кисл(Субкавказ\*.); Da(НК); [Pl.]

1779. *Dodartia orientalis* L. - Додарция восточная = МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М, СК,КН(Ирано-Туран.); Db,Dd(НК); [Sp.]
1780. *Gratiola officinalis* L. - Авран лекарственный = Ст(Голаркт.); Аа(Т); [Rs.] <Pm>
1781. *Veronica spicata* L. - Вероника колосистая = Все р-ны(Палеаркт.); ST(НК); [Sp.]
1782. *V. orchidea* Crantz - В. орхидная = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Европ.); Ра(НК); [Sp.]
1783. *V. spuria* L. - В. ненастоящая = Ст,СК,П(Евро-Сиб.); Аа(НК); [R.]
1784. *V. longifolia* L. - В. длиннолистная = Ст,ЛН,СК,П(Палеаркт.); Аа(НК); [R.]
1785. *V. gentianoides* Vahl - В. горечавковая = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Кавк.); Ра(НК); [Pl.]
1786. *V. serpyllifolia* L. - В. тимьянолистная = НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Палеаркт.); Аа(НК); [Sp.]
1787. *V. monticola* Trautv. - В. горная = П,Кисл(Кавк.); Pb(НК); [R.] <Rg>
1788. *V. anagallis-aquatica* L. - В. ключевая = Все р-ны(Палеаркт.); Аа,Ab(К); [Pl.] <Pm>
1789. *V. anagalloides* Guss. - М. ложноключевая = П(Общедр.средиз.); Аа(НК); [R.]
1790. *V. beccabunga* L. - В. поточная = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Палеаркт.); Аа(НК); [Sp.] <Pm>
1791. *V. officinalis* L. - В. лекарственная = Кисл(Евро-Сиб.); S(НК); [R.] <Pm>
1792. *V. magna* M.Fisch. (*V. melissifolia* Desf.ex Poir.) - В. большая = Ст,П,Кисл(Субкавк\*.); S(НК); [Sp.]
1793. *V. peduncularis* Vieb. - В. цветоножковая = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Субкавк\*.); S(НК); [Pl.]
1794. *V. umbrosa* Vieb. - В. теневая = П,Кисл(Субкавк\*.); S(НК); [Sp.]
1795. *V. chamaedrys* L. - В. дубравная = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.); S,Ра(НК); [Pl.] <Pm>
1796. *V. caucasica* Vieb. - В. кавказская = П,Кисл(Кавк.); Pb(НК); [Pl.]
1797. *V. scutellata* L. - В. щитковая = Ст(Палеаркт.); Аа,Ab(НК); [R.]
1798. *V. teucrium* L. - В. широколистная = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Палеаркт.); S,Ра(НК); [Pl.] <Pm>
1799. *V. prostrata* L. - В. простёртая = КЕ(Кубань),П,Кисл(Палеаркт.); Ра,ST(НК); [R.]
1800. *V. jacquinii* Baumg (*V. austriaca* L.) - В. Жаквина = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН, СК,П,Кисл(Субкавк\*.); ST(НК); [Sp.]
1801. *V. multifida* L. - В. многораздельная = Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Субтуран\*.); ST,Da(НК); [Sp.]

1802. *V. orientalis* Mill. - В. восточная = Ст,П,Кисл(Субкавказ\*.); ST, Da(НК); [R.] <Pp>
1803. *V. ceratocarpa* C.A. Mey. - В. рогоплодная = СК(Кума)(Субкавказ\*.); Pa(T); [R.] <Rg>
1804. *V. arvensis* L. - В. полевая = Все р-ны(Палеаркт.); ST, Ra(T); [Sp.]
1805. *V. verna* L. - В. весенняя = Все р-ны(Палеаркт.); ST, Db(НК); [Sp.]
1806. *V. dillenii* Crantz - В. Дилленя = Ст,ЛН,П,Кисл(Палеаркт.); ST, Da(НК); [Sp.]
1807. *V. hederifolia* L. - В. плющелистная = Прик, ТБ, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Палеаркт.); Ra, Rb(T); [Pl.]
1808. *V. triphyllus* L. - В. трёхлистная = КЕ, Прик, ТБ, НК, М, Ст, СК, ЛН (Зап. др. средиз.); ST(T); [Sp.]
1809. *V. praecox* All. - В. ранняя = Все р-ны(Средиземн.); ST(T); [Sp.]
1810. *V. polita* Fries (*V. didyma* Ten.) - В. изящная = Все р-ны(Палеаркт.); Ra, Rb(T); [Pl.]
1811. *V. persica* Poir. - В. персидская = Все р-ны(Общедр. средиз.); Ra, Rb(T); [Pl.]
1812. *V. filiformis* Smith - В. нитевидная = Все р-ны(Субкавказ\*.); S, Pa(T); [Sp.]
1813. *Melampyrum elatius* (Boiss.) Soo - Марьяник высокий = П, Кисл(Эвксин.); Pb(N:hpar); [Sp.]
1814. *M. arvense* L. - М. полевой = Все р-ны(Европ.); Pa(T:hpar); [Pl.] <Pmel>
1815. *M. argyrocotum* (Fisch. ex Ledeb.) K.-Pol. - М. серебристоохотлатый = Ст, П (Европ.) [Попова, 1980]; Pa(T:hpar); [R.]
1816. *Euphrasia pectinata* Ten. (*Euphrasia tatarica* Fisch. ex Spreng.) - Очанка гребенчатая = КЕ, Прик, ТБ, Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Палеаркт.); Pa(T:hpar); [Pl.]
1817. *E. hirtella* Jord. ex Rent. - О. волосистенькая = Ст, Кисл [Галушко, 1980] (Палеаркт.); Pb(T:hpar); [Sp.]
1818. *E. petiolaris* Wettst. - О. черешковая = Кисл(Кавк.); Pb(T:hpar); [Sp.]
1819. *Orphanthella lutea* (L.) Rauschert (*Orphantha lutea* (L.) A. Kerner ex Wettst.) - Органта жёлтая = Ст, П, Кисл(Понтич.); Pa(T:hpar); [R.]
1820. *Odontites vulgaris* Moench (*O. rubra* (Baumg.) Opiz; *O. serotina* (Lam.) Dumort.) - Зубчатка обыкновенная = Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Палеаркт.); Pa, Rb(T); [Sp.]
1821. *Rhinanthus minor* L. - Погремок малый = Кисл(Евро-Сиб.); Pb(T:hpar); [Pl.]
1822. *R. vernalis* (N. Zing.) Schischk. et Serg. (*R. aestivalis* (N. Zing.) Schischk. et Serg.) - П. весенний = Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Евро-Сиб.); Pa(T:hpar); [Pl.]
1823. *Rh. subulatus* (Chabert) Soo - П. шиловидный = П, Кисл(Кавк.); Pa, ST(T:hpar); [Sp.]
1824. *Rhynchocorys orientalis* (L.) Benth. - Хоботник восточный = Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Кавк.); Pb(T); [Sp.]
1825. ★ *Pedicularis willhelmsiana* Fisch. ex Vieb. - Мытник Вильгельмса = П, Кисл (Субкавказ\*.); Pb(НК:hpar); [Sp.] <Rg> l.c. Бештау

1826. ★ *P. palustris* L. - М. болотный = Кисл(Кисловодск)(Евро-Сиб.); Аа(Т:par); <Rg>
1827. *P. kaufmannii* Pinzg. - М. Кауфмана = КЕ, Прик, ТБ, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Понт.-Южносиб.); Ра(НК:par); [Pl.]
1828. *Lathraea squamaria* L. - Петров крест чешуйчатый = Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Палеаркт.); S(НК:par); [Pl.]

Сем. 139. MARTYNIACEAE Stapf - МАРТИНИЕВЫЕ

1829. *Proboscidea louisiana*(Mill.)Thell. - Пробосцидея луизианская = КЕ, Ст (Адвент.[Сев.Америка]); Ra, Rb(Т); [R.]

Сем. 140. OROBANCHACEAE Vent. - ЗАРАЗИХОВЫЕ

1830. ★ *Diphelipaea coccinea*(Bieb.)Nocolson (*Phelipaea coccinea*(Bieb.) Poir.) - Дифелипея красная = КЕ, Прик, ТБ, НК, Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Субкавказ\*.); Ра(К:par); [Sp.]
1831. *Phelipanche ramosa*(L.)Pomel (*Orobanche ramosa* L.) - Фелипанхе (Заразиха) ветвистая = Все р-ны(Субсредиз\*.); Ра(Т:par); [Sp.] <Pm>
1832. *Ph. dalmatica*(G.Beck)Sojak (*O. dalmatica*(G.Beck)Tzvel.) - Ф.(З.) далматская = П(Эвксин.); Ра(Т:par); [R.]
1833. *Ph. mutelii*(F.Schultz)Czer. (*O. mutelii* F.Schultz) - Ф.(З.) Мутеля = П (Зап.др.средиз.); Ра(Т:par); [Sp.]
1834. *Ph. laevis*(L.)Holub (*O. arenaria* Borkh) - Ф.(З.) гладкая = Ст, СК, П(Понт.-Южносиб.); ST(Т:par); [R.]
1835. *Ph. lanuginosa*(C.A.Mey.)Holub (*O. lanuginosa*(C.A.Mey.)Greuter et Burdet; *O. caesia* Reichenb.) - Ф.(З.) голубая = КЕ, Ст, СК, П, Кисл(Палеаркт.); ST(Т:par); [Sp.]
1836. *Ph. purpurea*(Jacq.)Sojak (*O. purpurea* Jacq.) - Ф.(З.) пурпуровая = КЕ, Прик, ТБ, Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Палеаркт.); Ра(Т:par); [Sp.]
1837. *Orobanche coerulescens* Steph. - Заразиха синеватая = Все р-ны(Палеаркт.); ST(Т:par); [Sp.]
1838. *O. cernua* Loefl. - З. поникшая = Все р-ны(Зап.др.средиз.); Ра, Ra(Т:par); [Sp.]
1839. *O. cumanica* Wallr. - З. подсолнечниковая = Все р-ны(Палеаркт.); Ра, Rb(Т:par); [Sp.]
1840. *O. picridis* F.Schultz - З. горчачковая = Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Евро-Кавк.); S(Т:par); [R.]
1841. *O. alba* Steph. - З. белая = Ст, П, Кисл(Зап.др.средиз.); Ра(Т:par); [Pl.]
1842. *O. reticulata* Wallr. - З. сетчатая = Кисл(Палеаркт.); Ра(Т:par); [R.]
1843. *O. raddeana* G.Beck - З. Радде = П, Кисл(Субкавказ\*.); Pb(Т:par); [Sp.]

1844. *O. crenata* Forrsk. (*O. owerinii*(*G.Beck*)*G.Beck*) - З. Оверина = Все р-ны (Субкавказ\*.); S,Pa(T:par); [Sp.]
1845. *O. gamosepala* Reut. - З. сrostнoчaшeлиcтннкoвaя = П,Кисл(Кавк); Pa,Pb(T:par); [Sp.] л.с. Машук
1846. *O. lutea* Baumg. - З. жёлтая = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.); Pa(T:par); [Sp.]
1847. *O. caryophyllacea* Smith (*O. vulgaris* Poir.) - З. гвоздичная = Все р-ны (Зап.др.средиз.); Pa,ST(T:par); [Sp.]
1848. *O. elatior* Sutt. (*O. major* L. *p.p.nom.abig.*) - З. высокая = Все р-ны (Палеаркт.); ST(T:par); [R.]
1849. *O. alsatica* Kirschl. - З. эльзасская = СК,П,Кисл(Палеаркт.); Pa(T:par); [Pl.]
1850. *O. inulae* Novopokr.et Abramov - З. девясиловая = П,Кисл(Кавк.); Pb(T:par); [Sp.]
1851. *O. gracilis* Smith. - З. тонкая = Кисл(Палеаркт.); Pa(T:par); [R.]
1852. *O. colorata* С.Кoch - З. покрашенная = Ст,П(Субкавказ\*.); S(T:par); [R.]

Сем. 141. LENTIBULARIACEAE Rich. - ПУЗЫРЧАТКОВЫЕ

1853. ★ *Utricularia vulgaris* L. - Пузырчатка обыкновенная = МД,НК,М,Ст, (Голаркт.); Ac(T); [R.] <Pi><Rg>

Сем. 142. GLOBULARIACEAE DC. - ШАРОВНИЦЕВЫЕ

1854. ★ ★ *Globularia punctata* Lapeyr. (*G. elongata* Hegetschw.) - Шаровница пятнистая = Прик,Ст(Зап.др.средиз.); Db(НК); [Rs.] <Rx>

Сем. 143. PLANTAGINACEAE Juss. - ПОДОРОЖНИКОВЫЕ

1855. *Plantago major* L. - Подорожник большой = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm>
1856. *P. tenuiflora* Waldst.et Kit. - П. тонкоколосый = МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М (Палеаркт.); Db,Dc(НК); [Sp.]
1857. *P. cornuti* Gouan - П. Корнута = МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,КН(Палеаркт.); Dc(НК); [R.]
1858. *P. media* L. - П. средний = Все р-ны(Палеаркт.); Pa(НК); [Pl.] <Pm>
1859. *P. urvillei* Opiz (*P. stepposa* Kuprian.) - П. Урвиля = Все р-ны(Понт.-Южносиб.); ST,Rb(НК); [Sp.]
1860. *P. maxima* Juss.ex Jacq. - П. крупный = МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,ЛН,СК (Евро-Сиб.); Dc(НК); [R.]
1861. *P. salsa* Pall. - П. солончаковый = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,КН (Плюрирег.); Dc(НК); [Sp.]
1862. *P. lanceolata* L. - П. ланцетолистный = Все р-ны(Плюрирег.); ST(НК); [Pl.] <Pm>



1863. *Psyllium scabrum*(Moench)Holub (*Plantago indica* L. ; *P. arenaria* Waldst.et Kit.) - Псилиум шершавый = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,КН (Общедр.редиз.); Db(Т); [Pl.]

Сем. 144. RUBIACEAE Juss. - МАРЕНОВЫЕ

1864. *Crucianella angustifolia* L. - Крестовница узколистная = П,СК(Средиземн.); Da(Т); [R.]

1865. *Asperula molluginoides*(Bieb.)Reichenb. (*Crucianella molluginoides* Bieb.) - Ясменник моллюгообразный = П,Кисл(Субкавк\*); Pa(НК); [Sp.] l.c. Кисловодск

1866. *A. stevenii* V.Krecz. - Я. Стевена = КЕ,[ТБ,НК,КН: Михеев, 1992],Ст (Предкавк); Da(НК); [R.] l.c. Ставрополь

1867. *A. biebersteinii* V.Krecz. - Я. Биберштейна = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,КН [Михеев, 1992],П,Кисл(Предкавк.); Db(НК); [Sp.] l.c. Пятигорск

1868. *A. pedicellata* Klok. - Я. опушённоцветковый = П,Кисл(Предкавк.); Db(НК); [R.] l.c. Бештау

1869. *A. graveolens* Bieb.ex Schult.et Schult.fil. - Я. пахучий = НК,КН[Михеев, 1992](Понтич.); Db(Ch:sf); [R.]

1870. *A. diminuta* Klok. - Я. уменьшенный = МД,АИ,НК,М,КН(Предкавк.); Db(НК); [Sp.]

1871. *A. caucasica* Pobed. (*A. taurina* subsp. *caucasica*(Pobed.)Ehrend.) - Я. кавказский = Ст(Субкавк\*.); S(НК); [R.] <Rg>

1872. *A. arvensis* L. - Я. полевой = КЕ,М,СК,П(Средиземн.); Pa(Т); [Sp.]

1873. *Galium rubioides* L. (*G. articulatum* Lam.) - Подмаренник членистый = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Европ.); S,Pa,Аа(НК); [Sp.]

1874. *G. valantioides* Bieb. - П. валантиевидный = П,Кисл(Кавк.); Da(НК); [Pl.] l.c. Кисловодск

1875. *G. odoratum*(L.)Scor.(*Asperula odorata* L.) - П. душистый = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.); S(НК); [Pl.] <Pm>

1876. *G. rivale*(Smith)Griseb.(*Asperula rivalis* Sibth.et Smith) - П. ручейный = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Европ.); Pa(НК); [Sp.]

1877. *G. uliginosum* L. - П. топяной = Ст(Евро-Сиб.); Аа(НК); [R.] <Rg>

1878. *G. saturejifolium* Trev. - П. чаберолистный = КН[Михеев, 1992](Туранск.); Pa(НК); [R.]

1879. *G. humifusum* Bieb. (*Asperula humifusa*(Bieb.)Bess.) - П. распростёртый = Все р-ны(Вост.др.средиз.); ST,Rb(НК); [Pl.]

1880. *G. verum* L. - П. весенний = Все р-ны(Субсредиз\*.); ST(НК); [Pl.] <Pm>

1881. *G. ruthenicum* Willd. - П. русский = Все р-ны(Понт.-Южносиб.); Pa,ST(НК); [Pl.]

1882. *G. mollugo* L. - П. мягкий = Ст(Голаркт.); Pa,Аа(НК); [R.] <Rg>

1883. *G. album* Mill. (*Galium erectum* Huds.) - П. белый = [КЕ,МД,АИ,НК, Прик,ТБ,М: Михеев, 1992](Субсредиз\*.); S(НК); [R.]
1884. *G. flaviflorum*(Trautv.)A.D.Mikheev(*G. aureum* Vis.) - П. золотистый = Ст,П,Кисл(Субкавказ\*.); Pa, Da(НК); [Sp.]
1885. *G. biebersteinii* Ehrend. (*Asperula galioides* Bieb.) - П. Биберштейна = Ст,П,Кисл[КН: Михеев, 1992](Понтич.); ST(НК); [Pl.]
1886. *G. octonarium*(Klok.)Soo (*A. octonaria* Klok.) - П. восьмилистный = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,Ст,СК(Субтуран\*.); ST(НК); [Sp.]
1887. *G. aparine* L. (*Galium spurium* L.) - П. цепкий = Все р-ны(Голаркт.); Pa, Ra, Rb(T); [Sp.] <Pm>
1888. *G. tricornutum* Dandy (*G. rticorne* Stokes) - П. трёхрогий = Все р-ны (Палеаркт.); Ra, Rb(T); [Sp.]
1889. *G. tenuissimum* Vieb. - П. тончайший = [КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М: Михеев, 1992],Ст,П,Кисл(Субтуран\*.); Pa, ST(T); [Sp.]
1890. *G. verticillatum* Danth - П. мутовчатый = П,Кисл(Субсредиз\*.); Da(T); [R.]
1891. *Cruciata glabra*(L.)Ehrend. - Круциата голая = Ст,П,Кисл(Палеаркт.); Pa, Pb(НК); [Pl.]
1892. *C. laevipes* Opiz (*Galium cruciata*(L.)Scop.) - К. гладенькая = Все р-ны (Зап.др.средиз.); Pa(НК); [Pl.] <Pm>
1893. *C. pedemontana*(Bell.)Ehrend. - К. пьемонтская = КЕ,Прик,ТБ, Ст,ЛН, СК,П,Кисл(Зап.др.средиз.); ST(T); [R.]
1894. *C. taurica*(Pall.ex Willd.)Soo - К. крымская = Кисл(Кр.-Новоросс.); Da(НК); [Sp.]
1895. *Rubia tinctorium* L. (*R. iberica*(Fisch.ex DC.)C.Koch) - Марена красильная = НК,М,Ст,СК,КН(Общедр.средиз.); Aa(НК); [R.]
1896. *R. tatarica*(Trev.)Fr. (*Galium tataricum* Trev.) - М. татарская [ТБ,НК,КН: Михеев, 1992],П(Понт.-Южносиб.); Pa, Aa(НК); [R.]

#### Сем. 145. SAMBUCACEAE Batsch ex Borkh - БУЗИНОВЫЕ

1897. *Sambucus nigra* L. - Бузина чёрная = Все р-ны(Европ.); S, Rb(Phn); [Pl.] <Pm; Pa>
1898. *S. ebulus* L. - Б. травянистая = Все р-ны(Зап.др.средиз.); S, Rb(НК); [Sp.] <Pt; Pm>

#### Сем. 146. VIBURNACEAE Rafin. - КАЛИНОВЫЕ

1899. *Viburnum lantana* L. - Калина гордовина = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Субсредиз\*.); S(Phn); [Pl.]
1900. *V. opulus* L. - К. обыкновенная = Все р-ны(Палеаркт.); S(Phn); [Pl.] <Pm; Pa; Pmel>

Сем. 147. CAPRIFOLIACEAE Juss. - ЖИМОЛОСТНЫЕ

1901. *Lonicera caprifolium* L. - Жимолость каприфоль = КЕ, Прик, ТБ, НК, Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Субкавказ\*.); S(Ch:ll); [Pl.] <Po;Pm;Pmel>  
1902. *L. orientalis* Lam. (*L. caucasica* Pall.) - Ж. восточная = П, Кисл(Кавк.); S(Phn); [Pl.] <Pmel>  
1903. *L. steveniana* Fisch.ex Pojark. - Ж. Стевена = П, Кисл(Кавк.); S(Phn); [Pl.] <Pmel>

Сем. 148. VALERIANACEAE Batsch - ВАЛЕРИАНОВЫЕ

1904. *Valeriana tuberosa* L. - Валериана клубненосная = Ст, СК, П(Субтуран\*.); Pa(НК); [Sp.]  
1905. *V. alliariifolia* Adams - В. чесночницелистная = П, Кисл(Кавк.-Эвкс.); Pb(НК); [Sp.]  
1906. *V. tiliifolia* Troitzk. - В. липолистная = Кисл(Эукавказ.); Pb(НК); [Sp.]  
1907. *V. cardamines* Bieb. - В. сердечниковая = П, Кисл(Эукавказ.); Pb, Db(НК); [Sp.]  
1908. *V. grossheimii* Worosch. (*V. officinalis* L.) - В. Гроссгейма (лекарственная) = Все р-ны (Евро-Сиб.); S, Pa(НК); [Pl.] <Pm>  
1909. *Valerianella locusta*(L.) Laterrade - Валерианица колосковая = Все р-ны (Субсредиз\*.); ST, Rb(T); [Sp.]  
1910. *V. turgida*(Stev.) Betcke - В. вздутая = Все р-ны(Понтич.); Db, Rb(T); [R.]  
1911. *V. carinata* Loisel. - В. килеватая = Все р-ны(Субсредиз\*.); Ra, Rb(T); [Pl.]  
1912. *V. dentata*(L.) Poll. - В. зубчатая = Все р-ны(Зап.др.средиз.); Pa, Rb(T); [Pl.]  
1913. *V. muricata*(Stev.ex Bieb.) J.W.Loud. - В. мягкоигольчатая = НК(Общедр.средиз.); Ra, Rb(T); [R.]  
1914. *V. ramosa* Bast. - В. щелистая = Все р-ны(Субсредиз\*.); Pa, Ra, Rb(T); [R.]  
1915. *V. pumila*(L.) DC. - В. маленькая = КЕ, Ст, СК, КН(Зап.др.средиз.); ST, Db, Rb(T); [Sp.]  
1916. *V. coronata*(L.) DC. - В. увенчанная = Все р-ны(Зап.др.средиз.); ST, Rb(T); [Sp.]  
1917. *V. lasiocarpa*(Stev.) Betcke - В. пушистоплодная = КЕ, МД, АИ, Прик, ТБ, М, Ст, СК, КН(Субпонт\*.); Da(T); [R.]

Сем. 149. DIPSACACEAE Juss. - ВОРСЯНКОВЫЕ

1918. *Knautia arvensis*(L.) Coult. - Короставник полевой = Все р-ны(Евро-Сиб.); Pa(НК); [Pl.] <Pm>  
1919. *K. montana*(Bieb.) DC. - К. горный = КЕ, Прик, ТБ, Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Кавк.); S, Pa(НК:pb); [Sp.] I.c. Кисловодск  
1920. *K. involucrata* Somm.et Levier - К. крупнообёртковый = П, Кисл(Кавк.); Pb(НК:pb); [Sp.]

1921. *Dipsacus laciniatus* L. - Ворсянка разрезная = П,Кисл(Зап.др.средиз.); S,Pa,Aa(НК) [Sp.] <Po>
1922. *D. gmelinii* Bieb. - В. Гмелина = НК,КН(Субтуран\*.); Aa(НК:pb); [R.] <Po>
1923. *D. pilosus* L. - В. волосистая = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Евро-Кавк.); S,Pa(НК); [Sp.]
1924. *D. strigosum* Willd.ex Roem.et Schult. - В. щетинистая = Все р-ны (Субпонт\*.); S,Aa(НК); [Sp.] <Po>
1925. *Sephalaria uralensis*(Murr.)Schrad.ex Roem.et Schult. - Головчатка уральская = КЕ,Ст(Понт.-Южносиб.); Da(НК); [R.]
1926. *S. transsylvanica*(L.)Schrad.ex Roem.et Schult. - Г. трансильванская = Ст,СК,П(Субпонт\*.); Pa(T); [Sp.]
1927. *S. gigantea*(Ledeb.)Bobr. - Г. гигантская = Ст,П,Кисл(Кавк.); Pb(НК); [Pl.]
1928. *S. litvinovii* Bobr. - Г. Литвинова = Ст[Меницкий, 1992](Понтич.); Pb(НК); [R.]
1929. ★*S. coriacea*(Willd.)Steud. - Г. кожистая = П,Кисл(Кр.-Новоросс); Da(НК); [Sp.]
1930. *S. microdonta* Bobr. - Г. мелкозубцовая = Ст,СК(Кавк.); Pa(T); [R.]
1931. *Succisa pratensis* Moench - Сивец луговой = Кисл(Евро-Сиб.); Aa(НК); [R.] <Pm;Pmel>
1932. ★*Scabiosa isetensis* L. - Скабиоза исетская = КЕ,Прик,Ст(Субтуран\*.); Da,Db(НК); [R.] <Pmel> <Rx>
1933. *S. ucranica* L. - С. украинская = Все р-ны(Понтич.); Da(НК:pb); [Pl.] <Pmel>
1934. *S. ochroleuca* L. - С. бледно-жёлтая = Все р-ны(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Sp.] <Pmel>
1935. *S. bipinnata* C.Koch - С. дваждыперистая = П,Кисл(Кавк.); Pa(НК); [Pl.] <Pmel>
1936. *S. caucasica* Bieb. - С. кавказская = П,Кисл(Кавк.); Pb(НК); [Sp.] l.c. Кисловодск <Po;Pmel>
1937. ★*S. rotata* Bieb. - С. колесовидная = Ст(Ставрополь)(Армено-Иран.); ST(T); [Rs.] <Pmel;Rx>
1938. ★*S. micrantha* Desf. - С. мелкоцветковая = Ст(Армено-Иран.); ST(T); [R.] <Pmel;Rx>

Сем. 150. CUCURBITACEAE Juss. - ТЫКВЕННЫЕ

1939. *Echinocystis lobata*(Michx.)Torr.et Gray - Пузыреплодник лопастнолистный = Ст(Адвент.[Сев.Америка]); Rb(T); [R.]
1940. *Bryonia alba* L. - Переступень белый = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Палеаркт.); Rb(К:lh); <Pm;Pt>
1941. *B. dioica* Jacq. - П. двудомный = КЕ,МД,АИ,НК,М,Ст(Палеаркт.); Rb(К:lh); [R.] <Pm;Pt>

1942. *Escballium elaterium*(L.)A.Rich. - Бешеный огурец обыкновенный = М  
(Зап.др.средиз.); Rb(НК); [R.] <Pm>

Сем. 151. CAMPANULACEAE Juss. - КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ

1943. *Campanula praealta* Galushko (*C. elatior*(Fomin)*Grossh.*) - Колокольчик  
очень-высокий = Все р-ны(Понтич.); Pa(НК); [Pl.]

1944. *C. taurica* Juz. - К. крымский = П,Кисл(Понтич.); Db(НК); [Sp.]

1945. *C. latifolia* L. - К. широколистный = П,Кисл(Европ.); S,Pb(НК); [Sp.] <Po>

1946. *C. rapunculoides* L. - К. рапунцелевидный = Ке,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл  
(Евро-Сиб.); S,Pa(НК); [Pl.]

1947. *C. cordifolia* C.Koch - К. сердцелистный = П,Кисл(Субкавказ\*.); S,Pb(НК);  
[Sp.]

1948. *C. bononiensis* L. - К. болонский = Ке,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Евро-  
Сиб.); S(НК); [Sp.]

1949. *C. trautvetteri* Grossh.ex Fed. - К. Траутфеттера = Ке,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,  
П,Кисл(Кавк.); Pa(НК); [Pl.]

1950. *C. oblongifolioides* Galushko - К. продолговатолистный = Кисл(Кавк.);  
ST(НК); [Sp.]

1951. *C. alliariiifolia* Willd. (*C. ochroleuca* Kem.Nath.) - К. чесночницелистный =  
П,Кисл(Субкавказ\*.); Da(НК); [Sp.]

1952. *C. ochroleuca* Kem.-Nath. - К. бледно-жёлтый = Кисл(Кавк.); Pb(НК); [Sp.]

1953. *C. sarmatica* Ker-Gawl. - К. сарматский = П,Кисл(Эукавказ.); Db(НК); [Sp.]

1954. *C. collina* Sims. - К. холмливой = Кисл(Палеаркт.); Pb(НК); [Sp.]

1955. *C. hohenackeri* Fisch.et C.A.Meу. - К. Гогенакера = Кисл(Кавк.); ST(НК);  
[Sp.]

1956. *C. biebersteiniana* Schult. (*C. tridens* Rupr.) - К. Биберштейна = Кисл(г.

Кабан, гербарий СГУ, сборы Шильникова Д., 2001 г.) (Эукавказ.); Pс(НК); [R.]

1957. ★*C. saxifraga* Vieb. - К. камнеломка = П(Бештау),Кисл(Эукавказ.); Pb(НК);  
[R.] <Rg>

1958. *C. rapunculus* L. - К. рапунцель = Ке,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Европ.);  
S,Rb(НК:pb); [R.]

1959. *C. lambertiana* A.DC. - К. Ламберта = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Субкавказ\*.);  
S,Pa(НК); [R.]

1960. ★*C. persicifolia* L. - К. персиколистный = Ст(Ставрополь)(Европ.);  
S,Pa(НК); [R.] <Rg;Po>

1961. *C. stevenii* Vieb. - К. Стевена = П,Кисл(Субкавказ\*.); Pb(НК); [R.]

1962. *C. ciliata* Stev. - К. реснитчатый = Кисл(Кавк.); Pb(НК); [Pl.]

1963. *Symphyandra pendula*(Vieb.)A.DC. (*Campanula pendula* Vieb.) - Зимфиандра  
повислая = П,Кисл(Эукавказ.); Db(НК); [Pl.] <Rt> l.c. Железноводск

1964. *Asyneuma campanuloides*(Bieb.ex Sims)Bornm. - Азинеума колокольчиковая = П,Кисл(Кавк.); Pb(НК); l.c. Бештау и Кисловодск

Сем. 152. ASTERACEAE Dumort. - АСТРОВЫЕ(СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ)

1965. *Eupatorium cannabinum* L. - Посконник коноплевидный = Все р-ны (Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.] <Pm.>

1966. *Solidago virgaurea* L. - Золотая розга обыкновенная = Ст,П,Кисл(Евро-Сиб.); Pa(НК); [Pl.] <Pm;Pmel>

1967. *Aster bessarubicus* Bernh.ex Reichenb. (*A. amelloides* Bess.) - Астра бессарабская = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Понтич.); Pa,ST(НК); [Pl.]

1968. *A. alpinus* L. - А. альпийская = П,Кисл[Галушко, 1980](Панбор.); Pb(НК); [Sp.] <Po>

1969. *Galatella dracunculoides*(Lam.)Nees - Солонечник эстрагоновидный = Все р-ны(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.]

1970. *G. pastuchovii*(Kem.-Nath.)Tzvel. - С. Пастухова = МД,АИ,НК,КН(Понтич.); Db,Dc(НК); [Sp.]

1971. *Crinitaria villosa*(L.)Grossh. (*Galatella villosa*(L.)Reichenb.) - Кринитария (Грудница) мохнатая = Все р-ны(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.] <Pm>

1972. *C. linosyris*(L.)Less. (*G. linosyris*(L.)Reichenb.) - К.(Г.) обыкновенная = Все р-ны(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.]

1973. *Tripolium vulgare* Nees - Триполиум обыкновенный = Все р-ны(Голаркт.); Aa(НК:pb); [Sp.] <Pm;Pp>

1974. *Erigeron orientalis* Boiss. - Мелколепестник восточный = Ст,П,Кисл (Субкавк\*.); ST(НК); [Pl.]

1975. *E. acris* L. (*E. acer auct.*) - М. едкий = Все р-ны(Голаркт.); Pa(НК:pb); [Sp.] <Pm>

1976. *Conyza canadensis*(L.)Cronq. (*Erigeron canadensis* L.) - Кониза (Мелколепестник) канадская = Все р-ны(Адвент.[Сев.Америка]); Ra,Rb(T); [Pl.] <Pm>

1977. *Phalacrolooma annuum*(L.)Dumort. (*Stenactis annua*(L.)Cass.) - Фалакролома (Стенактис) однолетняя = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Голаркт.); S,Pa,Rb(T); [Pl.]

1978. *Filago vulgaris* Lam. (*F. germanica* L.) - Жабник обыкновенный = Все р-ны (Зап.др.средиз.); Da,Db(T); [R.]

1979. *F. erioccephala* Guss. - Ж. шерстистоголовый = Ст,СК,Кисл (Зап.др.средиз.); Db(T); [R.]

1980. *F. arvensis* L. - Ж. полевой = Все р-ны(Палеаркт.); ST(T); [Pl.] <Pm>

1981. *Filaginella rossica*(Kirp.)Tzvel. (*Gnaphalium rossicum* Kirp.) - Сушеница русская = Ст(Палеаркт.); Aa,Rb(НК); [R.] <Rg>

1982. *Gnaphalium luteo-album* L. - Сушеница жёлто-белая = СК(Кума)(Плюрирег.); Da(T); [R.]
1983. *Omalotheca sylvatica*(L.)Sch.Bip.et F.Schultz (*Gnaphalium sylvaticum* L.) - Омалотека (Сушеница) лесная = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Голаркт.); S(НК); [R.]
1984. *Helichrysum arenarium*(L.)Moench - Бессмертник (Цмин) песчаный = КЕ,МД,АИ, НК,Прик,ТБ,Ст,СК,П(Палеаркт.); Db(НК); [Sp.] <Pm>
1985. *Inula helenium* L. - Девясил высокий = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Аа(НК); [Pl.] <Pm>
1986. *I. orientalis* Lam. - Д. восточный = П,Кисл[Танфильев, Кононов, 1987](Кавк.); Pb(НК); [Sp.]
1987. *I. hirta* L. - Д. жёстковолосистый = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,ЛН, СК,П,Кисл(Палеаркт.); ST(НК); [Sp.]
1988. *I. ensifolia* L. - Д. мечелистный = Все р-ны(Евро-Кавк.); ST(НК); [Pl.]
1989. *I. germanica* L. - Д. германский = Все р-ны(Евро-Кавк.); ST(НК); [Sp.]
1990. *I. aspera* Poir. - Д. шероховатый = Все р-ны(Понт.-Южносиб.); Pa(НК); [Pl.]
1991. *I. sabuletorum* Czern.ex Lavr. - Д. песчаный = Прик(Субтуран\*.); Db(НК); [R.] <Rx>
1992. *I. caspica* Blum ex Ledeb. - Д. каспийский = МД(Туранск.); Dc(НК:pb); [Sp.]
1993. *I. oculus-christi* L. - Д. христово око = Все р-ны(Зап.др.средиз.); ST(НК); [Sp.]
1994. *I. britannica* L. - Д. британский = Все р-ны(Палеаркт.); Аа(НК); [Pl.] <Pm>
1995. *I. conyza* DC. (*I. vulgaris* Trevis.) - Д. блоший =П,Кисл(Понтич.); ST(НК); [Sp.]
1996. *I. thapsoides*(Bieb.)Spreng. - Д. коровяковый = Ст,П,Кисл(Армено-Иран.); Pa(НК); [Sp.]
1997. *Pulicaria vulgaris* Gaertn. (*P. prostrata*(Gilib.)Aschers. nom. illegit.) - Блошница обыкновенная = Все р-ны(Палеаркт.); Аа(T); [Sp.] <Pm>
1998. *P. dysenterica*(L.)Bernh. (*P. uliginosa* Stev.ex DC.) - Б. дизентерийная = Все р-ны(Общедр.средиз.); Аа(НК); [Sp.]
1999. ★ *Carpesium cernuum* L. - Карпезиум поникающий = СК(Георгиевск) (Общедр.средиз.); Аа(НК); [Rs.] <Rg>
2000. ★ *Telekia speciosa*(Schreb.)Baumg. - Телекия видная = [Ст: Танфильев, Кононов, 1979],П,Кисл(Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.] <Po>
2001. *Cyclachaena xanthiifolia*(Nutt.)Fresen. - Циклахена дурнишниковая = КЕ, Прик,ТБ,НК,Ст,СК,П(Адвент.[Сев. Америка]); Rb(T); [R.]
2002. *Ambrosia artemisiifolia* L. - Амброзия полынолистная = Все р-ны(Адвент. [Сев. Америка]); Ra,Rb(T); [Pl.]
2003. *A. psilostachya* DC. - А. голометельчатая = КЕ,Прик,ТБ,Ст(Адвент.[Сев. Америка]); Ra,Rb(НК); [Sp.]

2004. *Xanthium strumarium* L. - Дурнишник зобовидный = Все р-ны(Адвент. [космополитный]); Rb(T); [Pl.] <Pm>
2005. *X. californicum* Greene - Д. калифорнийский = Все р-ны(Адвент.[Сев. Америка]); Rb(T); [Pl.]
2006. *X. spinosum* L. - Д. колючий = Все р-ны(Адвент.[космополитный]); Rb(T); [Pl.] <Pm>
2007. *Sigesbeckia orientalis* L. - Сигезбекия восточная = П,Кисл(Адвент. [Средиземноморье]); Rb(T); [Sp.]
2008. *Bidens cernua* L. - Череда поникающая = Ст,П,Кисл(Голаркт.); Aa(T); [Sp.]
2009. *B. tripartita* L. - Ч. трёхраздельная = Все р-ны(Плюрирег.); Aa,Rb(T); [Pl.] <Pm>
2010. *Galinsoga parviflora* Cav. - Галинсога мелкоцветковая = Все р-ны(Адвент. [Южн.Америка]); Rb(T); [Pl.]
2011. *G. ciliata*(Rafin.)Blake (*G. quadriradiata auct.*) - Г. реснитчатая = П (Адвент. [Южн.Америка]); Rb(T); [R.]
2012. *Anthemis sosnovskyana* Fed. - Пупавка Сосновского = П,Кисл(Кавк.); Da(НК); [Sp.]
2013. *A. marschalliana* Willd. - П. Маршалла = Кисл(Кавк.); Da,Pb(НК); [Pl.]
2014. *A. arvensis* L. - П. полевая = КЕ(Евро-Кавк.); Rb(НК); [Sp.]
2015. *A. ruthenica* Vieb. - П. русская = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,СК(Понтич.); ST,Db,Dd(НК); [Pl.]
2016. *A. candidissima*Willd.ex Spreng. - П. белейшая = НК(Будённовск) [Танфильев, Кононов, 1987](Туранск.); Rb(T); [R.]
2017. *A. subtinctoria* Dobroc. (*A. tinctoria* L.) - П. кровельная = КЕ,Ст,СК,П (Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Sp.]
2018. *A. rigescens* Willd. - П. жёсткая = П,Кисл(Субкавк\*.); Pb(НК); [Pl.]
2019. *A. dumetorum* Sosn. - П. кустарниковая = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Кавк.); Pa(НК); [Sp.]
2020. *A. altissima* L. - П. высочайшая = Ст[Галушко, 1980](Субкавк\*.); Rb(T); [R.]
2021. *A. cotula* L. - П. собачья = Все р-ны(Евро-Кавк.); Rb(T); [Pl.]
2022. *Achillea nobilis* L. - Деревей (Тысячелистник) благородный = Все р-ны(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.] <Pm>
2023. *A. millefolium* L. - Д. тысячелистник = Все р-ны(Евро-Сиб.); ST(НК); [Pl.] <Pm>
2024. *A. setacea* Waldst.et Kit. - Д. щетинистый = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,ST(НК); [Sp.] <Pm>
2025. *A. leptophylla* Vieb. - Д. тонколистный = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М (Понтич.); ST(НК); [R.]
2026. *A. micrantha* Willd. - Д. мелкоцветковый = Прик,ТБ,Ст,СК(Понт.- Южносиб.); Db(НК); [Sp.] <Pm>



2027. *A. biebersteinii* Afan. - Д. Биберштейна = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М (Вост.др.средиз.); ST,Da,Dd(НК); [Pl.]
2028. *Leucanthemum vulgare* Lam. - Нивянка обыкновенная = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Евро-Сиб.); Pa,S(НК); [Pl.] <Pm;Po>
2029. ★ *L. waldsteinii*(Sch.Bip.)Pouzar - Н. Вальдштейна = Ст(Стрижамент) [Михеев, 1983](Европ.); Pa)НК); [R.]
2030. *Matricaria recutita* L. (*Chamomilla recutita*(L.)Rauschert; *Matricaria chamomilla* L.) - Ромашка лекарственная = Все р-ны(Голаркт.); Rb(T); [Pl.] <Pm>
2031. *Lepidotheca suaveolens*(Purch)Nutt. (*Matricaria suaveolens*(Pursh) Buschenau; *M. discoidea* DC.; *Chamomilla discoidea*(DC.)J.Gay ex A.Br. ) - Лепидотека (Ромашка) пахучая = Все р-ны(Панбор.); Rb(T); [Pl.]
2032. *Tripleurospermum perforatum*(Merat)M.Lainz (*Matricaria perforata* Merat; *Tripleurospermum inodorum*(L.)Sch.Bip.nom.illegit.) - Трёхреберник пронзённый (Ромашка непахучая) = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(T); [Sp.]
2033. *T. parviflorum*(Willd.)Pobed. (*M. parviflora*(Willd.)Poir.) - Т.(P.) мелкоцветковый = МД,АИ,НК,КН(Армено-Иран.); ST(T); [R.]
2034. *Pyrethrum parthenifolium* Willd. - Пиретрум девичьелистный = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Общедр.средиз.); S,Da(НК); [Pl.] <Pm>
2035. *P. coccineum*(Willd.)Worosch. (*P. roseum*(Adams)Bieb.) - П. красный (розовый) = П, Кисл(Субкавказ\*.); Pb(НК); [Sp.] <Pt;Po>
2036. *P. corymbosum*(L.)Scor. - П. щитковый = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл (Европ.); Pa(НК); [Sp.]
2037. *Tanacetum vulgare* L. - Пижма обыкновенная = Все р-ны(Голаркт.); Pa,Rb(НК); [Sp.] <Pm>
2038. *T. millefolium*(L.)Tzvel. - П. тысячелистная = Ст,СК(Понт.-Южносиб.); ST,Da(НК); [Sp.]
2039. *T. achilleifolium*(Bieb.)Sch.Bip. - П. деревеелистная = МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,СК(Понт.-Южносиб.); ST,Dc(НК); [Pl.]
2040. *Artemisia vulgaris* L. - Полынь обыкновенная (Чернобыльник) = Все р-ны(Голаркт.); Rb(НК); [Pl.] <Pm>
2041. *A. verlotiorum* Lamotte - П. Верлотов = П[г.Машук: Дубовик, Мосякин, 1991](Адвент.[Япония, Китай]); Rb(НК); [R.]
2042. *A. abrotanum* L. (*Artemisia procera* Willd.; *A. elatior* Klok.) - П. рослая = П,КН(Понт.-Южносиб.); Db(Ch:sf); [R.]
2043. *A. chamaemelifolia* Vill. - П. ромашколистная = Ст,П,Кисл(Субкавказ\*.); Da(НК); [Sp.]
2044. *A. pontica* L. - П. понтийская = Ст,П(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Sp.] <Pm>
2045. *A. annua* L. - П. однолетняя = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(T); [R.] <Pm>

2046. ★ *A. grossheimii* Krasn.ex Pojark. (*A. caucasica* Willd.) - П. Гроссгейма = Прик(с. Тугулук), [г. Брык, Галушко, Мигненко, 1989]), П, Кисл(Субкавказ\*.); Da(НК); [R.] <Po;Rx>
2047. *A. austriaca* Jacq. - П. австрийская = Все р-ны(Понт.-Южносиб.); SD,Db,Dd,Dc(НК); [Pl.]
2048. *A. absinthium* L. - П. горькая = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(НК); [Pl.] <Pm>
2049. *A. dracuncululus* L. - П. эстрагон = НК(Голаркт.); ST,Dc(НК); [R.]
2050. ★ ★ *A. salsoloides* Willd. (*A. tanaitica* Klok.) - П. солянковая = П[Галушко, 1980](Понт.-Южносиб.); Da(Ch:sf); [Rs.] <Rx>
2051. *A. campestris* L. - П. полевая = Все р-ны(Голаркт.); ST(НК); [Sp.]
2052. *A. scoraria* Waldst.et Kit. - П. метельчатая(вечная) = Все р-ны (Палеаркт.); ST(T); [Pl.]
2053. *A. marschalliana* Spreng. (*A. sosnovskyi* Krasch.ex Novopokr.) - П. Маршалла = СК,П,Кисл(Палеаркт.); ST(НК); [Sp.]
2054. *A. tschernieviana* Bess. - П. Черняева = МД,АИ,НК,М,СК,П,КН(Понтич.); Db(Ch:sf); [Pl.]
2055. *A. lurchiana* Web.ex Stechm. (*A. fragrans* Willd.) - П. Лерхе = КН(Понт.-Южносиб.); ST,Dd(Ch:sf); [Pl.]
2056. *A. taurica* Willd. - П. крымская = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,СК,П,КН(Понтич.); Dc,Dd(НК); [Pl.] <Pm;Pp>
2057. *A. santolina* L. - П. сантолиновая = КЕ,МД,АИ,Прик,ТБ,НК(Туранск.); Dc(НК); [R.] <Pm>
2058. *Tussilago farfara* L. - Мать-и-мачеха обыкновенная = Все р-ны(Палеаркт.); Dd(НК); [Pl.] <Pm>
2059. *Petasites hybridus*(L.)Gaertn.,Meu.et Schreb. - Белокопытник гибридный = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Евро-Кавк.); S,Аа(НК); [Pl.] <Pm>
2060. *P. albus*(L.)Gaertn. - Б. белый = КЕ,Прик,ТБ,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Евро-Кавк.); S,Аа(НК); [Pl.]
2061. ★ *Doronicum orientale* Hoffm. - Дороникум восточный = Ст(Евро-Кавк.); S(НК); [R.] <Po;Rg>
2062. *D. oblongifolium* DC. - Д. продолговатолистный = Кисл(Палеаркт.); Pb(НК); [Pl.]
2063. *D. macrophyllum* Fisch.ex Hornem. - Д. крупнолистный = П,Кисл(Субкавказ\*.); Pb(НК); [Sp.] l.c. Бештау
2064. *Senecio vulgaris* L. - Крестовник обыкновенный = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.); Rb(T); [Sp.] <Pm>
2065. *S. viscosus* L. - К. липкий = П,Кисл(Евро-Кавк.); Rb(T); [R.]
2066. *S. vernalis* Waldst.et Kit. - К. весенний = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(T); [Pl.]
2067. *S. jacobaeus* Rupr. - К. Ноя = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,СК,КН(Ирано-Туран.); Dc(T); [Sp.]

2068. *S. jacobaea* L. - К. Якова = Все р-ны(Палеаркт.); ST,Rb(T); [Sp.]
2069. *S. erucifolius* L. - К. эруколиственный = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Aa(HK); [Sp.]
2070. *S. grandidentatus* Ledeb. - К. крупнозубчатый = KE,CT,ЛH,CK,П,Кисл (Понт.-Южносиб.); Pa,ST(HK); [Pl.]
2071. *S. schischkinianus* Sof. - К. Шишкина = KE,MD,AI,KH(Эукавк.); Dc(HK); [Sp.]
2072. *S. macrophyllus* Bieb. - К. крупнолистный = П(Эукавк.); S(HK); [Sp.] l.c. Терек и Кума
2073. *S. propinguus* Schischk. - К. близкий = П,Кисл(Кавк.); S,Pa(HK); [Sp.]
2074. *S. lapsanoides* DC. - К. бородавниковидный = Кисл(Кавк.); S(HK); [Sp.]
2075. *Tephrosieris subfloccosus*(Schischk.)Czer. (*Senecio subfloccosus* Schischk.) - К. почтиклочковатый = П,Кисл(Кавк.); Pb(HK); [Sp.]
2076. *Dolichorrhiza renifolia*(C.A.Mey.)Galushko (*Senecio renifolia* C.A.Mey.) - Долихориза почколистная = Кисл(Эукавк.); Pb,S(HK); [Sp.]
2077. *Echinops ruthenicus* Bieb. (*E. ritro* L.) - Мордовник обыкновенный = CT (Понт.-Южносиб.); ST(HK); [R.] <Pm>
2078. ★*E. viridifolius* Пjin - М. зеленолистный = П(Машук)(Предкавк.); Pa(HK); [Rs.] <Es> l.c. Машук (рис. 11)
2079. *E. sphaerocephalus* L. - М. шароголовый = Все р-ны(Понт.-Южносиб.); Pa(HK); [Sp.] <Pm;Pmel>
2080. *E. galaticus* Freyn - М. галатский = СК(Эвксин.); S,Pa(HK); [Sp.]
2081. *Xeranthemum annuum* L. - Сухоцвет однолетний = Все р-ны(Субпонт\*.); ST(T); [Pl.] <Po;Pm>
2082. *X. cylindraceum* Sibth.et Smith. - С. цилиндрический = Все р-ны (Зап.др.средиз.); ST(T); [Sp.] <Po>
2083. *Carlina vulgaris* L. - Колючник обыкновенный = CT,ЛH,CK,П,Кисл(Евро-Кавк.); ST(HK:pb); [Pl.]
2084. *Arctium lappa* L. - Лопух репейник = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(HK:pb); [R.] <Pm;Pmel>
2085. *A. nemorosum* Lej. - Л. дубравный = П(Европ.); S,Rb(HK:pb); [Sp.] <Rg;Pmel>
2086. *A. tomentosum* Mill. - Л. войлочный = CT,П(Палеаркт.); Rb(HK:pb); [Sp.] <Pm;Pa;Pmel>
2087. *A. palladinii*(Marc.)Grossh. - Л. Палладина = CT,П,Кисл(Кавк.); S,Rb(HK:pb); [Pl.] <Pmel>
2088. *A. minus*(Hill)Bernh. - Л. малый = НК,СК(Кума)[Танфильев, Кононов, 1987](Понтич.); Rb(HK:pb); [Sp.] <Pmel>
2089. *Saussurea amara*(L.)DC. - Горькуша горькая = НК[Танфильев, Кононов, 1987](Субтуран\*.); Dc(HK); [R.]

2090. *S. salsa*(Pall.ex Bieb.)Spreng. - Г. солончаковая = НК[Танфильев, Кононов, 1987](Вост.др.средиз.); Dc(НК); [R.]
2091. ★ *Jurinea cyanoides*(L.)Reichenb. - Наголоватка васильковая = [Ст: Танфильев, Кононов, 1987],КН(Понт.-Южносиб.); Dd(НК); [R.]
2092. *J. polyclonos*(L.)DC. (*J. amplexicaulis*(S.G.Gmel.)Vobr.) - Н. многостебельная = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М(Понт.-Южносиб.); Db(НК); [Sp.]
2093. *J. multiflora*(L.)Vieb. - Н. многоцветковая = МД,АИ,Прик,ТБ,НК,Ст,СК,П,КН(Понт.-Южносиб.); Db,Dc,Dd(НК); [Pl.]
2094. *J. arachnoidea* Bunge - Н. паутинистая = Все р-ны(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Pl.]
2095. ★ *J. alata*(Desf.)Cass. - Н. крылатая = Кисл(Эукавк.); Da(НК); [Sp.]
2096. *J. ciscaucasica*(Sosn.)Pjlin - Н. предкавказская = М,СК(Предкавк.); Db(НК); [Sp.] l.c. Нальчик
2097. ★ *J. ewersmannii* Bunge - Н. Эверсмана = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,КН(Понтич); Db(НК); [R.]
2098. *Carduus nutans* L. - Чертополох поникающий = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm;Pmel>
2099. *C. acanthoides* L. - Ч. колючий = Все р-ны(Евро-Кавк.); SD,Rb(НК:pb); [Sp.] <Pmel>
2100. *C. crispus* L. - Ч. курчавый = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Sp.] <Pmel>
2101. *C. hamulosus* Ehrh. - Ч. крючочковый = Все р-ны(Субпонт\*.); ST(НК:pb); [Sp.] <Pmel>
2102. *C. uncinatus* Vieb. - Ч. крючковатый = Все р-ны(Субпонт\*.); Rb(НК:pb); [Sp.] <Pmel>
2103. *C. pseudocollinus*(Schmalh.)Klok. - Ч. ложнохолмовой = Ст,СК,П(Понтич.); ST(НК:pb); [R.] <Pmel>
2104. *C. seminudus* Vieb. - Ч. почтиголый = Все р-ны(Субкавк\*.); ST(НК:pb); [Sp.] <Pmel>
2105. *C. laciniatus* Ledeb. (*C. multijugus* C.Koch) - Ч. дольчатый = Ст,ЛН,П,Кисл(Кавк.); S,Pa(НК:pb); [Sp.] <Pmel>
2106. *C. albidus* Vieb. - Ч. беловатый = П(Ирано-Туран.); Rb(T); [R.] <Pmel>
2107. *C. cinereus* Vieb. - Ч. сероватый = М,[Ст: Портениер, 1997](Ирано-Туран.); Rb(T); [R.] <Pmel>
2108. *Cirsium vulgare*(Savi)Ten. - Бодяк обыкновенный = Все р-ны(Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm;Pmel>
2109. *C. ciliatum*(Murr.)Moench - Б. реснитчатый = Все р-ны(Понт.-Южносиб.); S,Pa(НК); [Sp.] <Pmel>
2110. *C. canum*(L.)All. - Б. серый = Ст,ЛН,П,Кисл(Европ.); S,Pa(НК); [Sp.] <Pmel>
2111. *C. incanum*(S.G.Gmel.)Fisch. - Б. седой = Все р-ны(Понт.-Южносиб.); Rb(НК); [Sp.] <Pmel>

2112. *C. arvense*(L.)Scop. - Б. полевой = Все р-ны(Европ.); Rb(НК); [Sp.]  
<Pm;Pmel>
2113. *C. elodes* Vieb. - Б. болотолобивый = М,КН(Субкавказ\*.); Rb(НК); [R.]  
<Pmel>
2114. *C. pugnax* Somm. et Levier - Б. воинственный = Кисл(Кавк.); Pa,Rb(НК);  
[Sp.]
2115. *C. arachnoideum*(Vieb.)Bess. - Б. паутинистый = Ст,П,Кисл(Эукавказ.);  
Pa(НК); [Sp.] л.с. Бештау <Pmel>
2116. *C. dealbatum* Vieb. - Б. беловатый = Кисл(Эукавказ.); S,Rb(НК); [Pl.] <Esub>  
л.с. Кисловодск
2117. *C. uliginosum*(Vieb.)Fisch. - Б. болотный = П,Кисл(Эукавказ.); Aa(НК); [Sp.]  
л.с. Кисловодск <Pmel>
2118. *C. obvallatum*(Vieb.)Fisch. - Б. окутанный = Кисл(Субкавказ.\*); Pb(НК); [Sp.]
2119. ★ *Lamyra echinocephala*(Willd.)Tamamsch. (*Ptilostemon echinocephalus*  
(Willd.)Greuter) - Ламира ежеголовая = П(Машук),Кисл(Кисловодск)(Кр.-  
Новоросс.); Db(НК); [Rs.] <Po;Rx>
2120. *Onopordon acanthium* L. - Татарник колючий = Все р-ны(Палеаркт.);  
Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm;Pmel>
2121. *Scrupina vulgaris* Cass. - Крупина обыкновенная = СК(Субтуран\*.);  
ST,Da(T); [R.]
2122. *Serratula coronata* L. - Серпуха венценосная = Ст,ЛН,СК,П,Кисл  
(Палеаркт.); Pa(НК); [Sp.] <Pm>
2123. *S. erucifolia*(L.)Voriss. - С. эруколистная = М,Ст,КН(Субтуран\*.); Dc(НК);  
[R.]
2124. *S. radiata*(Waldst.et Kit.)Vieb. (*S. bracteifolia*(Iljin ex Grossh.) Stank.) - С.  
лучистая = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Евро-Кавк.); Pa(НК); [Sp.]
2125. *S. quinquefolia* Vieb.ex Willd. - С. пятилистная = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Кавк.);  
S(НК); [Pl.]
2126. *Acroptilon repens*(L.)DC. - Горчак ползучий = Все р-ны(Палеаркт.);  
ST,Ra,Rb(НК); [Sp.] <Pm>
2127. *Chartolepis intermedia* Boiss. - Хартолепис средний = МД,АИ,НК,КН  
(Субтуран\*.); Dc(НК); [R.]
2128. *Psephellus dealbatus*(Willd.)Boiss. (*Centaurea dealbata* Willd.) - Псефеллюс  
беловатый = КЕ,Прик,ТБ,НК,Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Кавк.); Pa(НК); [Pl.]  
<Pmel;Po>
2129. ★ *P. leucophyllus*(Vieb.)С.А.Меу. (*Centaurea leucophylla* Vieb.) - П.  
белолистный = СК,П(Понтич.); Da(НК); [Sp.] л.с. Пятигорск
2130. *P. anatolii* A.L.Ivanov - П. Анатолия = Кисл(Эукавказ.); Da(НК); [Rs.] <Esub>  
л.с. Кисловодск

2131. ★*P. annae* Galushko (*P. marschallianus* (Spreng.) A.D. Mikheev; *Centaurea marschalliana* Spreng.) - П. Анны = Прик, Ст (Предкавказ.); Да (НК); [Sp.] <Po> <Ee> (рис. 12)
2132. *P. holophyllus* Socz. et Lipat. (*Centaurea holophylla* (Socz. et Lipat.) Socz. et Lipat.) - П. цельнолистный = Кисл (Эукавказ.); Да (НК); [R.]
2133. ★*P. ciscaucasicus* (Sosn.) Galushko (*Centaurea ciscaucasica* Sosn.) - П. предкавказский = Кисл (Эукавказ.); Да (НК); [Sp.] <Esub> l.c. Кисловодск
2134. *Centaurea ruthenica* Lam. - Василёк русский = Ке, МД, АИ, НК, Прик, ТБ, М, Ст, СК, П (Субтуран\*.); СТ (НК); [R.] <Pmel>
2135. ★*C. pseudotanaitica* Galushko nom. nudum (*C. tanaitica* Klok.) - В. ложно-донской = Ст, СК (Понтич.); Ра, СТ (НК); [R.]
2136. *C. depressa* Vieb. - В. прижатый = П, Кисл (Вост. др. средиз.); Ра, Рb (Т); [R.] <Pmel>
2137. *C. cyanus* L. - В. синий = Все р-ны (Голаркт.); Ра, Рb (Т); [Sp.] <Pm; Pmel>
2138. *C. substituta* Czer. - В. замещающий = Ст, ЛН (Понтич.); S, Ра (НК); [Sp.]
2139. *C. abbreviata* (C. Koch) Hand.-Mazz. - В. укороченный = П, Кисл (Субкавказ\*.); S, Ра (НК); [Sp.]
2140. *C. alutacea* Dobrocz. - В. серовато-жёлтый = П, Кисл (Эукавказ.); Ра, Рb (НК); [Sp.]
2141. *C. trichosephala* Vieb. - В. волосистоголовый = Ке, П (Понт.-Южносиб.); СТ (НК); [R.]
2142. *C. trinervia* Steph. - В. трёхжилковый = Ст, П (Понтич.); СТ (НК); [Sp.]
2143. *C. orientalis* L. - В. восточный = Все р-ны (Понтич.); СТ (НК); [Pl.]
2144. *C. apiculata* Ledeb. - В. шипиконосный = Ст, СК, П (Субсредиз\*.); Ра, СТ (НК); [R.]
2145. *C. adpressa* Ledeb. - В. прижаточешуйчатый = Ст, СК, П (Понт.-Южносиб.); СТ (НК); [R.]
2146. *C. diffusa* Lam. - В. раскидистый = Все р-ны (Понтич.); СТ, Рb (НК:pb); [Pl.]
2147. *C. solstitialis* L. - В. солнечный = Все р-ны (Ирано-Туран.); SD (НК:pb); [Sp.]
2148. *C. iberica* Trev. ex Spreng. - В. грузинский = Все р-ны (Ирано-Туран.); Рb (НК:pb); [Pl.]
2149. *C. arenaria* Vieb. - В. песчаный = НК, КН (Туранск.); Дс (НК:pb); [R.] l.c. р. Кума
2150. ★*C. scirpczinskyi* A.D. Mikheev - В. Скрипчинского = Прик, Ст, П [Михеев, 1997] (Предкавказ.); Дб (НК); [Sp.] <Esub>
2151. *C. kubanica* Klok. - В. кубанский = Ст, ЛН, СК, П (Эукавказ.); СТ (НК:pb); [Sp.]
2152. *C. cheiranthifolia* Willd. - В. бледно-жёлтый = П, Кисл (Субкавказ\*.); Рb (НК); [Sp.]
2153. *C. abnormis* Czer. - В. уклоняющийся = Ст, СК, П (Предкавказ.); S, Ра (НК); [Sp.] l.c. Майкоп <Esub>

2154. *C. salicifolia* Vieb. - В. иволистный = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Субкавказ\*.); S,Pa(НК); [Sp.] I.c. Владикавказ
2155. *Carthamus lanatus* L. - Софлор шерстистый = Ке,Прик,ТБ, Ст,ЛН,СК, П,Кисл(Общедр.средиз.); Rb(Т); [Pl.]
2156. *Cichorium inthybus* L. - Цикорий обыкновенный = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Rb(НК); [Pl.] <Pa;Pm;Pmel>
2157. *Lapsana communis* L. - Бородавник обыкновенный = Ке,Прик,ТБ,НК, Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.); S,Rb(Т); [Sp.] <Pm>
2158. *L. intermedia* Vieb. - Б. промежуточный = Ке,Прик,ТБ,НК, Ст,ЛН,СК, П,Кисл(Субкавказ\*.); S,Rb(НК); [Sp.]
2159. *L. grandiflora* Vieb. - Б. крупноцветковый = Ке,Прик,ТБ,НК, Ст,ЛН,СК, П,Кисл(Субкавказ\*.); S(НК); [Pl.]
2160. *Нуроchoeris radicata* L. (*Porcellites radicata*(L.)Cass.) - Гипохерис стержнекорневой = Ст(Субсредиз\*.); Pa(НК); [R.] <Rg>
2161. *Trommsdorffia maculata*(L.)Bernh. (*Achyrophorus maculatus*(L.)Scop.) - Троммсдорфия (Пазник) крапчатая = Ст,П,Кисл(Евро-Сиб.); S(НК); [Pl.] <Pm>
2162. *Leontodon autumnalis* L. - Кульбаба осенняя = Ст(Евро-Сиб.); Pa,Rb(НК); [R.] <Pmel>
2163. *L. asperrimus*(Willd.)Endl. - К. шероховатейшая = П(Армено-Иран.); Da(НК); [R.] <Rx;Pmel>
2164. *L. caucasicus*(Vieb.)Fisch. - К. кавказская = Кисл(Кавк.); Pb(НК); [Sp.]
2165. *L. danubialis* Jacq. - К. дунайская = Все р-ны(Евро-Кавк.); Pa(НК); [Sp.] <Pmel>
2166. *L. hispidus* L. - К. щетинисто-волосистая = Все р-ны(Евро-Кавк.); Pa(НК); [Pl.] <Pmel;Pp>
2167. *Picris hieracioides* L. - Горлюха ястребинковая = Все р-ны(Палеаркт.); ST(НК:pb); [Pl.]
2168. *P. strigosa* Vieb. - Г. щетинистая = Все р-ны(Армено-Иран.); ST(НК:pb); [Sp.]
2169. *P. canescens*(Stev.)V.Vassil. - Г. седоватая = Кисл(Кавк.); Rb(НК:pb); [Sp.]
2170. *Helminthotheca echioides*(L.)Holub (*Helmintia echioides*(L.)Juss.) - Гельминтотека румянквидная = СК(Зап.др.средиз.); Pa,Rb(Т); [Sp.]
2171. *Garhadiolus papposus* Boiss.et Buhse - Гарадиолус хохлатый = КН(Армено-Иран.); ST,Rb(Т); [R.]
2172. *Podospermum laciniatum*(L.)DC. (*Scorzonera laciniata* L.) - Ножкосемянник разрезной = Все р-ны (Зап.др.средиз.); ST,Da(НК:pb); [Sp.]
2173. *P. lachnostegium* Woronow (*S. lachnostegia*(Woronow)Lipsch.) - Н. косматообёртковый = Ке,Ст(Предкавказ.); ST(НК:pb); [R.] <Esub>
2174. *Scorzonera parviflora* Jacq. - Козелец мелкоцветковый = Ке,МД,АИ,НК, Прик,ТБ,М(Палеаркт.); Dc(НК:pb); [Sp.]

2175. *S. taurica* Vieb. - К. крымский = Ст,СК,П,Кисл(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Sp.]
2176. *S. stricta* Hornem. - К. торчащий = Все р-ны(Понт.-Южносиб.); ST(НК); [Sp.]
2177. *S. mollis* Vieb. - К. мягкий = МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,Ст,СК,П,Кисл (Субпонт\*.); ST(НК); [Sp.]
2178. *S. biebersteinii* Lipsch. - К. Биберштейна = П,Кисл(Кавк.); Da,Db(НК); [Sp.]  
l.c. Пятигорск
2179. *S. ensifolia* Vieb. - К. мечелистный = МД,АИ,НК,КН(Субтуран\*.); ST,Db(НК); [R.]
2180. *Tragopogon dasyrhynchus* Artemcz. - Козлобородник опушённоносый = Ст,СК,П(Понтич.); ST,Da(НК:pb); [Sp.]
2181. *T. dubius* Scop. - К. сомнительный = Все р-ны(Субсредиз\*.); Pa(НК:pb); [Sp.]
2182. *T. filiformis* Rehm.ex Voiss. - К. нителистный = Кисл(Кавк.); Pa,Da(НК); [Sp.]
2183. *T. brevirostris* DC. - К. коротконосый = СК,П,Кисл(Кавк.); Pa,ST,Da(НК); [Sp.]
2184. *T. reticulatus* Boiss.et Huet - К. сетчатый = П,Кисл(Кавк.); Pb(НК); [Sp.]
2185. *T. graminifolius* DC. - К. злаколистный = П,Кисл(Субкавказ\*.); Pb(НК); [Sp.]
2186. *T. orientalis* L. - К. восточный = Все р-ны(Европ.); Pa,ST(НК:pb); [Pl.]
2187. *T. ruthenicus* Bess.ex Krasch.et S.Nikit. - К. русский = КН(Субтуран\*.); Db(НК:pb); [R.]
2188. *T. daghestanicus*(Artemcz.)Kuth. - К. дагестанский = КН(Субтуран\*.); Db(НК:pb); [Sp.]
2189. *Sonchus palustris* L. - Осот болотный = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Палеаркт.); Aa(НК); [Sp.] <Pmel>
2190. *S. arvensis* L. - О. полевой = Все р-ны(Плюрирег.); Ra,Rb(НК); [Pl.] <Pmel>
2191. *S. oleraceus* L. - О. овощной = Все р-ны(Плюрирег.); Ra,Rb(T); [Sp.] <Pm;Pmel>
2192. *S. asper*(L.)Hill - О. колючий = Все р-ны(Голаркт.); Ra,Rb(T); [Sp.] <Pmel>
2193. *Reichardia glauca* Matthews (*R. dichotoma*(Vahl)Freyn) - Рейхардия сизая = Ст,СК,П,Кисл(Армено-Иран.); ST,Da(НК); [Sp.]
2194. *Prenanthes purpurea* L. - Косогорник пурпуровый = Кисл(Субсредиз.\*); S(НК); [Sp.]
2195. *P. cacaliifolia*(Vieb.)Beauverd - К. недоспелколистный = Кисл (Общедр. средиз.); S,Pb(НК); [Sp.]
2196. *Lactuca tatarica*(L.)C.A.Meу. - Молокан (Латук) татарский = Все р-ны(Палеаркт.); Ra,Rb(НК); [Pl.]
2197. *L. serriola* L. - М. компасный = Все р-ны(Палеаркт.); Ra,Rb(T); [Pl.] <Pm>



2198. *L. saligna* L. - М. солончаковый = КЕ,МД,АИ,НК,М,СТ,СК,П,КН  
(Субсредиз\*.); Дс(НК:pb); [R.]
2199. *L. chaixii* Vill. - М. Хайкса = СТ,П,Кисл(Субсредиз\*.); S,Pa(НК:pb); [Sp.]
2200. *Scariola viminea*(L.)F.W.Schmidt - Скариола прутьевидная = Все р-ны  
(Зап.др.средиз.); ST,Rb(НК:pb); [Sp.]
2201. *Mycelis muralis*(L.)Dumort. - Мицелис стенной = КЕ,Прик,ТБ, СТ,ЛН,СК,  
П,Кисл(Евро-Кавк.); Аа(НК); [Sp.]
2202. *Cicerbita macrophylla*(Willd.)Wallr. - Цицербита крупнолистная = П,Кисл  
(Кавк.); S,Pb(НК); [Sp.]
2203. *C. prenanthoides*(Bieb.)Beauverd - Ц. косогорниковая = СТ,П,Кисл(Кавк.);  
S,Pb(НК); [Pl.]
2204. *C. racemosa*(Willd.)Beauverd - Ц. кистистая = П,Кисл(Субкавказ\*.); S,Pb(НК);  
[Sp.]
2205. *Taraxacum serotinum*(Waldst.et Kit)Poir. - Одуванчик поздний = МД,АИ,НК,  
Прик,ТБ,М,СК,П(Субпонт\*.); Pa,Rb(НК); [Sp.] <Pmel>
2206. *T. confusum* Schischk. - О. смешиваемый = П,Кисл(Кавк.); Pb(НК); [Sp.]
2207. *T. divulsiforme* R. Doll - О. дивульсиформный = П(Эукавказ.); Pa(НК); [Sp.]  
<Esub> l.c. Пятигорск
2208. *T. bessarabicum*(Hornem.)Hand.-Mazz. - О. бессарабский = КЕ(Палеаркт.);  
Дс(НК); [R.] <Pmel>
2209. *T. officinale* Wigg. - О. лекарственный = Все р-ны(Палеаркт.); Pa,Rb(НК);  
[Pl.] <Pm;Pmel;Pp>
2210. *T. mucronatum* Lindb.fil. - О. остроконечный = Все р-ны(Палеаркт.);  
Pa,Rb(НК); [Pl.] <Pmel>
2211. *T. prilipkoi* Czer. (*T. praticola* Schischk.) - О. луговой = МД,АИ,НК,Прик,  
ТБ,М,СК(Кавк.); ST(НК); [Sp.] <Pmel>
2212. *T. ciscaucasicum* Schischk. - О. предкавказский = КЕ,АИ,Прик(Предкавказ.);  
Дс(НК); [R.] <Ee> l.c. Благодатное <Pmel>
2213. *T. erythrospermum* Andrz. - О. красносемянный = КЕ(Европ.);  
Pa,Дс,Db(НК); [Sp.] <Pmel>
2214. *Chondrilla juncea* L. - Хондрилла ситниковидная = Все р-ны(Субсредиз\*.);  
Da,Db(НК:pb); [Sp.] <Pm>
2215. *Ch. latifolia* Bieb. - Х. широколистная = Все р-ны(Субпонт\*.);  
Da,Db(НК:pb); [Sp.]
2216. *Crepis sibirica* L. - Скерда сибирская = Кисл(Палеаркт.); S,Pb(НК); [Sp.]
2217. *C. rannonica*(Jacq.)C.Koch - С. венгерская = КЕ,СТ,П(Понт.-Южносиб.);  
ST,Da(НК); [Sp.]
2218. *C. tectorum* L. - С. кровельная = КЕ,СТ,П(Палеаркт.); Rb(НК:pb); [Pl.] <Pm>
2219. *C. pulchra* L. - С. красивая = КЕ,Прик,ТБ,СТ,ЛН,СК,П(Зап.др.средиз.);  
Da,Rb(T); [Pl.]

2220. *C. caucasigena* Czer. - С. кавказородная = П,Кисл(Эукавк.); Pb(НК); [Sp.]
2221. *C. glabra* Boiss. - С. голая = П,Кисл(Эукавк.); Pb(НК); [Sp.]
2222. *Barkhausia rhoeadifolia*(Bieb.)Reichenb. (*Crepis rhoeadifolia* Bieb.) - Баркгаузия маколистная = Все р-ны(Субпонт\*.); ST,Rb(НК:pb); [Pl.]
2223. *V. marschallii* С.А.Мей. (*C. marschallii*(С.А.Мей.)*F.Schultz*) - Б. Маршалла = КЕ,МД,АИ,НК,Прик,ТБ,М,КН(Субкавк\*.); ST,Rb(НК:pb); [R.]
2224. *Lagoseris sancta*(L.)К.Малы (*Pterochaesa sancta*(L.)*C.Koch*) - Птеротека палестинская = Все р-ны(Вост.др.средиз.); ST,Rb(T); [Pl.]
2225. *Hieracium virosum* Pall. - Ястребинка ядовитая = Все р-ны(Палеаркт.); S,Pa,ST(НК); [Sp.]
2226. *H. robustum* Fries - Я. могучая = Все р-ны(Палеаркт.); S,Pa,ST(НК); [Sp.]
2227. *H. umbellatum* L. - Я. зонтичная = Ст,ЛН,СК,П,Кисл(Голаркт.); Da,Db(НК); [Pl.]
2228. *H. bupleurifolium* Tausch - Я. володушколистная = П(Субсредиз\*.); S(НК); [R.]
2229. *H. arvorum*(Naeg.et Peter)Pugls. - Я. пахотная = Ст,П(Евро-Кавк.); Pa(НК); [Sp.]
2230. ★*H. schmalhausenianum* Litv.et Zahn - Я. Шмальгаузена = П,Кисл(Эукавк.); Pa(НК); [R.] 1.с. Кисловодск
2231. ★*H. adenobrachion* Litv.et Zahn - Я. железистоветочковая = П,Кисл(Предкавк.); Pa(НК); [R.] <Es> 1.с. Пятигорск (рис. 13)
2232. ★*H. podkumokense* Juxip - Я. подкумская = Кисл(Эукавк.); Pa(НК); [R.] <Es> 1.с. Кисловодск (рис. 14)
2233. ★*H. gigantellum* Litv.et Zahn - Я. крупноватая = П,Кисл(Эукавк.); Pa(НК); <Es> 1.с. Бештау (рис. 15)
2234. ★*H. chaetothyrsum*(Litv.et Zahn)Juxip - Я. волосистосоцветная = Ст,П,Кисл(Предкавк.); Pb(НК); [Sp.] <Ee> (рис. 16)
2235. *H. erythrocarpum* Peter - Я. красноплодная = Ст,П,Кисл(Субкавк\*.); S(НК); [Sp.]
2236. *H. macrolepis* Boiss. - Я. крупночешуйчатая = П,Кисл(Субкавк\*.); S,Pb(НК); [Sp.]
2237. *H. simplicicaule*(Somm.et Levier)Peter - Я. простостебельная = П,Кисл(Кавк.); S,Pb(НК); [Sp.]
2238. ★*H. rigidellum* Litv.et Zahn - Я. жестковатая = Ст,П(Предкавк.); Pa(НК); [Sp.] <Ee> 1.с. Бештау (рис. 17)
2239. *H. terekianum*(Litv.et Zahn)Juxip - Я. терекская = П,Кисл(Эукавк.); Pa(НК); [R.]
2240. ★*H. caucasiense* Arg.-Touv. - Я. предкавказская = П,Кисл(Предкавк.); Da(НК); [R.] <Es> 1.с. Бештау (рис. 18)

2241. ★ *H. beschtavicum* (Litv. et Zahn) Juxip - Я. бештаусская = Ст, П, Кисл (Предкавк.); S(НК); [Sp.] <Ее> l.c. Бештау (рис. 19)
2242. ★ *H. beschtaviciforme* Juxip - Я. бештаусскообразная = П(Предкавк.); Pa(НК); [R.] <Es> l.c. Бештау (рис 20)
2243. ★ *H. acuminatifolium* (Litv. et Zahn) Juxip (*H. epichlorum* (Litv. et Zahn) Juxip) - Я. заострённолистная = П(Предкавк.); S(НК); [R.] <Es> l.c. Железноводск (рис. 21)
2244. *H. pilosella* L. - Я. волосистая = Ке, Прик, ТБ, Ст, ЛН, СК, П, Кисл (Евро-Кавк.); Da, Db(НК); [Pl.] <Pm>
2245. *H. bifurcum* Vieb. (*H. longipes* (C. Koch ex Naeg. et Peter) Juxip) - Я. раздвоенная = Ст, П(Субкавк\*.); Pa(НК); [Sp.]
2246. *H. caucasicum* Naeg. et Peter (*H. hohenackeri* (Naeg. et Peter) Juxip) - Я. кавказская = Ст, СК, П, Кисл(Субкавк\*.); ST(НК); [Sp.]
2247. ★ *H. maschukense* Litv. et Zahn - Я. машукская = Ст, П, Кисл(Субкавк\*.); ST(НК); [Sp.] l.c. Машук
2248. *H. echioides* Lumn. - Я. румяноквая = Ст, ЛН, П, Кисл(Палеаркт.); ST(НК); [Sp.]
2249. *H. arvense* (Naeg. et Peter) Juxip - Я. полевая = Ст, ЛН, СК, П, Кисл(Европ.); Pa(НК); [Sp.]
2250. *H. procerigenum* (Litv. et Zahn) Juxip - Я. рослородственная = Ст, СК, П(Субкавк\*.); Pa(НК); [Sp.] l.c. Бештау
2251. ★ *H. stauropolitanum* Juxip (*H. piloselloides* Vill.) - Я. ставропольская = Ст (Предкавк.); S, Pa(НК); [R.] <Es> l.c. Ставрополь (рис. 22)
2252. *H. auriculoides* Lang. (*H. lasiophorum* (Naeg. et Peter) Juxip, *H. amaurobassis* (Litv. et Zahn) Juxip) - Я. ушастая = Ст, СК, П(Евро-Кавк.); S(НК); [Sp.]
2253. *H. endourovae* Juxip (*H. argillacioides* (Litv. et Zahn) Juxip, *H. quinque-monticola* Juxip) - Я. Эндоуровой = Ст, П, Кисл(Эвксин.); Pa(НК); [Sp.]
2254. ★ *H. medianiforme* (Litv. et Zahn) Juxip - Я. средняя = П(Кавк.); S(НК); [R.] <Es> l.c. Бештау
2255. *H. strictissimum* Froel. - Я. прямейшая = П, Кисл(Общедр. средиз.); Pa(НК); [R.]
2256. *H. verruculatum* Link. - Я. мелкобородчатая = П[Николаев, 1990] (Субкавк\*.); Pa(НК); [Sp.]
2257. *H. procerum* Fries - Я. рослая = П[Николаев, 1990](Вост. др. средиз.); Pa(НК); [Sp.]

## ЛИТЕРАТУРА

1. Белоус В.Н. Новые виды рода *Astragalus* L. во флоре Ставрополя // Охрана, обогащение, воспроизводство и использование растительных ресурсов. - Ставрополь, 1990а.-С. 308-310.
2. Белоус В.Н. Эколого-ценотические особенности и распространение видов рода *Astragalus* L. (*Fabaceae*) флоры Ставрополя // Активное воспроизводство генофонда флоры и растительности. Ставрополь, 1990б. -С. 75-86.
3. Белоус В.Н. *Astragalus lasiophyllus* Ledeb. (*Fabaceae*) во флоре Ставрополя // Проблемы развития биологии на Северном Кавказе. Вып. 2. Ставрополь: Изд-во СГУ, 1997. -С. 13-15.
4. Белоус В.Н. *Kitaibelia vitifolia* Willd. (*Malvaceae*) - новый вид для флоры Ставрополя // Вестник СГУ, вып. 19, 1999. -С. 50-51.
5. Галушко А.И. Флора Северного Кавказа. -Ростов: РГУ, 1978-1980: Т. 1, 1978. - 317 с. Т. 2, 1980. -350 с. Т. 3, 1980. -327 с.
6. Галушко А. И. Новые таксоны и номенклатурные комбинации // Флора Северного Кавказа и вопросы её истории, вып. 3. -Ставрополь, 1979. -С. 53-57.
7. Галушко А. И. Новые таксоны Северного Кавказа и новые находки // Флора Северного Кавказа и вопросы её истории, вып. 4. -Ставрополь, 1983. -С. 6-16.
8. Галушко А. И., Мигненко Т. И. Экологические реликты долины реки Калаус (Центральное Предкавказье) // Экологические проблемы Ставропольского края и сопредельных территорий. -Ставрополь, 1989. -С. 88-89.
9. Гельтман Д.В. Заметки о кавказских видах рода *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*) // Новости систематики высших растений, Т. 28, 1991. -С. 110-116.
10. Гроссгейм А.А. Флора Кавказа, 2-е изд., 1939-1967. Т. 1, -Баку: Изд. Азерб. ФАН СССР, 1939. -404 с. Т. 2, -Баку: Изд. Азерб. ФАН СССР, 1940. -284 с. Т. 3, -Баку: Изд. Азерб. ФАН СССР, 1944. -322 с. Т. 4, -М.-Л.: Изд. АН СССР, 1950. -314 с. Т. 5, -М.-Л.: Изд. АН СССР, 1952. -456 с. Т. 6, -М.-Л.: Изд. АН СССР, 1962. -424 с. Т. 7, -М.-Л.: Изд. АН СССР, 1967. -894 с.
11. Данилевич В. Г. О состоянии популяции *Gagea artemczukii* A.Krasnova в Приманычье // Вопросы экологии и охраны природы Ставропольского края и сопредельных территорий. -Ставрополь, 1995. -С. 81.
12. Данилевич В.Г. Обзор видов рода *Gagea* Salisb. Ставропольского края // Вестник СГУ, вып. 6, 1996. -С. 91-100.
13. Дикорастущие растения Ставропольского края. Часть 1 / Под редакцией В.В. Скрипчинского. Труды Ставропольского НИИСХ, вып. XXVI, 1977. -196 с.

14. Дикорастущие растения Ставропольского края. Часть 2 / Под редакцией М.И. Котова. Труды Ставропольского НИИСХ, 1979. -138 с.
15. Дополнения к Красной книге Ставропольского края за 2003 год / под. ред. А.Л. Иванова. Ставрополь: Сервисшкола, 2004. -104 с.
16. Дубовик О.Н., Дзыбов Д.С. Географический анализ видов рода *Astragalus* (Fabaceae) Крымско-Новороссийской провинции и их флористические связи // Ботанический журнал, 1990. Т. 75, № 2. -С. 170-180.
17. Дубовик О.Н., Мосякин С.Л. *Artemisia verlotiorum* (Asteraceae) - новый адвентивный вид флоры Северного Кавказа // Ботанический журнал, 1991, Т. 76, № 10. -С. 1408-1411.
18. Егорова Т.В. Обзор подсемейств *Cyperoideae* и *Rhynchosporoideae* (*Cyperaceae*) флоры Кавказа // Новости систематики высших растений 1991. Т.28. -С. 5-21.
19. Егорова Т.В. Осоки (*Carex* L.) России и сопредельных государств. СПб: Санкт-Петербургская гос. фармацевтическая академия – Сент-Луис, Миссурийский ботанический сад, 1999. -772 с.
20. Иванов А.Л. К вопросу о нахождении *Adiantum capillus-veneris* L. на Ставропольской возвышенности // Современные вопросы экологии и природопользования на Ставрополье. -Ставрополь, 1993. -С. 36-37.
21. Иванов А.Л. О новом местонахождении *Ophris oestifera* Vieb. на Северном Кавказе // Современные вопросы экологии и природопользования на Ставрополье. - Ставрополь, 1993. -С. 39-40.
22. Иванов А.Л. Редкие и исчезающие растения Ставрополья. Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 2002. -352 с.
23. Иванов А.Л. Конспект флоры Ставрополья. Ставрополь, 1997. -156 с.
24. Иванов А.Л. Флора Предкавказья и её генезис. Ставрополь: Изд-во СГУ, 1998. - 204 с.
25. Иванов А.Л. К вопросу о флористическом районировании Предкавказья // Вестник СГУ, вып.17, 1999. -С. 38-53.
26. Иванов А.Л. Конспект флоры Ставрополья, 2-е издание. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2001. -200 с.
27. Кононов В.Н., Танфильев В.Г. Новые и редкие растения во флоре Ставропольского края // Новости систематики высших растений, Т. 19, 1982. - С. 196-199.
28. Кононов В.Н., Танфильев В.Г. Новые и редкие виды растений Ставропольского края // Материалы по изучению Ставропольского края, вып. 15-16. Ставрополь: Ставропольское кн. изд-во, 1988. -С. 133-137.
29. Конспект флоры Кавказа: в 3 томах / отв. ред. акад. А.Л. Тахтаджян: Том 1 / ред. Ю.Л. Меницкий, Т.Н. Попова. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского государственного университета, 2003. -204 с.

- 30.Кравцун Н.В. О нахождении *Pteridium tauricum*(С.Presl)V.Krecz. в верховьях р. Кумы (Северное Предэльбрусье) // Флора Северного Кавказа и вопросы её истории, вып. 4. -Ставрополь, 1983. -С. 103-104.
- 31.Кравцун Н.В. Реликтовые виды буковых лесов верховий рек Кумы и Дарьи и их притоков // Редкие и исчезающие виды растений и животных, флористические и фаунистические комплексы Северного Кавказа, нуждающиеся в охране. -Ставрополь, 1986. -С. 46-47.
- 32.Кравцун Н.В. Нахождение на Северном Кавказе *Galanthus woronowii* и его охрана //Редкие и исчезающие виды растений и животных, флористические и фаунистические комплексы Северного Кавказа, нуждающиеся в охране. Грозный, 1989.-С.49-51.
- 33.Красная книга РСФСР. Т. 2. М.: Росагропромиздат, 1988. -598 с.
- 34.Красная книга Ставропольского края. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных / отв. ред. Н.С. Панасенко. Т. 1: Растения / отв. ред. А.Л. Иванов. Ставрополь: Полиграфсервис, 2002. -384 с.
- 35.Лавренко Е.М. Основные черты ботанико-географического разделения СССР и сопредельных стран // Проблемы ботаники, вып. 1, М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950. -С. 530-548.
- 36.Лавренко Е.М. Провинциальное разделение Причерноморско-Казахстанской подобласти Степной области Евразии // Ботанический журнал, 1970, Т. 55, № 5. -С. 609-625.
- 37.Меницкий Ю.Л. Проект "Конспект флоры Кавказа". Карта районов флоры // Ботанический журнал, 1991а, Т. 76, № 11. -С. 1513-1521.
- 38.Мизирева О.М. О нахождении *Sedum reflexum* L. на территории Ставропольского края // Современные проблемы экологии и природопользования на Ставрополье. -Ставрополь, 1993. -С. 61-62.
- 39.Михеев А.Д. Дополнение к флоре района Кавказских Минеральных Вод // Ботанический журнал, Т. 61, № 7, 1976. -С. 973-979.
- 40.Михеев А.Д. Новые флористические находки на Северном Кавказе // Флора Северного Кавказа и вопросы её истории, вып. 4.-Ставрополь, 1983. -С. 95-98.
- 41.Михеев А.Д. Два новых вида *Papaver* L. из Центрального Предкавказья // Бюллетень МОИП, отд. биол., 1981, Т. 86, вып. 3. -С. 81-90.
- 42.Михеев А.Д. Новый вид рода *Centaurea* (*Asteraceae*) с Северного Кавказа // Ботанический журнал, 1997, Т. 82, № 11. -С. 85-88.
- 43.Мордак Е.В. О *Fritillaria meleagroides* Partin ex Schult.et Schult.f. (*Liliaceae*) на Кавказе // Новости систематики высших растений, Т. 20, 1983. -С. 86-91.
- 44.Мордак Е.В. Что такое *Tulipa schrenkii* Regel и *T. heteropetala* Ledeb.(*Liliaceae*)? // Новости систематики высших растений, Т. 26, 1990. -С. 27-31.

45. Немирова Е.С., Данилевич В.Г. К флоре окрестностей озера Солёного // Актуальные вопросы экологии и охраны природы Ставропольского края и сопредельных территорий. Ставрополь, 1991. -С. 134-135.
46. Немирова Е.С., Данилевич В.Г. К флоре северо-восточных и восточных районов Ставропольского края // Вестник СГПУ, вып. 2. Ставрополь, 1995. -С. 23-26.
47. Немирова Е.С., Троцкая И.В. О некоторых редких видах рода *Allium* L. флоры Предкавказья // Вторая Всероссийская телеконференция «Современная биогеография», 2003. (Internet-публикация: <http://www.stavsu.ru>)
48. Николаев В.Я. Обзор кавказских видов *Hieracium* подрода *Pilosella* (*Asteraceae*) // Ботанический журнал, 1989, Т. 74, № 7. -С. 1040-1050.
49. Николаев В.Я. Обзор кавказских видов рода *Hieracium* подрода *Hieracium* - секции *Hieracium*, *Pannosa*, *Sparsiflora*, *Glauciformis* (*Asteraceae*) // Ботанический журнал, 1990а, Т. 75, № 3. -С. 419-429;
50. Николаев В.Я. Обзор кавказских видов *Hieracium* подрода *Hieracium* - секции *Prenanthoidea*, *Schmalhauseniiana*, *Foliosa*, *Sabauda*, *Umbellata*, *Tridentata* (*Asteraceae*) // Ботанический журнал, 1990б, Т. 75, № 4. -С. 556-563.
51. Проханов Я.И. Обзор растительности и флоры Будённовского района Ставропольского края // Материалы по изучению Ставропольского края, вып. 2-3, Ставрополь: Крайиздат, 1950. -С. 103-162.
52. Танфильев В.Г., Кононов В.Н. Дополнение к флоре Ставропольского края // Флора Северного Кавказа и вопросы её истории, вып. 3. -Ставрополь, 1979. -С. 85-89.
53. Танфильев В.Г., Кононов В.Н. Каталог дикорастущих растений Ставропольского края. -Ставрополь: СНИИСХ, 1987. -116 с.
54. Тахтаджян А.Л. Флористическое деление суши // Жизнь растений, Т. 1. М.: Просвещение, 1974. -С. 117-153.
55. Тахтаджян А.Л. Флористические области Земли. Л.: Наука, 1978. -247 с.
56. Толмачёв А.И. Введение в географию растений. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1974. -224 с.
57. Флора Восточной Европы, Т. IX / Под. ред. Н.Н.Цвелёва. Санкт-Петербург: Мир и семья-95, 1996. 450 с.
58. Флора Восточной Европы, Т. X / Под. ред. Н.Н.Цвелёва. Санкт-Петербург: Мир и семья, изд-во Санкт-Петербургской гос. Химико-фармацевтической академии, 2001. -670 с.
59. Флора Восточной Европы, Т. XI / Под. ред. Н.Н.Цвелёва. Москва - Санкт-Петербург: Товарищество научных изданий КМУ, 2004. -536 с.
60. Флора Европейской части СССР, Т. 1-8: Т. I, Л.: Наука, 1974. -404 с. Т. II, Л.: Наука, 1976. -235 с. Т. III, Л.: Наука, 1978. -257 с. Т. IV, Л.: Наука, 1979. -355 с.

- Т. V, Л.: Наука, 1981. - 379 с. Т. VI, Л.: Наука, 1987. -254 с. Т.VII, Санкт-Петербург: Наука, 1994. 319 с. Т. VIII, Л.: Наука, 1989.-411 с.
- 61.Фролов Ю.М. Новый вид рода *Symphytum* (*Boraginaceae*) с Кавказа // Ботанический журнал, 1985, Т. 70, № 4. -С. 533-534.
- 62.Цвелёв Н.Н. Злаки СССР. Л.: Наука, 1976. -788 с.
- 63.Цвелёв Н.Н. О некоторых новых для Кавказа видах растений // Новости систематики высших растений, 1990, Т. 27. -С. 179-183.
- 64.Черепанов С. К. Сосудистые растения России и сопредельных государств. -С.-Пб.: Мир и семья-95, 1995. -990 с.



## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| ОТ АВТОРА.....                                     |  |
| УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.....                          |  |
| КОНСПЕКТ ФЛОРЫ.....                                |  |
| ЛИТЕРАТУРА.....                                    |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ (рисунки эндемичных видов).....         |  |
| АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ РОДОВ.....   |  |
| АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ РОДОВ..... |  |



# КОНСПЕКТ ФЛОРЫ СТАВРОПОЛЬЯ

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

ЛР № 020061

Редактор  
Корректор  
Рисунки А.Л.Иванова

---

Подписано к печати

Бумага

Тираж 300

Усл. печ. л.

Формат

Уч.-изд. л.

---



А. Л. ИВАНОВ

# КОНСПЕКТ ФЛОРЫ СТАВРОПОЛЯ